


ILLUSTRATIONES

THEOPHRASTI

IN USUM

BOTANICORUM

PRÆCIPUE PEREGRINANTIUM.

AUCTORE

JOH. STACKHOUSE, ARM.

SOC. LINN. LOND. HIST. NAT. MOSC.

(COLL. EXON. OXONII OLIM)

SOCIO.

OXONII,

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO.

MDCCCXI.

PRÆFATIO.

THEOPHRASTUS, omnium, ſi Salomonem excipias, antiquiſſimus rei herbariæ inveſtigator, plantas circiter quadringentas, ut in variis peregrinationibus ſe forte ei obtuliſſent, enumeravit; paucas quidem obiter, utpote omnibus ſui temporis notiſſimas, plurimas vero accuratiſſime: individuas illas ſane, nulloque ordinis methodici vel Nomenclaturæ ſyſtematicæ reſpectu habito. Quotieſcunque vel de habitu alicujus plantæ, vel de partibus ejus ſermo erat, et præcipue quando vires medicæ quædam indagandæ erant, toties faſciculos, ut ita dicam, breves plantarum affinium in diverſis operis ſui libris collegit; quo fit ut eadem ſæpius recurrat ſpecies. Hinc faſtidium enatum Botanicis ſuperioris ſæculi, cui forſan addendæ ſunt, cum ex lingua technica et inſolita, tum ex textûs corruptione ortæ difficultates.

THEOPHRASTI nimirum ubique textus corruptiſſimus; et, ſi codices MSS. litteris confluentibus ex-

aratos, et vocum compendiis ubique ſcatentes, inſpi-
cias, minime mirum videbitur rem ita ſe habere; præſertim ſi ſcientiæ Botanicæ ignaros omnino fuiſſe eorum exſcriptores memineris. Omnium quidem ακριβεϛατος eſt HOMERI textus, metro quippe heroico, omnium auribus accommodato ſcriptus; adeo ut alienam vocem locum non ſuum occupare, ſalva ſoni concordia, vix poſſibile fuerit. At Botanico cuivis THEOPHRASTI deſcriptiones aſſidue volventi, et plantas ipſas in agris ſimul inveſtiganti ſimile quoddam, ni fallor, eveniet: ſpecimen ipſum ſub oculis erit textûs commentarium, locíſque corruptis, ut plurimum, medelam ſuppeditabit.

Inter errores innumeros libet exemplum depromere; ubi, ſpeciminibus cum deſcriptione comparatis, ex meris tenebris vera elucebit lectio. Generis Ελατη Linn. duæ enumerantur ſpecies; E. αῤῥην: E. θηλεια, l. iii. c. 10. Prior deſcribitur "foliis magis pungentibus και επεϛρωμμενοις," (ita ſcriptum in cod. Baſil. in aliis επεϛραμμενοις, quod nullo modo convenit foliis Pinûs:) quæ deſcriptio apte convenit P. Abieti Linn. ("Spruce Fir" nobis,) cujus folia *coacervantur*. Vid. Tab. fig. A. Ελατη θηλεια, e contra, folium habet ὡς πτερυγας (pinnas alæ) και επ' ελαττον (ſenſim ſeſe diminuens) ὡϛε την ὁλην μορφην θολοειδη ειναι, και παρομοιον μαλιϛα ταις Βοιωτιαις κυνεαις. (in marg. ed. Budæi legitur κυαθοις.) Locum hunc ita vertit THEODORUS: "folium pinnatum, et "in anguſtias tendens, ut tota facies concamerata vi-

A



Pinus Abies L.

B



Pinus Picea L.

"deatur, similisque potissimum galeis Bœotorum ap-"pareat." THEOPHRASTUM haud ita scripsisse facile quivis, ne dicam Botanicus, affirmabit; THEODORUM vero ignotum per ignotius Latine interpretari. Vox Tholus (Gr. Θολος) occurrit apud VARRONEM in describendo Ornithone Turdis servandis et saginandis constructo. VARR. l. iii. c. 5. "Tholus camera in-"terior *dense* columnata; exterioribus lapideis, inte-"rioribus ex Abiete tenuibus," sc. densis adeo, ut parvulæ hæ aves minime transire queant. Ex structura Tholi clathrato-columnata, conjicere licet θολον quoddam clathratum significare. Θολος, ceu Cella penaria, HOMERI Od. xxii. lignis crebris parallelis constructus videtur, quo aer facilius permeet; sicut et θολος, sive vaporarium in balneis. Hinc si ramulus, vel surculus extremus aliquis P. *Piceæ* L. cum foliis densissime ex opposito inspiciatur, similitudo apta της μορφης θολοειδους occurret. (vid. Tab. fig. B.) Quod si vocem κυνεαις consideremus, nihil omnino cum ramo abietino commune habet. Substituo levi immutatione unius literæ vocem κτανεαις. Vox κτανεα quidem ipsa non reperitur, sed κτενος gen. a κτεις, pecten, est notissima, Dorice κτανος; et ex inspectione ramuli Ελατης θηλειας, ceu Pinûs Piceæ, cujus iconem exhibui, Tab. fig. B. licet conjicere κτανεαν Βοιωτιαν dentibus utrinque ex adverso instructam fuisse, ut in buxeis et eburneis nostris, Angl. "a double-toothed comb." Notandum etiam est vocem πτερυγα pinnam alæ, æque ac alam

ſignificare; (vid. Heſych.) unde folium *alatum* ſuperioris ævi Botanicorum, eſt folium *pinnatum* Linnei. Voces αῤῥην, θηλεια, quæ in deſcribendis plantis frequenter apud Theophrastum occurrunt, fertilitatem vel ſterilitatem, habitumve plus vel minus robuſtum, indicare videntur, ut et vox ἱππος plantæ nomini in compoſitione præfixus; et hîc loci notatu dignum eſt, Ελατην αῤῥενα raro ante provectiorem ætatis annum ſemina maturare. In aliis vero ejuſdem auctoris locis diſtinctio hæc in Mares et Fœmineas v. g. in Palmis et Ficubus, clare indicatur. Methodum Palmas fœmineas polline maſculo fæcundandi libet hîc ſubjicere. Γινεται δε τονδε τον τροπον· ὁταν ανθῃ το Αῤῥεν, αποτεμνοντες την σπαθην, αφ' ἡς το ανθος, ευθυς ὡσπερ εχει, τον τε χνουν, και το ανθος (forſ. legend. του ανθους. v. χνους) και τον κονιορτον, ΚΑΤΑΣΕΙΟΥΣΙ κατα του καρπου της Θηλειας, κ'αν τουτο παθῃ, διατηρει, και ουκ αποβαλλει. l. ii. ad finem.

In Tabula Syſtematica ſecundum Linnei methodum ordinanda mendas plurimas occurſuras ſatis ſcio: veniam tamen mihi dabit Lector, utpote qui opus tantæ molis aggredi primus auſus ſim; obſervationibus autem illorum qui plantas loco natali creſcentes inveſtigaverint, et progreſſu operis celeberrimi, Flor. Græcæ, ita auſpicato apud nos inchoatæ, Plantarum Theophrasti Catalogus, indies, ut ſpero, accuratior evadet.

Nuperrime mihi in manus venit opuſculum, cujus

titulus "Tentamen in hiſtoriam plantarum Theo-
"phrasti, Auct. I. I. P. Moldenhawer, Hamburgi,
"1791. Occaſionem hujus Auctoris libello, ut ipſe
"ait, præbuit exemplar editionis Aldinæ primæ, Hiſ-
"toriæ Plantarum Theophraſti, et de Cauſis Plan-
"tarum, variis lectionibus auctum, in Bibliotheca
"Regia Havniæ, una cum manuſcriptis Alberti Fa-
"bricii. In eo nempe cum occupatus fuerit, ut
"utrumque opus commentario, notiſque criticis il-
"luſtratum ederet, *ſummo Theophraſti acumine per-*
"*culſus, et plura illum, quam vulgo opinantur, vidiſſe*
"*perſpiciens*, Tentamen hoc, ut ſpecimen hujus inſti-
"tuti peritis tradit, ut illorum ſuffultus judicio ratio-
"nem operis moderaretur." Quatuor tantummodo primi libri περι φυτων capitula ibi prelo mandantur; additis emendationibus textûs, inveſtigationibus plantarum quæ in his continentur, et quæ de partibus plantarum, et de earum interna ſtructura perſpecta habuit Theophrastus. Apud nos etiam miſcellaneo opere tractatûs varios Hiſtoriæ Naturalis continente cel. vir Gul. Falconer, M. D. plantas Theophraſti et Dioſcoridis, aliorumque ſcriptorum apud Græcos, additis Bauhini et Linnei ſynonymis, edidit, Cantabrigiæ, A. D. 1793. Ob variam ſane Cl. ſcriptoris doctrinam, et inprimis ſummam Græcæ linguæ peritiam, "Tabulam Plantarum in priſcis Scrip-
"toribus Græcis maxime repertarum," cuivis Naturæ inquiſitori operæ pretium erit ſtudioſe perpendere;

non tamen hujus instituti est discrepantia nomina plantarum Theophrasti et Dioscoridis, aliorumque in concordiam redigere, sed tantummodo ex descriptionibus suis in unum collatis Tabulam systematicam Plantarum THEOPHRASTI Lectori exhibere.

Non autem tanquam Auctor systematicus, uti recte admonet LINNEUS, contemplandus est THEOPHRASTUS, etsi inter Physicos vix magistro ejus Aristoteli sit posthabendus. Comparatione scilicet (l. i. c. i. περι φυτων) instituta inter animalia et vegetabilia, τα μερη, τα παθη, τους βιους, τας γενεσεις, amborum sedulo definit. Vires medicas etiam, et varias culturæ methodos incredibili fide ac cura persequitur, ut magis rem quotidiani usûs legere videamur quam longinqua vetustate abditam. Cujus rei exempla pauca liceat hoc loco proferre: 1. Methodum uvas sine acinis producendi. 2. Insita ex duobus Vitis, *Viniferæ* L. varietatibus in unum conjungendi, ut albæ et nigræ in eodem racemo inveniantur uvæ. 3. Luxuriem nimiam, fisso stipite, *calculo interposito* reprimendi. 4. Amygdalorum sterilitatem, ope fistulæ ferreæ in truncum circumactæ, quo succus nimius effluat, corrigendi. 5. In quamplurimis fructiferis arboribus corticem auferendo, vel circumscindendo: optime enim noverat vir acutissimus, quod quidem sæpius diserte monuit, fertilitatem ex debilitate, sterilitatem ex robore provenire.

CATALOGUS ALPHABETICUS

PLANTARUM THEOPHRASTI,

DESCRIPTIONIBUS SINGULARUM

IN UNUM COLLECTIS,

ET

IN GENERA ET SPECIES,

JUXTA

SYSTEMA LINNEI,

QUOAD FIERI POTUIT, DISPOSITIS.

CATALOGUS ALPHABETICUS

PLANTARUM THEOPHRASTI.

A.

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ. *Syngen* [a].

Una cum Ruta, Origano, &c. ut ſempervirens, i. 15. caulis lignoſus, foliis parvis, vi. 1. ex radice vel ſurculis propagatur, rarius ex ſemine; planta frigoris impatiens; radices lignoſæ, pro funde in terram agentes, vi. 7.

ΑΓΝΟΣ. *Didynam.*

Cultura et tempore ad arboris magnitudinem accedit, i. 5. cum Paliuro et Hedera enumeratur, ibid. flores ſuperi, *Bot.* ut Pyri, Punicæ, i. 22. fructificatio in ſummitatibus, i. 23.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ. *Triandr.*

Culmus nodoſus, i. 10. radix nodoſa, repens; ad nodos radiculas et ſtolones emittens; cum Cypero enumeratur inter paludoſos, iv. 11. Sæpius non occurrit.

ΑΓΧΟΥΣΑ. *Pentandr.*

Genus herbaceum, (ποώδης,) vii. 9. foliis radicalibus, caule nudo; cum Plantagine et Anthemio enumeratur; radix rubra, ib.

ΑΔΙΑΝΤΟΝ. *Cryptog.*

Folia hyemem durant, nullo certo germinandi tempore, vii. 10.

[a] Vide Tabulam Syſtematicam.

folia humorem repellunt, unde nomen, vii. 13. duæ ſpecies numerantur, 1. Α. λευκον, 2. Α. μελαν, cujus uſus ad capillos nutriendos, ſucco oleo mixto, ib.

ΑΕΙΖΩΟΝ. *Dodecand.*

Foliis carnoſis, (σαρκοφυλλον,) i. 16. folium viride et ſucculentum, etiam in locis aridis; folia ſucculenta, lævia, oblonga, vii. 14. Habitat in arvis, in ſummis murorum, et ſuper figulas.

ΑΙΓΕΙΡΟΣ. *Polygam.*

Cortex carnoſus, i. 8. ſpecies peculiaris ex in Creta memoratur, ii. 3. in pratis abundat, iii. 4. antiquitus arbor ſterilis vocata; in Creta fructifera, iii. 5. arbor præcox, iii. 6. juxta aquas creſcit, και ευαυξης εςι, "is of quick growth," iii. 7. ſpecies unica datur, arbor procera, iii. 14. βραχυβιος, "ſhort lived," iv. 14.

1. ΑΙΓΙΛΩΨ—δρυς. *Monœc.*

Species hæc glandem maxime amaram fert; habitat in M. Ida; arbor omnium procerrima, cortice maxime omnium lævi, ligno ſolidiſſimo; raro in agris cultis, iii. 9.

2. ΑΙΓΙΛΩΨ—*gramen.* *Polygam.*

Semina annis ſucceſſivis proveniunt, vii. 12. folia pubeſcentia et *nitentia* vere, viii. 7. inter ſegetes hordei frequentiſſime, viii. 8. *terram maxime exhaurit.* Radicibus et caulibus numeroſiſſimis, viii. 9. ſemen non germinat, niſi cito ſatum; nec occultari terra amat, ſed inter gramina germinat; arenoſa amat et culta, viii. 11.

ΑΙΜΑΔΩΡΟΝ. *Didyn.*

Spec. paraſitica; naſc. ex radice Cumini, caule unico ſimplici; capite amplo, obtuſo; radice orbiculari, viii. 8. ſemel occurrit.

ΑΙΡΑ. *Triandr.*

Caulis tegumen ſimplex ſine tunicis, (μονολεπος,) i. 8. ſemen noxium, *capitis dolorem* inducens, viii. 5. ſterilitatem inducit agris, viii. 9. folia anguſta, pubeſcentia, *Bot.* (δασεα) nitentia præcipue tempore verno, viii. 7. Triticum et Hordeum dicuntur degenerare in αιραν cultus negligentia.

1. ΑΚΑΝΘΑ. *Syngen.*

Gummifera; gummi Illyrico, odore et colore, fimilis. Hab. reg. Aria dict. iv. 5.

2. ΑΚΑΝΘΑ—ΑΦΥΛΛΟΣ. *Syngen.*

Μια ακανθα εφ' ἑκαςῳ των οζων, fpec. ignota, cujus fuccus expreffus oculis perniciofus, iv. 5.

3. ΑΚΑΝΘΑ ΔΙΨΑΣ. *Syngen.*

Defc. nulla. Hab. in arenofis Arabiæ prope mare Rubrum, iv. 8.

4. ΑΚΑΝΘΗ ΙΝΔΙΚΗ. *Syngen.*

(Id. q. Ακανθη gummifera, iv. 5.) quæ vocatur Ατρακτυλις. (vid. vi. 3, 4.) ix. 1, cujus gummi, coloris fanguinei.

5. ΑΚΑΝΘΑ ΚΕΑΝΩΘΟΣ. *Syngen.*

Vid. Κεανωθος.

6. ΑΚΑΝΘΑ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΟΖΟΣ. *Syngen.*

7. ΑΚΑΝΘΑ ἩΡΑΚΛΕΙΑ. *Syngen.*

Ex hujus caule baculi fiunt; caulis fucco plenus, fpec. ignota, iv. 5.

8. ΑΚΑΝΘΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ. *Syngen.*

Ita dicta ex colore floris; femel occurrit, vi. 3.

ΑΚΑΝΘΟΣ. *Polygam.*

Hab. in arvis, non in montibus, Macedoniæ, iii. 4. fpinofa per totum; magn. ampla, lignum utile. Species duæ; 1. A. albus; 2. A. ater. 1ma. ligno molli, ευσηπτῳ, "quickly decaying." 2da. lig. duro, ασηπτῳ; loti ligno fimili; fructu lobato, coriariis utili; flore fpeciofo in fertis ufitato, arbor gummofa, fylvam cæduam formans. Hab. Thebaide, iv. 3.

ΑΚΑΡΝΑ.
ΑΚΟΡΝΑ. } *Syngen.*

Foliis fpinofis, i. 16. pl. herbofa, et inter fpinofas cum carduis

enumeratur, vi. 3. Cnico affinis fativo? (ἡμερῳ) colore fubflavo, et foliis nitentibus, (λιπαροις.)

AKONITON. *Polyand.*

Folia Cichorii, radice tuberculata, bulbis nuciformibus, venenofis; ceteræ partes innoxiæ: habitat in Ακοναις, pago quodam Mariandúnorum, unde nomen, ix. 16. N. B. Textus forfan corruptus; ακονη enim cos; εν ακοναις (locis faxofis) pagi, &c.

ΑΚΟΡΟΣ. *Hexandr.*

Flos infidet femini, femel occurrit fine defcriptione, cum Cnico, i. 22.

ΑΚΤΗ. }
ΑΚΤΕΟΣ. } *Pentand.*

Lignum tortuofum, (λοξον) i. 8. fine medulla fecundum quofdam, i. 9. fecundum alios medulla carnofa, ib. lignum enode, i. 13. in udis crefcit, et in umbra; lignum laxum, leve, medulla tenera in junioribus, parte interna cava in adultis; unde ex levitate baculi fiunt, radices fuperficiales paucæ, folia περι ἑνα μισχον, (pinnata,) παχυ, ινωδες, (pedunculo craffo, ftrigofo,) τα μεν ενθεν, τα δ' ενθεν, (oppofita,) κατα γονυ και συζυγιαν, (ad nodos et juncturas,) εχοντα δ' ἑν, (φυλλον) επ' ακρον, (terminata folio impari *Bot.*) ανθος λευκον εκ μικρων λευκων πολλων, (umbella alba, ex flofculis albis numerofis,) επι μισχου σχισει, κηριωδες, (ad divifuram pedunculi formam exhibens favi, fc. cavitatibus florum in plano, vid. Κηριωδης Lex. Theophr.) odor liliaceus; bacca lentis magnitudine, immatura, purpuro-rubra, (ομφακωδης·) matura, nigra, iii. 13. Sambuci defc. accuratiffima. Lign. folidum album, iv. 4.

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ. *Diœcia.*

Fructum fert fuper folium, ex rachi, vel vena intermedia; eodem modo ac Κεντρομυρρινη, (Rufcus *aculcatus,*) ambo enim Rufci L. fpecies, iii. 17.

ΑΛΘΑΙΑ. *Monadelph.*

Ab aliis Malva fylveftris; hab. Arcadia, Macedonia; planta medicinalis, ix. 15. folia Malvæ, fed majoribus, et magis pubefcen-

tibus; caules etiam pubefcentes; flore luteo; fructu Malvæ; radice fibrofa alba; fuccus guftu fimilis caulis Malvæ; ufus adv. hernias, et morbos pulmonum, et ulcera externa, oleo mixtus, ix. 19.

ΑΛΙΜΟΝ το. *Polygam.*

Sp. Salicorniæ, ex qua fal Kali, "Barilla" dict. ex Europa Auftrali; plantas alias necat ex abundantia falis muriæ in fucco, iv. 20. de C. Pl. v. εν αλμωδεσι φυεται. de Cauf. Pl. vi.

'ΑΛΙΦΛΟΙΟΣ. Vid. Δρυς. *Monœc.*

ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ. *Triandr.*

Spec. ςαχυωδης, μαλακος, χνοωδεςερος (vid. Χνυς) ὁμοιος των Αλωπεκων ȣραις. Defcriptio hæc fatis convenit gramini Alopecuro Linn. item ἡ ανθησις χνοωδης (flores apetali *Bot.*) καθαπερ τȣ Σιτȣ, vii. 10. N. B. Textus hic corruptus valde: nec fatis liquet quare Αλωπεκουρος cum Στελεφȣρῳ (Plantagine L.) et Θρυαλλιδι (Verbafco L.) ut planta affinis et Σταχυωδης enumeratur. De fignificatione voc. ςελεφȣρος, vid. Lex. Theoph. Σταχυς Θρυαλλιδος (Thyrfus Botanicorum) ουκ οξυς, ουδε αθερωδης (barbatus *Bot.* vid. Lex.) αλλ' ἁπλα και μονοειδης, quibus fatis diftinguitur Verbafci Thyrfus a Spica graminea. N. B. In Fafc. 2do. Flor. Græc. extat Spec. Phleum crinitum dict. t. 62. fpica caudam vulpinam referente.

1. ΑΜΑΡΑΚΟΣ. *Didynam.*

Pl. herbacea, fempervirens, i. 15. ramulis lignofis, foliis parvis, vi. 1. πολυσπερμος, fragrans, foliis mollioribus Abrotano; radice fibrofa, fuperficiali, vi. 7. vires aromaticæ, ix. 7.

2. ΑΜΑΡΑΚΟΣ. *Hexand.*

Spec. duæ; 1. A. φρυγιος; 2. A. ποθος; quorum prior flore Hyacinthis fimili, alter αχρους, λευκος (an οχρο-λευκος, albidus,) cujus ufus ad funera ornanda, vi. 7.

1. ΑΜΠΕΛΟΣ. *Pentand.*

Cortex laceratus, i. 8. medulla carnofa, i. 9. folia ampla, i. 16. fuccus aquofus, i. 19. flores ftaminei, i. 21. flor. inferi, *Bot.* i. 22. furculi recentes fructum ferunt. 1. 23. Varietates occur-

runt plurimæ, i. 24. propagatur ex ramis junioribus, ii. 1. ferendo degenerat, ii. 3. var. A. καπνιος dicta, cujus racemi variegantur albo et nigro, (εκ μελανος βοτρυος λευκον, και εκ λ υκου μελαν φερει) ii. 4. Hab. in Tmolo monte, et Olympo. A. μαινομενα. de C. Pl. i.

2. ΑΜΠΕΛΟΣ ΑΓΡΙΑ.

Radix Vitis fylveftr. cauftica, depilatoria.

3. ΑΜΠΕΛΟΣ ΙΔΑΙΑ. *Pentandr.*

Fruticofa fpec. ramulis parvis; racemis lateralibus; uvis Pifi magn. guftu fuavi; acinis mollibus; foliis parvis, rotundis, indivifis, iii. 17.

4. ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Species 2. littoralis et pelagica, fed fructus pelagici major; veficulæ rotundæ, F. *bacciferi* et *natantis L.* pro fructu accipiebantur, cujus forma haud inepte uvam refert.

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ. *Icofandr.*

Nux cum putamine ftatim enafcitur, i. 18. femina oleofa, i. 19. flos petalis inftructus, amplus, i. 21. fructum fert in furculis biennibus, i. 23. mos fuccum extrahendi ope paxilli in lignum inducti, quo fructifera evadat, ii. 3. flores prodeunt ante folia, vii. 12. arbor gummofa, ix. 1.

ΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

Ex Media transfertur, item ex India; cum Cardamomo enumeratur: fed unguentum folum memoratur, ix. 6, 7.

ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ. *Claff. incert.*

Spec. Epidendri peculiaris. de Cauf. Pl. v.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ. *Decandr.*

Sempervirens, i. 15. montana fp. hab. Macedonia, iii. 4. duæ fpecies enumerantur, quæ fimul germinant, iii. 6. ευαυξης, (cito crefcit,) iii. 7. foliis Κομαρου (Arbuti), cortice lacero, et fefe abjiciente, (ὡςε αποπιπτειν,) i. 8. albido, fructu Arbuti, iii. 16. lignum tornatile, et ad fufos ufitatum, v. 8.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΥΣ. } *Polygam.*
ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. }

Satio post solstitium autumnale, vii. 1. semen post octo dies emergit, ib. semen latum, membrana cinctum, (φυλλωδες) vii. 3. radix fusiformis, vii. 2. Species una saltem: semina non durant, vii. 6.

ΑΝΔΡΥΑΛΙΑ. *Syngen.*

Semel inter λαχανα occurrit, quæ usibus culinariis inserviunt; inter κιχωριωδη cum Αφακη, Ὑποχοιριδι, Ηριγεροντι enumeratur, vii. 7.

1. ΑΝΕΜΩΝΗ. *Polyandr.*

Floret post primum tempus pluviale, vii. 8. Desc. nulla.

2. ΑΝΕΜΩΝΗ ΛΕΙΜΩΝΙΑ. *Hexandr.*

Spec. Narcissi sylvestris, quæ floret cum Ελειοχρυσῳ, Ξιφιῳ, Ὑακινθῳ, vi. 7. ανθη εαρινα. ib.

ΑΝΗΘΟΝ. } *Pentandr.*
ΑΝΗΣΟΣ. }

Species gymnosperma, (vid. Γυμνοσπερμος Lex. Theophr.) cum Cumino, Coriandro, Fœniculo. (N.B. Non Gymnosp. Linn.) i. 18. planta fragrans, i. 19. αμαυροκαρπος, (fructus parvus latens?) ex axillaribus ramis fructum fert, ut ferula, vi. 2. seminatur bis in anno, vii. 1. Κοριαννον, Μαραθρον, Ανηθον, γυμνοσπερματα: vid. divisionem in γυμνοσπ. εμφλοιοσπ. et παπποσπερματα, vii. 3. semina inter unguentaria, ix. 7.

ΑΝΘΕΜΟΣ. }
ΑΝΘΕΜΟΝ. } *Syngen.*
ΑΝΘΕΜΙΟΝ. }

Flos semini insidet, i. 22. foliis radicalibus, radicem cingentibus, vii. 9. flores ad apicem primo florent: forma floris, το εν κυκλῳ ανθος λευκον, (radii circulares floris, albi,) το δ' εν μεσῳ χρυσος, (discus floris luteus, vel aureus,) vii. 13.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΝ. *Hexandr.*

Planta herbacea, quæ vel in aridis vel in uliginosis et paludibus marinis provenit, ut Scylla, i. 7. planta fistulosa, cum Conio, Fæniculo, &c. enumeratur. N. B. Distinctio sumitur illarum quæ caule sunt lævi, ut Mandragoras, Conium, Helleborus, Anthericum; et quæ caule nervoso et striato, ut Fæniculum, &c. vi. 2.

ΑΝΤΙΡΡΙΝΟΝ.
ΑΝΤΙΡΡΙΖΟΝ. } *Class. incert.*

Dicitur esse simile Aparines, ix. 21.

ΑΠΑΡΙΝΗ. *Tetrandr.*

Caulis scandens, vii. 8. adhæret vestibus *δια την τραχυτητα*, nec facile abstrahitur; flos dicitur innasci in aspero pericarpio, inconspicuus, *Bot.* et in seipso fructificans, ut ovum, vii. 14. Ervi segetes infestat, viii. 8.

ΑΠΑΤΗ. *Class. incert.*

Επιγειοφυλλος cum Αρνογλωσσῳ, vii. 9.

ΑΠΙΟΣ. *Icosandr.*

Arbor mediæ magn. i. 4. folium *περιφερες*, in medio turgidum, P. *mali L.* folio rotundius, i. 16. succus, (*χυλος*) "the sap," aquosus, i. 19. flores *πεταλωδεις*, (petalis distinctis) i. 21. ex surculis biennibus vel annuis floret, i. 23. Varietates cultæ maxime differunt a sylvestribus, i. 24. serendo degenerat, ii. 3. propagatur insitione, ii. 7. sylvestres spec. validiores, sed minus fructiferæ, iii. 3. fructum fert ex surculis extremis, et ex lateralibus, Ang. "spurs," iii. 7. optimi circa Pantacapæum, in Ponto, iv. 6. Distinctio inter Απιον et Αχραν, sylvestrem sc. et cultam, iv. 11. Sylvestris spec. minus obnoxia vermibus, iv. 16.

ΑΡΑΚΟΣ. *Diadelph.*

Planta infestans segetes Ervi; herba aspera, fragilis, (*σκληρος*) viii. 8. N. B. Hinc forsan vox Latina cracca, nomen triviale Viciæ spec. Linn.

ΑΡΑΚΟΥ ΟΜΟΙΟΣ. *Diadelph.*

Cum Αραχιδνα enumeratur, i. 11. vid. Αραχιδνα.

ΑΡΑΧΙΔΝΑ. *Diadelph.*

Fructu vel tuberculo sub terra: cum Ουιτῳ enumeratur, i. 1. radix simplex carnosa; ceteris fibrosis, super quibus fructûs, vel tubescula, i. 11.

ΑΡΙΑ. *Icosandr.*

Fructus maturatur hyeme ineunte, iii. 6. Dorica spec. Αρια vocata, Πρινῳ affinis, cujus lignum intermedium inter Πρινον et Δρυν· λευκοτερον ἡ υ Πρινου, οινωποτερον της Δρυος, "lighter coloured than the first, darker than the last," iii. 16. folia Πρινου: fructus vocatur Ακυλον, ib. lignum hyeme cæditur, v. 1. durum, fragile, v. 4. incorruptum, v. 5. δυσεργον, ut quercûs lignum, v. 6.

ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ. *Gynandr.*

Fructus fragrans odore, etsi gustu amarus; foliis Alsines, sed angustioribus; radice nigra: planta medicinalis valde, ix. 13. Hab. in Arcadiæ et Laconiæ montibus: in Pelio, Clitoria, Tegea, &c. ix. 15. radix magna, atra, amara, sed fragrans; foliis rotundis, radicalibus, ib.

ΑΡΚΕΥΘΟΣ. *Diœcia.*

Sempervirens, i. 15. spec. montana, iii. 4. ενιαυτοφορος (fructus maturatur anno 2do.) iii. 6. cito crescit, iii. 7. habitat cum Ελατῃ in montium lateribus, non in summis, iv. 1. lignum usitatum in ædificando cum Ελατῃ et Κεδρῳ, vi. 8.

ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ. *Tetran.*

Foliis coronam radicis cingentibus: επιγειοφυλλον, vii. 9. spica floret κατα μερος, (successive) vii. 10.

ΑΡΟΝ. *Gynandr.*

Radix magna, carnosa, i. 9. simul cum Cypero, i. 10. radix lævis, mollis, sine cortice, vii. 9. radix edulis cum aceto: quo radix crescat magnitudine, *circumvertunt* radicem ne foliis luxurietur, et alios generet radiculos, vii. 11. folia subtus cava, et lata, vii. 12. plant. ακαυλος, vii. 12.

ΑΣΙΝΗ. *Class. incert.*

Cum Ἑρπυλῳ enumeratur semel. de C. Pl. ii. .

ΑΣΚΙΟΝ. *Cryptog.*

Tuberis ſpec. cum ſubterraneis Ὕδνῳ, Οὐιτῳ vel Οὐιγγῳ enumeratur, ὧν οὐδενὶ ἐστι ῥιζα, i. 10.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ. *Pentandr.*

Panaceæ ſpecies, ſic dicta ab Æſculapio; radix σπιθαμιαιος, alba, craſſa, cortice valde craſſo; ἁλικωδει? (i. e. ſucco ſalino) caulis nodoſus, foliis θαψιας, ſed craſſioribus, i. 12. Vid. Πανακες.

ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ. *Claſſ. incert.*

Inter odoriferas, ix. 8.

ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ. *Hexandr.*

Planta aphylla, ſpinoſa, i. 16. ſpinis ſolum, ut Σκορπιος, vi. 1. floret autumno, vi. 3. producit aliquod clavæforme, (κορυνωδες,) parvum, ex quo prodit flos parvus, ib. radices profundæ et numeroſæ; ſtolones ἐκ της Ασφαραγιας, ("the Aſparagus bed,") edules; unde liquet antiquis uſum plantæ notum eſſe, ib.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ. *Hexandr.*

Foliis radicalibus, i. 16. radix glandiformis, (βαλανωδης) vii. 9. radix edulis, vii. 11. foliis longis, anguſtis, nitentibus, ib. πολυκαρπος; ſemine lignoſo, triquetro, in pericarpio rotundo, infero, *Bot.* dehiſcente per maturitatem; floret ſucceſſive; caulis ſupra ramoſus? (αποφυσεις ανωθεν εχων,) vii. 12 Vid. αποφυσεις.

ΑΤΡΑΓΕΝΗ. *Polyandr.*

Semel cum Corylo *Avellana* occurrit: lignum ad πυρειας εσχαραν utile: (vide πυρεια,) v. 10.

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ. *Syngen.*

Spinis in caule et foliis, ακανοις etiam (perianthiis vel capitulis ſpinoſis) cum Κνικῳ, Ονοπορδῳ, aliiſque Carduis enumeratur, vi. 3. λευκοτερα πασων, (foliis magis canis,) ſuccus ſanguineus: vocatur Ακανθα φονος: odor gravis; ſero floret, vii. 4. ſuccus ſanguineus, ix. 1.

1. ΑΦΑΚΗ. *Diadelph.*

Οψισπερμος, viii. 1. legumen latum, viii. 5. cito germinat, viii. 10.

2. ΑΦΑΚΗ. ΑΠΑΤΗ. *Syngen.*

Planta κιχωριωδης floret successive, vii. 10. spec. amara et inedulis; cito senescit et in pappum abit; flos pallide luteus, vii. 11. germinat πρωτοις υετοις, vii. 8. floret per totam æstatem, vii. 11.

ΑΦΑΡΚΗ. *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. hab. in montibus Macedoniæ, iii. 4. spec. sylvestris et cult. germinant simul, iii. 6. lignum utile ad vallos et sudes, v. 8.

ΑΦΙΑ. *Class. incert.*

Planta κιχωριωδης, quæ semel memoratur, vii. 8. floret statim cum prima germinatione. N. B. Forsan error textûs pro Αρια.

ΑΧΡΑΣ. *Isocandr.*

Καλλικαρποτερος Απιου, i. 7. differt max. a culta spec. i. 24. hab. in planis, iii. 4. floret post cultam, iii. 6. ευαυξης, (cito crescit,) iii. 7. maxima inter Αχραν et Απιον differentia, iv. 14.

ΑΧΥΝΩΨ. *Incertum.*

(Bas. χυνωψ,) cum Αρνογλωσσω, Στελεφουρω floribus spicatis, cylindricis. vii. 10. N. B. Censeo legendum Εχινωψ, vel forsan Κυνωψ, spec. flore ringenti. *Bot.* Vid. vii. 8.

ΑΨΙΝΘΙΟΝ. *Syngen.*

Succus amarus ut Centaurium, i. 19. inter odoriferas quæ frigora amant, iv. 6. folia amara, sed utilia, vii. 9.

B.

ΒΑΛΑΝΟΣ ἡ. *Class. incert.*

Nux in cortice coriaceo, i. 17. gustu dulci, melleo, i. 19. arbor ita vocata ex fructu glandiformi, iv. 2. Hab. Ægypto; folio Myrti vel angustiore; arbor satis ampla, ramis tortuosis. Unguentarii nucibus et pericarpiis simul utuntur, ambo enim odoriferæ: nux forma et magnitudine similis Καππαριος, lignum navibus struendis utile, iv. 2.

BAΛΣAMON. *Claſſ. incert.*

Gummi ſponte fluit ut lachryma, ix. 1. excifione apud Syros colligitur, ix. 2. Habit. εν αυλωνι της Συρίας, (inter Libanon et Antilibanon,) arbor magnitudine Punicæ L. ramoſiſſima; foliis rutaceis, ſed magis incanis; ſempervirens; fructu ſimili Τερεβινθου. Gummi hujus arboris omnium pretioſiſſimum abraditur a cortice ονυξι σιδηροις, (inſtrumentis unguiformibus) ſæpe adulteratur, ix. 6. inter aromatica recenſetur, ix. 7.

BATOΣ ἡ. *Iſocandr.*

Cum Paliuro, ut frutex, i. 4. cum eodem ut frutex ſpinoſus, i. 8. caules ſpinoſi, i. 16. ſempervirens, cum Paliuro, iii. 17. genera plura: 1. erecta; 2. repens, cujus ramuli όταν συναπτωσι τη γη ριζονται παλιν. (N. B. Species hæc vocatur optime, Χαμαιβατος·) 3. Κυνοσβατος fructu rubro ſimili roſæ, ſc. Roſa *canina* L. folio Viticis, *agni caſti* L. iii. 18. ſpec. λοχμωδης vocatur ἡ Βατος, cum Παλιουρω, ut in paludibus et aquoſis creſcens, iv. 9. ib. iv. 13. πτορθακανθος, ramis ſpinoſis, vi. 1. N. B. Βατος ὁ an ſp. diverſa, de Cauſ. Pl. 1.?

BΛHKΩΣ. *Didynam.*

Id. q. Γληχων, Mentha *pulegium* Linn.? ſemel occurrit, ix. 16. ubi Dictamni folia τη Βληχοι comparatur.

BΛITON. *Polygam.*

Ακροκαρπον, και πλαγιοκαρπον, una cum Ανδραφαξει et Ῥαφανω, i. 23. ſeritur menſe Martio, vii. 1. radices agit fibroſas, vii. 2. radices ligneſcunt, vii. 3. ſemina membrana obvoluta (εμφλοιοσπερματα) vel cortice tecta? ib. Genus ſimplex, vii. 4.

BOΛBOKΩΔION. *Hexandr.*

Vocatur βολβου κωδιον duobus verbis: florens poſt Narciſſum; nec ſæpius memoratur, vi. 7.

1. BOΛBOΣ. *Claſſ. incert.*

Radix cortice tecta et tunicata; cum Scylla, et Allio *cepa L.* i. 10. folia ſine pediculo, (αμισχα) i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. radix tunicata, (λεπυρωδης) vii. 9. folia linearia, παντελως ςενα, (per totum anguſta.) Spec. hæc εχει καυλον του ανθους μονον, (i. e. ſcapum *Bot.*) vii. 12.

2. ΒΟΛΒΟΣ ΕΡΙΟΦΟΡΟΣ. *Claſſ. incert.*

Γενος ιδιωτατον; (maxime peculiare,) hab. in arenoſis maris; pars lanoſa ſub primis tunicis; pars interior edulis, in Taurico Cherſoneſo, vii. 13. Lana, goſſipina, non ſericea, ib. N. B. Hyacinthi Peruviani mentio fit ſub nomine Bulbi eriophori. Act. Soc. Horticult. Lond. v. 1. p. 47.

ΒΟΛΒΙΝΗ. *Hexandr.*

Simul occurrit cap. eodem, vii. 13. dicitur infeſtare ſegetes; an bulbus Hyacinthi *botryoidis* L.?

ΒΟΥΚΕΡΑΣ. *Gynandr.*

Nihil æque aridum, recenti ſtatu, viii. 8.

ΒΟΥΜΕΛΙΑ. *Diandr.*

Arbor excelſa, cortice lævi; hab. Macedonia in planis, iii. 11. in Ægypto abundant Μελια et Βουμελια, iv. 9. in aquoſis, ib. non occurrit in Græcia. Vid. Fl. Græc. Faſc. 1mum.

ΒΟΥΠΡΗΣΤΙΣ. *Claſſ. incert.*

Planta cichoracea, cum Aphaca et Κυνωπι, germinans cum pluviis primis, vii. 8.

ΒΟΥΤΟΜΟΣ. *Monœc.*

Caulis εχων ὁμαλοτητα ιδιαν, (lævitatem ſingularem,) vid. Ὁμαλος. Nervo acuto folium tranſcurrente, γωνιοφυλλος, vid. γωνια, i. 16. inter fluviatiles, iv. 9. fructus ater, ſimilis fructui Σιδης· pl. maſculina inutilis; pl. fæmina πλοκαμοις utilis, iv. 11.

ΒΡΟΜΟΣ. *Triandr.*

Fructus, i. e. ſpica, omnium maxime paleacea, (πολυλοπος,) viii. 4. ὁμοιοπυρος, (i. e. tritici affinis habitu) terram exhaurit maxime poſt Ζειαν, πολυκαλαμος ων, και πολυρριζος.

Γ.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. *Pentandr.*

Aliis Χαλβανον: gummi ſolum occurrit, ix, 1. Planta forſitan γαλβανος?

ΓΗΘΥΟΝ.
ΓΗΤΕΙΟΝ. } *Hexandr.*
ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ.

Κοιλοφυλλον, (folio cavo intus,) i. 16. Anno fecundo maturat fructum, vii. 1. 2da. fatio menf. Munychione. κεφαλον, και ὥσπερ αυχενι μακρῳ? fæpius fecatur, (Porrum *fectile* L.) propagatur ex radice, vii. 4. amat loca irrigua, vii. 5. ου μεταφ·εται, ib. femen minime durat, vii. 6.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Syn. Ζυγιας. Vid. iii. 4.

ΓΛΗΚΩΝ. *Didynam.*

Inter λαχανα fine defcr. utpote notiffima enumeratur; Φιλοκοπρα vocatur, et multo melius tranfplantatione provenit. N.B. Semel occurrit, et ibi apud Aldum Γλισχρος legitur, fed male. vii. 5. Vid. Βληχως.

ΓΛΥΚΥΣΙΔΗ. *Polyandr.*

Παιωνια ab aliis vocata, ix. 9. Vid. Παιωνια.

ΓΟΓΓΥΛΙΣ. *Tetradyn.*

Radix carnofa, i. 9. corticata, i. 10. feritur cum primis pluviis, vii. 1. radix magna, bulbofa; cortex avulfu facilis, vii. 2. πλαγιοκαρπος, (opp. ακροκαρπῳ, cujus fructus in apicibus,) vii. 3. duæ fp. mafc. et fœm. vii. 4. non tranfplantatur, vii. 5. bulbus corticatus, vii. 9.

Δ.

ΔΑΥΚΟΝ ΔΑΦΝΟΕΙΔΕΣ. *Claff. incert.*

Pl. pharmaceutica, fuccus folum defcribitur, crocei coloris, xi. 15. Δαυκον an fpec. eadem? Hab. Arcadia juxta Laconiam, fingularis fpecies radicem habens nigram, fucco θερμαντικῳ διαφεροντως, (omnium calidiffimo) ix. 22. cum Πευκεδανῳ jungitur.

1. **ΔΑΦΝΗ.** *Enneandr.*

Λεπτοφλοιος, i. 8. radice ανωμαλει, (an fcabra, an inæqualis

magnitudine? vid. ὁμαλος) i. 9. Arbor ανοζος, (enodis,) cum Συκῃ, Ακτῃ, i. 13. sempervirens, i. 15. iii. 4. baccæ oleosæ, i. 19. species plurimæ, i. 24. pullulat cum zephyris, iii. 6. baccæ in racemo, iii. 8. Hab. in Olympo M. iv. 6. Inimica Viti, iv. 20. Baculi senibus ex illa fiebant ob levitatem, v. 8. usus ad τρυπανον πυρειας, (vid. Lex. Theoph.) v. 10.

2. ΔΑΦΝΗ ΑΓΡΙΑ. *Enneandr.?*

Semel occurrit inter sempervirentes. An spec. peculiaris? i. 15.

3. ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. *Diœcia.*

(Vid. Κεντρομυρρινη) επιφυλλοκαρπος; fructificatio super folium, i. 16. Hab. M. Ida, iii. 17.

4. ΔΑΦΝΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Corallina.*

iv. 8.

1. ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Foliis Βληχου, (vid. supra) ramulis gracilioribus? succus gustu Menth. *Pulegii* L. similis? Vires ad partus utilissimæ; folia solummodo in usu, succus sc. expressus et aqua mixtus. Hab. Creta, ix. 16.

2 ΨΕΥΔΟΔΙΚΤΑΜΝΟΣ foliis similibus, ramis minoribus. Vires inferiores, ib.

ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ. *Decandr.*

Planta ποωδης, (herbacea,) sed caulis lignescens, μικροφυλλος, vi. 1. in sertis usitata, ib. ανοσμος, vi. 6. sero æstate floret, vii. 7.

ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. *Monœc.*

Non eget cultura respectu fructûs, iii. 3. Hab. in montibus Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur olim de flore masculo, vel ιουλῳ, (amento, *Bot.*) iii. 6. germinat initio veris, ib. καχρυωδης, Juliferus, *Bot.* (καχρυς id. quod ιουλος,) iii. 7. Hab. M. Tmolo et Olympo, iv. 6.

ΔΟΛΙΧΟΣ. *Diadelph.*

Arbores scandit, viii. 3. semina cito germinant, viii. 10.

ΔΟΝΑΞ. *Triandr.*

Spec. omnium maxime communis: λοχμωδης, i. e. fruticosus, (vid. Λοχμος,) iv. 12.

ΔΡΥΣ. *Monœc.*

Τραχυφλοιος, (cortice scabro,) i. 8. ακρορριζα, (radice superficiali,) βαθυρριζα, (unica profunda fusiformi,) i. 9 ευζωδης, (nodosa arbor,) item κραδαις obnoxia, (vid. Κραδη,) i. 13. foliis εντομας εχουσι, (lobatis *Bot.*) i. 16. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. Amentum βρυον vocatur, iii. 6. item καχρυς, iii. 7. primo vere apparens, ib. Species variæ, iii. 9.

1. δ. ἡμερις.	4. δ. φηγος.
2. δ. αιγιλωψ.	5. δ. ἁλιφλοιος.
3. δ. πλατυφυλλος.	6. δ. φελλος. vid. φελλος.

1. Sp. parva, humilis, ramosissima, sine trunco; ramis inflexis, iii. 9.

2. Sp. maxime procera et recta, cortice lævi, ligno ισχυρῳ, (solido,) in incultis crescens, ib.

3. Sp. inter primam et secundam proceritate et magnitudine; ligno ad usus architectonicos minus utili; ad carbones et igniaria prorsus inutili, utpote laxo et poroso, ib.

4. Sp. ουκ ορθοφυης, (fruticosa species,) ligno firmissimo, incorrupto, ramis numerosis; ἡ φυτεια περικομος, (capite rotundo, vel valde folioso,) ib.

5. Sp. trunco crasso, brevi, sæpius intus cavo; ligno minus utili; sine corde.

6. Sp. trunco erecto; cortice duplici. Quercus *Suber* L.

N. B. Gallæ 1mæ. spec. solum εις δερματα (ad usus coriarios) utiles. Spec. 2dæ. fert Lichenem Φασκον dictum. (vid. Φασκος.) Species hæc hab. in Ponto, iv. 6. lignum σκληρον και βαρυ, v. 5. sub aqua dulci durat; salsa tamen σηπεται, ib. Carbones optimi ad usum argentariorum. Divisiones Quercûs alibi, iii. 9, 10. sic notantur:

1. ετυμοδρυς, gl. dulci.
2. πλατυπυλλος gl. amara.
3. φηγος gl. rotunda.
4. οσπρις gl. rara, ineduli.

ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ: *Gynandr.*

Caule variegato, ut ſerpentis maculæ; radix bona ad *βηχας*, (tuſſes,) ix. 22.

E.

ΕΒΕΝΟΣ ἡ. *Diadelph.*

Lignum ponderoſum; enumeratur cum ligno Buxeo, i. 8. durities extrema, ut Loti, i. 10. Hab. India. Spec. duæ: prima; arbor ſpecioſa, ligno utili, quæ rara eſt: ſecunda fruticoſa, inutilis, iv. 5. lignum ſolidiſſimum, in aqua ſubſidens: gravitatis lignorum hi notantur gradus. 1. Εϐενος, πυξος. 2. Λωτος. 3. Μελανδρυον (Heart of Oak.) 4. Κυτισος (Cyt. Laburnum.) 5. Τερμινθος, v. 4. Lignum ασαπες, (ſine ſucco,) v. 5. Uſus ad morbos oculorum ſtatu arido, ακονῃ τριϐομενον, (ope cotis attritum,) ix. 22.

ΕΛΑΙΑ. *Diandr.*

Lign. αθραυςον, (tenax, Angl. "tough,") i. 8. ſine corde; ſecundum alios, totum cor, i. 9. radicibus ſcabris? nodoſis et θυσανωδεσι, (faſciculis fibrarum ad nodos, vid. θυσανοι,) ib. arbor nodoſa, ſpec. ſylveſtris tamen (Κοτινος dicta) nodoſior Ελαιᾳ, in trunco innaſcitur γογγρος, (vid. γογγρος,) i. 13. ſempervirens, i. 15. ςρεφονται τα ὑπτια (partes ſuperiores foliorum) μετα τροπας θερινας, (i. e. "the upper parts of the leaves turn up;") folia incana, anguſta, pediculo brevi, i. 16. fructus carnoſus, i. 17. oleoſus, i. 19. flos πεταλωδης, (petalis diſtinctis *Bot.*) i. 21. fructus ex ſurculis anni prioris; differentia maxima inter ſylveſtrem et cultam, (Κοτινον et Ελαιαν,) i. 23. inſitione propagatur, ii. 7. Κοτινος validior Ελαιᾳ, iii. 3. maxime abundat in Libya, Cyrenæa, iv. 3. ſpec. intermedia, ſterilis in India, iv. 5. Arbor celebris Athenis, iv. 14. maxime vivax, iv. 15. Cultura fit καλλιω, iv. 19. lignum ſolidum album, v. 4. optimum juxta radices, v. 5. amat maris littus, vi. 2.

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ. *Diœcia.*

Fruticoſa ſp. Αγνῳ vel Vitici *agno caſto* L. ſimilis, foliis Μηλεας,

ſed mollibus; floribus apetalis, ut Populi; καρπῳ ουδενι. Hab. in palude juxta Lacum Orchomenis, iv. 11.

1. ΕΛΑΤΗ. *Monœcia.*

Nunquam culta, i. 6. Procera ſpec. cortex πολυλοπος, (vid. λοπος,) i. 8. cor, vel medulla lignea, ολιγορριζα vel μονορριζα· απαραβλαστος, (non emittens ſurculos,) i. 9. mares nodi, flores fœminis; πενταοζος, (ramulis horizontalibus 4. uno erecto.) N. B. οζοι tumores ad baſin ramorum, qui apte dicuntur εμπεπηγοτες, i. 13. μονοστελεχης, (trunco ſimplici,) i. 14. ſempervirens, i. 15. foliis ακανθωδεσιν εξ ακρου, (apice pungentibus,) i. 16. arbor picea, i. 19. ανθει κοκκινῳ, vel forſan legendum κροκινῳ, ut apud quoſdam, (amento croceo *Bot.*) i. 21. propagatur ſemine ſolum, ii. 2. iii. 1. Hab. in M. Macedoniæ, iii. 4. floret vere, iii. 6. germinatio conſpicua δια το στοιχειν τα γονατα, και εξ ισου τους οζους εχειν; (de modo creſcendi regulari; angulos enim rectos cum trunco faciunt, nodis 4 invicem oppoſitis, pari intervallo,) iii. 6, 7. καχρυας εχει, (Iulum fert,) βαθυρριζος, iii. 7. nunquam pullulat poſt cæſuram, iii. 8. Genera 2: 1. E. αρρην. 2. E. θελεια. 1. Pin. *Abies* L. 2. P. *Picea*, (vid. Præfat.) εν κωνῳ του αρρενος, καρυα (femina) ολιγα επ' ακρον· ξυλον ινωδες κουφον· οζοι σκληροτατοι, iii. 10. amant umbroſa, iv. 1. decacuminatione moriuntur, iv. 19. decorticandæ vere, ut lignum diutius duret, v. 1. lignum fibroſum, ασαρκον, βαρυ, αδαδον (non inflammabile; opp. ligno πευκης,) οζοι κερατωδεις, (duri inſtar cornu;) trunci juniorum ad κεραιας (antennas) navium, v. 2. lignum proprium ad onera ſuſtentanda vi elaſtica, v. 7. etiam ad uſus navales ex levitate; et ad ædificandum, v. 8. reſina δακρυωδης (in guttis) ex vulnere ſtillat, ix. 1.

2. ΕΛΑΤΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Spec. προσγειος, (in æſtuariis, aut prope littus,) φυεται επι λιθοις και οστρακοις· ὁλη μορφη ορθη, (habitus totus erectus,) ſummitatibus etiam erectis, iv. 7.

ΕΛΕΒΟΡΟΣ. }
ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ. } *Polyandr.*

Amat loca frigida, iv. 6. pl. ναρθηκωδης, (caule fiſtuloſo,) cum

Conio, Fœniculo, &c. vi. 2. odor radicis gravis ſtomacho etiam in effodiendo, qua de cauſa Cepam prius comedunt, ix. 9. Spec. duæ: 1. E. μελας. 2. E. λευκος, quæ vel colore radicum vel foliorum differunt. Sp. prioris fol. δαφνωδη, "dark green;" poſterioris πρασωδη, "light or graſs green?" foliis *profunde inciſis*; caule ανθερικωδει, (vid. ανθερικος,) breviſſimo, ex corona radicis: επιγειοφυλλοις, (fol. radicalibus,) radicibus plurimis λεπταις; in quibus vis narcotica. Sp. 1. E. μελας, communis. 2. E. λευκος, rara: maxime in M. Oeta, Ponto, Elea, Maſſalia; in vineis. Creſcit item in M. Parnaſſo et in Ætolia, ſed vires deteriores, ix. 11, 15.

ΕΛΕΒΟΡΙΝΗ. *Gynandr.*

Ποαριον, (parvula ſpecies, herboſa,) foliis minimis; ſemen una cum ſucco Hellebori in uſu ὅπως ευεμεσῃ, (ut vomitum ſine dolore ciat,) vii. 6. Nulla deſcr.

ʽΕΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Tres Σελινου ſpecies apud Theophr. l. vii. 6. ʽΕλειοσελινον, ʽΙπποσελινον, Ορεοσελινον, (vid.) Spec. hæc hab. in rivulis, vel ductibus aquæ, μανοφυλλος, (foliis raris,) Σελινου ſimilis odore, ſucco, habitu, vii. 6. Semel occurrit.

ʽΕΛΕΙΟΧΡΥΣΟΣ. *Claſſ. incert.*

Pl. coronaria, cum Œnanthe, Anemone, &c. æſtate media florens, vi. 7. foliis tenuibus albidis; flore aureo; ſemine tenui, duro, (σκληρῳ,) radicibus horizontalibus. Planta boni ominis apud antiquos, ix. 21.

ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ. *Diandr.*

Ποωδης, (pl. herbacea,) inter non ſpinoſas, quas difficile eſt diſtinguere, cum Origano, Thymbro, Ciſto, &c. ponuntur Σφακος, Ελελισφακος, vi. 1. Σφακος vel Σφακελος ſpecies culta; Ελελισφακος ſpec. ſylveſtris, foliis magis ſcabris; odore graviori. (vid. Σφακος, Σφακελος,) vi. 2.

ʽΕΛΕΝΙΟΝ. *Claſſ. incert.*

Φρυγανον ξυλωδης, caule ligneſcente, foliis parvis, cum Siſym-

brio, Abrotano, et multis aliis, vi. 1. flore et foliis fragrantibus, ἁπλος τοις ειδεσιν, (nullæ occurrunt varietates?) vi. 6. Semina aiunt nunquam maturari Ελενιου, Ἑρπυλλου, Σισυμβριου, Μινθου, ſed ſurculis plantas propagari, falſo tamen, quia ſemen parvitate ſua latet, vi. 7. radicibus multis, divaricatis, ταρρωδεσι, (implicatis corbis modo, vid. ταρρος) lignoſis, ib.

1. ἙΛΙΞ. *Pentandr.*

Περιαλλοκαυλος, (planta ſcandens,) θαμνωδης, cum Smilace occurrit, ſine deſcriptione; videtur Hederæ varietas, vii. 8.

2. ἙΛΙΞ. *Pentandr.*

Κιττου (Hederæ) tertia ſpecies; varietates maximæ occurrunt reſpectu magn. foliorum et formæ anguloſæ: ἑλικος folia magis anguloſa, et foliis του Κιττου ſimilia; fructus rarus. Var. tres: 1. foliis læte viridibus. 2. foliis albis vel canis. 3. foliis variegatis. N. B. Hedera dicitur αποκιττουσθαι, quando per ætatem folia minus anguloſa fiunt, iii. 18.

ΕΛΥΜΟΣ. *Triandr.*

Ελυμος, Κεγχρος, Σησαμον παρ' αυτα, (diviſio ſeparata et habitu diverſa a frumentaceis et leguminoſis, σιτωδεσι και χεδροποις,) viii. 1. grana Ελυμου et Κεγχρου maxime durant, viii. 10.

ΕΝΘΟΥΣΙΚΟΝ. *Incertum.*

Semel occurrit in loco corrupto cum Caucalide et Ἡδυοσμῳ inter λαχανα inedulia, vii. 7.

ΕΠΙΜΕΝΙΔΕΙΟΣ. Vid. Σκυλλα.

ΕΠΙΠΕΤΡΟΝ. *Claſſ. incert.*

Ὁλως ανανθες! Flores inconſpicui *Bot.* Semel occurrit, vii. 8.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ. *Diadelph.*

Leguminoſus, viii. 1. οψισπορος, ib. πλαγιοκαυλος, (caule ramoſo,) viii. 3. legumen rotundum, viii. 5. prominens hilum *Bot.* ex ſemine, ut in Vicia, *Faba* L. ib. Spec. tres: 1. E. μελας. 2. E. λευκος. 3. E. πυῤῥος, quorum poſterior ſero ſerendus; in udis lo-

cis, viii. 6. omnium leguminoforum citiffime fructum perficit, viii. 7. amat terram mollem, levem, (ψαφαρην) viii. 9. illæfus vermibus ob amaritudinem, viii. 10. N. B. Species occurrit fub nomine Κερασβολον, ita dict. ob duritiem feminis. De Cauf. Pl. iv.

ΕΡΕΙΚΗ. *Octandr.*

Ακροκαρπος, (flores et femina in apicibus ramorum,) femel occurrit, i. 23.

ΕΡΙΝΕΟΣ. *Polygam.*

Sylveftris fpec. της Συκης, i. 24. fed plane diverfa, nec cultura mutans: accuratiffime, Ficus enim genus Triœcium. Mutatio Ερινεου in Συκην dicitur portentofum effe, i. 4. Ερινεα προαπτωτα, (fructus fc. mas Ερινεου) comparantur amento Quercûs, Pinûs, &c. pullulat primo vere, iii. 6. Sexus Ερινεου et Συκης diftinguitur, iv. 14. Lignum excellens ad εργα πολυτελη, v. 7.

ΕΡΙΟΦΟΡΑ. *Monadelph.*

Foliis vitis; Pericarpium εν ῳ το εριον, (in quo goffypium continetur,) ἡλικον μηλον εαρινον, (magnitudine mali verni,) συμμεμυκος, (apice connivens,) ὁταν δε ωραιον ῃ, (quando maturatur,) εκπεταννυται, (expanditur,) και εξαιρεται το εριον, (et aufertur goffypium.) N. B. Defcriptio accurata admodum. Hab. India, Arabia, iv. 9.

ἙΡΠΥΛΛΟΣ. *Didyn.*

Sempervirens, i. 15. φρυγανικος; caule lignofo, foliis parvis, vi. 1. Pl. coronaria, cum Ἑλενιῳ enumerata, ὡς ἁπλος τοις ειδεσιν· etiam ὡς αγρια φυσις αυτου: floret maxime fine cultura. Hab. M. Hymetto, Athenis, &c. &c. montes totos operit, vi. 6, 7. Radix επιπολαιος, et in fpatium longum repens, vi. 7. ταρρωδης, (vid.) ξυλωδης, ib. Duæ fpec: 1. E. ορεινη. 2. E. ευοσμος, apud fylveftres ολιγο-ὑδροτατος, ib.

ΕΡΥΘΕΔΑΝΟΝ. *Tetrandr.*

Φρυγανικον, ακανθες, (frutex inermis;) plures numerantur genera, quæ funt difficilia feparari, ex habitu, et varietate foliorum;

vi. 1. radix rubra, vii. 9. foliis Ωχρου, Pisi *Ocbri* L. sed rotundioribus, κυκλιδον (habitu verticillato, *Bot.*) caulis repens; vires diureticæ, ix. 14.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ. *Tetradyn.*

Cum Sesamo enumeratur, foliis sine nervis, vel venis, viii. 3. caulis subfistulosus, ib. semen non comeditur crudum, utpote nec Lupini; spec. affinis Σησαμου, et oleo abundans, viii. 7.

ʽΕΣΠΕΡΙΣ.

Νυκτος οζει μαλλον, unde nomen. Desc. nulla. De C. Pl. vi.

ΕΥΥΜΟΔΡΥΣ. Vid. Δρυς. *Monœc.*

ΕΥΒΟΙΚΗ. Vid. Καρυα. *Monœc.*

ΕΥΖΩΜΟΝ. *Didynam.*

Cum Ocymo enumeratur, rad. lignosa, i. 9. επισπορος, (sp. sæpius serenda in anno?) vii. 1. radix lignosa, vii. 3. semen durat, vii. 6.

ΕΥΗΠΑΤΟΝ. *Pentandr.*

Syn. Στρυχνου, (vid. Στρυχον,) vii. 7.

ΕΥΩΝΥΜΟΣ. *Class. incert.*

Arbor Punicæ *Granati* L. flore et foliis similis. Ex insula Lesbo; odor floris gravis, iii. 18.

Z.

ΖΕΙΑ. *Triandr.*

Σιτωδης, (frumentacea, spec.) πρωισπορος, (primo sationis tempore serenda,) viii. 1. multis et profundis radicibus; multicaulis: καρπος κουφοτατος, (spica maxime paleacea,) προσφιλης πασι τοις ζωοις, (pecoribus omnibus gratissima,) viii. 9.

ΖΥΓΙΑ. *Monœc.*

Hab. montibus Macedoniæ, iii. 4. germinat ante equinoctium

vernum, iii. 6. ευαυξης, (cito crefcit,) iii. 7. hyeme cæditur, v. 1. lign. σκληρον, (durum, fragile,) v. 4.

H.

ʽΗΔΥΟΣΜΟΣ. *Claff. incert.*

Cum Ενθουσιακῳ femel occurrit, vii. 7.

ʽΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ. *Pentandr.*

Επετειοκαυλος, (caule quotannis fefe renovante,) vii. 8. fucceffive floret, vii. 9. fempervirens, vii. 10. flos ακουλουθει τα αςρα, (annon το αςρον Solem?) inde nomen.

ʽΗΜΙΟΝΟΣ ἡ. *Cryptog.*

Φυλλοις σκολοπενδρου, (pinnis fc. denfe ftipatis utrinque, ut Scolopendri pedes?) radix tenuis: vires in morbis fplenis, ix. 19.

ʽΗΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ. *Monœc.*

Foliis εντομας (ferraturas) εχων cum Πτελεᾳ, i. 16. Julifera arbor, iii. 7, 8. Sp. duæ: 1. H. αγρια, Corylus *Avellana* L. φυλλοις κεχαραγμενοις, (ferratis;) καρπιμωτερος, καταχοπτομενος τας ῥαβδους· καρπος ςρογγυλος· πολυκαρπος, εν ταις φοραις· ῥαβδοις ανευ μασχαλων, (furculis fimplicibus, non ramofis.) Sp. 2. H. ἡμερα, καρυῳ προμακρῳ, εκλευκοτερῳ, (pulvere fc. farinaceo ad bafin nucis,) Corylus *Colurna* L. Ang. "Filbert," iii. 15. φλοιῳ ιδιας ςιγμας λευκας εχοντι. N. B. Optime de cortice maculato, Coryli, ib.

ʽΗΡΑΚΛΕΙΑ. Vid. Μηκων. *Polyandr.*

ΗΡΙΓΕΡΩΝ. *Syngen.*

Pl. κιχωριωδης: inter λαχανα, αρουραια vocata, foliis Cichorii, vii. 7. floret longum tempus, primo vere εκκαυλει, και ανθει· ορθοκαυλος και νευροκαυλος, vii. 8.

Θ.

ΘΑΨΙΑ. *Pentand.*

Planta venenosa; odor idcirco vitandus in colligendo, ix. 9. vires medicinales in radice et succo; pars radicis dicitur vomitum ciere, pars alia purgare alvum; foliis Fœniculi, sed amplioribus; caule fistuloso; radice alba, ix. 10. emetica; succus *ὑπωπιας αιρει*, (sugillationes.) Hab. Attica.

ΘΕΡΜΟΣ. *Diadelph.*

Annon dantur sylvestres et cultæ species? i. 6. enumeratur cum Capparide, ib. semen *εκ ὑλῃ βαθειᾳ*, (in densa materie, remotum à terra,) radicem emittit et germinat, i. 12. non eget cultura; cum Capparide et Σιλφιῳ, iii. 3. immediate ex *ἁλῳ* serendum, viii. 1. *βλαςανει (το σπερμα) εκ του αυτου*, (radiculam, et plumulam, *Bot.* ex eodem puncto profert. Vid. Monocotyled. *Bot.*) viii. 2. semen inedule sine coctione? viii. 7. semen durat, viii. 10. De Caus. Pl. iii. 4.

ΘΗΛΥΚΡΑΝΕΙΑ. *Tetrandr.*

Hab. in Macedoniæ montibus, iii. 4. germinat *προ Ζεφυρου*, (vere primo?) iii. 6. differt a Κρανειᾳ *μαλακοτητι* foliorum, cavitate ligni medullari, et fructûs magnitudine: plures baccæ ex communi pediculo umbellatim dispositæ, inedules, (vid. Κρανεια,) radices validi, iii. *ουκ οζωδεις, ὡς κρανειας*, i. 13.

ΘΗΛΥΠΤΕΡΙΣ. *Cryptog.*

Φυλλον μονοκωλον, (simplex, sine lobis, *Bot.*) radix magna, nigra; remedium vermifugum, præcipue adversus tænias, vino vel melle sumptum, ix. 20.

ΘΗΛΥΦΟΝΟΝ. Vid. Σκορπιον.

ΘΗΣΕΙΟΝ. *Class. incert.*

Radix gustû amara; alvum solvit; enumeratur cum Aro, Dracontio, et Xiphio, vii. 11.

ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ. *Pentandr.*

Radix επιπολαιοτη, (forſan quia creſcit in udis ?) enumeratur cum Κοκκυμηλεᾳ et Σποδιᾳ, iii. 7. radices numeroſæ; amat maxime umbroſa loca, iv. 1. una cum Taxo et Pado.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ. *Syngen.*

Caulis folioſus, i. 16. ſuccus υδαρης, i. 19. επισπορος (ſpec. culta; bis, vel ſæpius ſerenda,) vii. 1. παπποσπερμος, (ſemine papoſo *Bot.*) Spec. duæ: 1. θρ. λευκη. 2. θρ. μελαινα, quarum prior γλυκυτερα, απαλωτερα, vii. 4. Cultæ var. θρ. λευκης tres, ib.

1. θρ. πλατυκαυλος.
2. θρ. ϛρογγυκαυλος.
3. θρ. Λακωνικος.

Caules prioris latiſſimi adeo ut θυραις κηπωρικαις inſerviant. Spec. tertiæ folia σκολυμου. Var. Θριδακινης μελαινης reſpectu foliorum, ib.

1. θρ. πυκνοφυλλος.
2. θρ. ουλοφυλλος.
3. θρ. δασυφυλλος.
4. θρ. μανοφυλλος.

Reſpectu caulis, ib.

1. λευκοκαυλος.
2. πορφυροκαυλος.
3. ποικιλοκαυλος.

N. B. Inſectum Πρασοκουρις dict. Θριδακινη proprium, vii. 5.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ ΑΓΡΙΑ. *Syngen.*

Φυλλοις βραχυτεροις, caulis per maturitatem ακανθουται, (ſpinoſus fit,) ſuccus auſterus, medicinalis; habitat inter ſegetes. Uſus in hydrope levando, et in morbis oculorum, vii. 6.

ΘΡΙΔΑΞ. *Syngen.*

Differentia in caulibus παλιβλαϛοις, (vid.) vii. 2. βραχυρριζα, vii. 3. melius ex ſemine, (ου μεταφυτευθεισα,) vii. 5. papoſo ſemine, vii. 3. Forſan ſyn. Θριδακινης αγριας.

ΘΡΥΑΛΛΙΣ. *Pentandr.*

Inter ανθουντας κατα μερος, (quæ in ſpica vel thyrſo florent

fucceffive,) cum Plantagine enumeratur, et femel occurrit fine defcriptione, vii. 10.

ΘΥΙΑ. }
ΘΥΙΟΝ. } *Monœc.*

Sempervirens, i. 15. οψικαρποτερος παντων, iii. 6. cum Taxo, ib. Hab. in cacuminibus montis, iv. 1. habitus Cupreffi; foliis, ramis, trunco; etiam fructu: frequens in Cyrenæa, regione prope Ammonis templum: lignum incorruptibile; radicis præcipue, ex qua fimulacra et alia pretiofa, v. 5.

ΘΥΜΒΡΑ. }
ΘΥΜΒΡΟΝ. } *Didynam.*

Succus δριμυς, (aftringens, pungens,) i. 19. Inter perennes, ακακανθους, (fine fpinis,) cum Origano, Thymo, &c. vi. 1. differt a Thymo, ότι σπερμα εχει φανερον, abfimile Θυμῳ, (fed hic error notandus, ambo enim gymnofpermæ, fed Thymi femina minutiffima,) vi. 2. Seritur τριτῳ αροτῳ menfe Maio, vii. 1. Semina durant, vii. 6.

ΘΥΜΟΝ. *Didynam.*

Succus fimilis Thymbræ δριμυς, i. 19. femen invifibile, (ώς ανθος μονον,) iii. 2. Frequentiffime in defertis Libyæ, iv. 4. Spec. duæ: 1. Thymus alba; 2. nigra: ambo floribus luxuriant æftate: flores apibus gratiffimi: femen minimum, calycibus occultatum, vi. 2.

ΘΥΜΟΝ ΛΙΘΟΕΙΔΕΣ. *Coral.*

iv. 8.

I.

ΙΑΣΙΩΝΗ. *Pentandr.*

Monopetala: ανθος διαγραφην εχον, μονον ον, των πλειονων, (etfi flos monopetalus fit, expanfionem habet floris polypetali *Bot.*) i. 21.

ΙΔΑΙΑ. Vid. Αμπελος.

ΙΔΑΙΑ. Vid. Πευκη.

ΙΚΜΗ. }
ΙΚΑΜΗ. } *Claſſ. incert.*

Planta paluſtris in lacu Orchomeni, cujus deſcriptio nulla, iv. 11.

ΙΞΙΑ. *Diœcia.*

In trunco Quercûs, iii. 9. amat Boreale latus, iii. 15. Spec. gummoſa, ix. 1. De C. Pl. ii. 5.

ΙΞΙΝΗ. *Claſſ. incert.*

Forſan Cardui ſp. ſic dicta, vi. 3. ῥιζοφυλλος, (radicem ex folio agens,) et ex folii medio ακανον, (pericarpium ſpinoſum, vid. ακανος) producens, magnitudine mali, foliis involutum, vi. 4. Gummi Maſtiche ex caule, ix. 1.

ΙΟΝ. *Syngen.*

Sempervirens, i. 15. Spec. duæ: 1. Ιον λευκον. 2. Ιον μελαν, vi. 6. Ιον μελαν, ſæpe uno verbo Μελανιον, differt ab Ιῳ λευκῳ, ὁτι πλατυφυλλον, εγγειοφυλλον και σαρκοφυλλον εϛι, ib. ευοσμοτερον τȣ λευκου, ib. item vi. 7. N. B. Vid. infr. Ιωνια.

ʹΙΠΠΟΝ. }
ʹΙΠΝΟΝ. } *Claſſ. incert.*

Planta paluſtris cum priore enumerata, et ex eodem lacu, ſed diverſa. N. B. Si ex nomine ʹΙππος conjicere liceat, forſan Hippuris, vel Equiſetum L. ambo fluviatiles.

ʹΙΠΠΟΜΑΝΗΣ. Syn. Τιθυμαλλου. ix. 15.

ʹΙΠΠΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδες, νευροκαυλον, (caule fiſtuloſo, ſtriato,) ſemel occurrit, vi. 1.

'ΙΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. radix carnoſa, vii. 3. magnitudine differt ab 'Ελειοσελινῳ: caulis maximus; radix magnitudine Rhaphani *ſativi*, nigra: ſemina nigra ſimilia Ορoβου, ſed majora; folia ſimilia 'Ελειοσελινου, δασεα, &c. (pubeſcentia) vires diureticæ, vii. 6. ſuccus gummoſus in radice, ut Scammoniæ, ix. 1.

'ΙΠΠΟΦΕΩΣ.
'ΙΠΠΟΦΥΟΝ. } *Tetrandr.*

Planta ſpinoſa, cum Τριβολῳ, Ονωνιδι, vi. 3, 4. Vid. Φεως, etiam φυσεος ακανθικης et deſc. vi. 3. differt a φλεως. Vid. *Triandr.*

ΙΡΙΣ. *Triandr.*

Æſtate floret, vi. 7. cum Ασφοδελῳ enumeratur; folio καλαμωδεςερῳ, (anguſtiore et rigidiore?) καυλῳ ανθους μονον (pl. acaulis, ſcapo prædita *Bot.*) ſed minore et rigidiore; radix optima, ſuaveolens, iv. 6. ix. 7.

ΙΣΧΑΙΜΟΣ. *Polygam.*

Ex India; ſpec. cujus vires ſtypticæ mirabiles. Deſ. nulla, ix. 15.

ΙΣΧΑΣ. *Claſſ. incert.*

Plant. pharmaceutica: radix emetica et cathartica, cum Θαψιᾳ enumeratur; foliis rutaceis, parvis; caulibus repentibus 3. vel 4. radice Aſphodeli, ſed λεπυρωδει, (tunicata.) Hab. in montoſis et calcareis locis, ix. 10.

ΙΤΕΑ. *Diœcia.*

In paludoſis, i. 17. (βραχυςελεχης) lign. leve, i. 8. βλαςανει απο παρασπαδων, (ſurculos emittit,) iii. 1. ωλεσικαρπος, (ſemina copioſiſſime per aerem ſpargens. Hom. Il. vid. ωλεσικαρπος) iii. 2. πρωιβλαςος, (primo vere germinans,) iii. 6. ευαυξης, (cito creſcens,) iii. 7. πολυειδης (var. plurimæ.) 1. I. μελας, cortice ſubnigro, φοινικῳ, (atro rufo.) 2. I. λευκη, cortice albo. 3. I. ἑλικη apud Arcades καρπῳ γονιμῳ, (opponitur ωλεσικαρπω, ſc. fructum *immaturum* ſpargens, ſecundum Theophr.) iii. 13. ſpec. peculiaris in Hæmo monte, iv. 7. In palude Orchomeni lacûs, iv. 11. βραχυβιος, iv 14. arbor ſucciſa Philippis iterum ſur-

texit, iv. 19. ſcutis faciendis, opus textile ſc. v. 8. ſed et ex ligno ipſo, quod συμμυει πληγεν, (quando perforatur coaleſcit,) v. 5.

ΙΦΥΟΝ. }
ΙΦΥΣΟΝ. } *Didynam.*

Inter flores coronarios æſtivos, cum Iride, Lychni, &c

ΙΨΟΣ. *Incertum.*

Omnium οψιζλαςοτατος cum Aria et Τετραγωνια, iii. 6. Semel occurrit.

ΙΩΝΙΑ. *Syngen.*

Spec. duæ: 1. λευκη, ſpec perennis annos tres durans, ætate ελαττουμενη, λευκοτερη, vi. 7. 2. μελαινα αχλον,ιος (non ramoſa) προσριζοφυλλος· αειφυλλος διολε φερων το ανθος, (ex omni parte florens,) vi. 6. Vid. Ιωνια Lex. Theophr. N. B. Ex locis ſupradictis, ubi ſolummodo occurrit vox hæc, colligi poteſt vocem Ιωνια plantam ipſam æque ac Violetum indicare. Vid. Ῥοδωνια, Κρινωνια, Lex. Theophr.

K.

ΚΑΔΥΤΑΣ. *Claſſ. Incert.*

Βοτανον Συριακον, ſuper truncis arborum. De C. Pl. ii.

ΚΑΚΤΟΣ. *Icoſandr.*

Hab. in Sicilia ſolum; omnium maxime ſingularis planta; immediate ex radice emittit caulem peculiarem, κακτον vocatum, latum, denſum, ſpinis obſitum; cocti hi et decorticati, edules ſunt, et conſervantur in ἁλμη, "brine." Ex cacto hoc alius aſſurgit caulis, vocatus περνιξ, edulis etiam; in quo ſita eſt fructificatio ſpinoſa, pappo involuta, Palmæ εγκεφαλῳ ſimilis, quæ vocatur σκαλια, vi. 4.

ΚΑΛΑΜΟΣ. *Triandr.*

Ινοφλοιος, (cortice fibroſo,) μονολοπος, (cortice ſimplici,) γονατω-

δης, (caule nodoſo.) i. 8, 10. μητρα ὑμενωδης, (pars interior membranis diviſa,) i. 9. radice fibroſa, i. 10. γωνιοφυλλος, (nervo acuto longitudinali prominente,) (vid. γωνια) i. 16. λοχμωδης, (vid.) cum Cypero, iv. 9. Species Calami quinque: 1. K. αυλητικος. 2. K. πλοκιμος. 3. K. χαρακιας. 4. K. ζευγιτης (affinis K. χαρακιας, ſi non idem, ex arefactione lacûs proveniens.) 5. K. βομβυκιας, qui omnium aridiſſimus, folio latiore, et magis cano, iv. 11. ſpica minore. Diſſertatio de K. αυλητικῳ et methodo fiſtulas formandi, in hoc capite occurrit: optimi ex Cephiſo flumine. Diviſio alia: 1. K. πυκνος. 2. K. μανος. 3. K. κοιλος (συριγξ voc.) 4. K. ϛερεος, (πληρης) 5. βραχυς. 6. ὑψηλος. 7. παχυς. 8. λεπτος. 9. πολυφυλλος. 10. ολιγοφυλλος. 11. μονοφυλλος. 12. K. δοναξ, maxime communis ſpec. et maxime lignoſa. 13. K. τοξικος, ſpec. peculiaris; arcubus, an potius ſagittis proprius. 14. K. Λακωνικος (variegatus.) 15. K. επιγειος, ſpec. repens, folio ſaligno, ad ſpicula propria. Hab. fluvio Aceſine, iv. 12. folia amplexicaulia, vi. 2.

ΚΑΛΑΜΟΣ. Σχοινος, (vid. Σχοινος,) ix. 7.

ΚΑΠΝΙΟΣ. Vid. Αμπελος.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ. *Polyandria.*

Nunquam colitur, i. 6. iii. 3. foliis et caule ſpinoſis, vi. 3. foliis ſpinoſis; radice ſimplici; caule repente: æſtate florens in arenoſis, vi. 5. επετειοκαυλος, (perennis,) vii. 8.

ΚΑΡΔΑΜΟΣ. }
ΚΑΡΔΑΜΟΝ. } *Tetradyn.*

Succus auſterus, i. 19. planta λαχανωδης, cum Ανηθῳ, Κοριαννῳ, εν πρωτοις αροτοις (olera quæ ſeruntur hyemali ſolititio,) vii. 1. genus ſimplex, vii. 4. ſemen durat, vii. 6.

ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

N. B. Planta forſan Καρδαμωμος: ſed unguentum ſolum memoratur inter aromata, ix. 7.

ΚΑΡΥΑ. *Monœcia.*

Περσικη. }
βασιλικη. } Syn. Juglandis, *Regiæ.* L.
Ευβοϊκη. }

Ξυλον ασαπες, (incorruptum,) v. 5. item in aqua durans; cum Οξυη, (Fago,) ib. item v. 8. optimum ad carbinationem, iii. 7. arbor non germinat ex apice ſurculorum; ſed *εκ των πλαγιων προωθειται αυτο το υπαρχον, ωσπερ και αυτο το στελεχος,* (ex lateribus propelluntur incrementa, pari modo, ac in trunco evenit,) iii. 7. Carbones optimi ex ligno hujus arboris, v. 10. Fructus maturatur *μετ' οπωρον,* (ineunte hyeme,) iii. 6. *το Καρυον* pro nuce arboris? iv. 6. Hab. Tmolo, et Olympo Myſio, ib.

ΚΑΣΙΑ. *Enneandr.*

Cum Σμυρνη et Ολιβανω, in Arabia; ſpec. ramoſiſſima; ramulis parvis, ſed latioribus Cinnamomo; cortice fibroſo ligno firmiter adhærenti: vires eædem cum Cinnamomo; methodus ſingularis partem interiorem ſurculi deſtruendi, ope vermium, ix. 4.

ΚΑΥΚΑΛΙΣ. *Pentandr.*

Oleris genus; ſemel cum Ανδρυαλια, Ὑποχοιριδι, &c. vocantur *κιχωρη,* quia foliis ſimilibus inſtruuntur; deſc. nulla.

ΚΕΑΝΩΘΟΣ. Vid. Ακανθα. *Syngen.*

Ῥιζα γονατωδης, (nodis abundans) *εξ εκαστου γονατος αφιησι ανω βλαστον, και κατω ριζαν;* ſed non *καλαμωδης,* iv. 11.

ΚΕΓΧΡΟΣ. *Polygamia.*

Hymenoſpermus, cum Πυρω, i. 18. *ανωνυμος κοινη προσηγορια,* (differens habitu, etſi cum *σιτωδεσι* conjunctus,) viii. 1. cum Ελυμω et Σησαμω, ib. ſeritur æſtate ineunte, *μη δυναμενος φερειν τον χειμωνα,* ib. *καυλος καλαμωδης,* viii. 3. *πολυκαρποτατος,* (ſeminibus maxime abundans,) ſemina durant, viii. 10.

KΕΔΡΙΣ. } Diœcia.
KΕΔΡΙΑ.

Θαμνωδης (fruticosus;) τι μικρον, ὁ ου δενδρουται, i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ. *Diœcia.*

Ξυλου φλοιος ασαρκης, i. 8. sempervirens, i. 15. foliis apice acuminatis, i. 16. radice superficiali, iii. 7. Gen. duo: K. λυκια. K. φοινικη. ambo similes Juniperi, sed differunt foliis magis pungentibus, et rigidis. Alii distinguunt ita. 1. Κεδρος. 2. Οξυκεδρος. Lign. incorruptum το πλειστον εγκαρδιον, (totum fere cor,) rubri coloris, *fragrans*; bacca flava, myrti magnitudine, fragrans, gustu dulcis; annum totum in arbore durans: trium annorum proventûs simul [illegible]ore, προπερυσινος, περυσινος, νεος: cortice Cypressi, sed magis scabro. Hab. in montosis, saxosis, iii. 12. in montibus Thraciæ, iv. 6. et Phryg. ib. εαν επικοπη το ακρον, φθειρεται, iv. 19. Statuæ fiebant ex ejus ligno, v. 5. Lignum minime ponderosum et ad navalia utile, v. 8. Cedri in Syria magnitudine tali, ut tres homines amplecti nequeant: long. 13 ulnarum, ex quo ενδεκηρης ναυς, (navis quindecim-remis,) an Cedr. *Libani* L.? v. 9. οπος δακρυωδης, (succus resinosus.)

ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΝ. *Syngen.*

Succo amaro, cum Αψινθιω, i. 19. amat frigida loca, iv. 6. folia amara, sed utilia, vii. 9.

ΚΕΝΤΑΥΡΙΣ ΤΡΙΟΡΧΙΣ. *Class. incert.*

Planta spinis venenosis, ut videtur, ix. 9.

ΚΕΝΤΑΥΡΙΣ.

An idem cum Κενταυριω? radix crassa, pinguis, ix. 15.

ΚΕΝΤΗΡΙΑ. *Class. incert.*

Syn. ατρακτυλιδις; (a κεντεω) οπος αἱματωδης.

ΚΕΝΤΡΟΜΥΡΡΙΝΗ. *Diœcia.*

Επιφυλλοκαρπος, (fructificatione super folium,) una cum Δαφνη Αλεξανδρεια; ambo Rusci L. iii. 17.

ΚΕΡΑΣΒΟΛΟΝ. Vid. Ερεβινθος.

ΚΕΡΑΣΟΣ. *Icofandr.*

Ορθοφυης, (procera arbor) μεγεθει μεγας· και γαρ εις τετσαρας και εικοσι πηχεις, (fc. circumferentia ramorum,) circumferentia trunci ipfius διπηχυς: lignum durum valde; cortex fimilis Tiliæ et ad eofdem ufus; methodus peculiaris decorticandi, adeo ut pars interior illæfa maneat, iii. 13. flos albus, Pyri fimilis, εκ μικρων ανθων συγκειμενον, (umbella ex multis floribus, κηρωδης, (quorum fuperficies plana favi aperturas imitatur; vid. Lex. Theophr.) fructus rubri coloris, Diofpyri fimilis; magn. Κυαμου, (Pifi antiquorum.) N. B. Italis "Marafchino?" (nucleus Διοσπυρου, σκληρος; Cerafi, μαλαχος.) Hab. in irriguis ad ripas fluvium, iii. 13. arbor gummofa, ix. 1.

ΚΕΡΚΙΣ. *Decandr.*

Arbor Populi albi fimilis canitie foliorum: fofium Hederæ fimile; αγωνιον εκ του αλλου, μερους? (vid. γωνια,) την δε μιαν, (γωνιαν,) venam fc. intermediam folii prominentem, (προμηκη,) color fuperioris et inferioris folii partis idem; pedunculis foliorum longis, tenuibus, unde folia inclinantur; cortex fcaber, maculatus, iii. 14. N. B. Forfan fpec. alia *Claff. incert.*

ΚΕΡΩΝΙΑ. *Polygam.*

Fructus in filiqua, i. 18. fructificatio in apicibus, i. 23. arbor in Ionia fic dicta? ex caudice fummo fructificans; item ex apicibus, iv. 2.

ΚΗΛΑΣΤΡΟΝ. }
ΚΥΛΑΣΤΡΟΝ. } *Pentandr.*

Frutex fempervirens, i. 15. incultus, i. 6. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructus ante hyemem decidit, iii. 6. amat frigida loca, iv. 1. cum Junipero; ufus ad baculos, "the Staff-tree," Ang. v. 3.

ΚΗΡΙΝΘΟΝ. *Pentandr.*

Inter flores æftivos cum Lychnide, et Diantho *Armeria.* Defc. nulla, vi. 7.

KINNAMΩMOΣ. *Enneandr.*

Hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. Fruticofa fpecies, ib. cum Olibano et Cafia enumeratur, ix. 4. frutices ambo ramulis Viticis, *Agni cafti* fimilibus; cortex furculorum optimus, ix. 5. inter aromata recenfetur, ix. 7.

KIΣTOΣ. *Polyandr.*

Φρυγανον ανακανθες, (frutex inermis,) cum Spiræa, Cneoro, &c. vi. 1. Spec. duæ: *αρρην. θηλυς*. 1. folio majore, rigidiore, magis nitente; flore purpurafcente, haud abfimili flore Rofæ, *caninæ*; *αμφω αοσμοι*, vi. 2.

KITTOΣ. *Pentandr.*

Frutex, i. 4. fempervirens, folia juniora angulofa; annofa, fubrotunda, i. 15. pedunculis longis, ib. flos ftamineus, i. 21. peculiari modo, i. 22. *δενδρουται χαρακος παγουσης*, (fi palum admoveas, brevi crefcet fine fulcro.) (N. B. Hoc expertus fum,) ii. 1. bacca inedulis, iii. 6.

Genera 3: 1. K. *λευκος*. 2. K. *μελας*. 3. K. *ἑλιξ*. Spec. 1ma. baccis albis? 2da. foliis minoribus, fructu laxe corymbofo, vel in fphæram collecto, (*κορυμβια* dict.) fpec. fecunda minus variat. fpec. tertia (*ἑλιξ*) maxime ab aliis differt parvitate, et *ευρυθμια* foliorum, et raritate fructûs; *ουκ αποκιττουται*, (non habitum amittit, vid.) Spec. Ἑλικος tres. 1. Ἑ. *χλοερα, η ποωδης*. 2. Ἑ. *λευκη*. 3. Ἑ. *ποικιλη*, vel Thracica. *Κιττος εκ των βλαστων αφιησιν αει ριζας ανα μεσον των φυλλων, αἱς, ὡσπερ ενδυεται τοις δενδροις, και τοις τειχιοις*, (radiculæ caulinæ,) bacca *Κιττου λευκου επιγλυκυς*; *Κιττου μελανος, σφοδρα πικρος*, iii. 18. lign. *θερμον*; opp. *ψυχρῳ*.

Κιττου λευκου σπερμα προς το γονιμον ειναι, (adverfus fterilitatem,) ix. 19.

KIXΩPION. }
KIXΩPH. } *Syngen.*

Folia radicalia, i. 16. *λαχανον αρουραιον*, (culta? an inter fegetes?) vii. 7. vere caulefcit et floret, vii. 8. *επικαυλοφυλλος, ἁμα ταις εκφυσεσι ακρεμονικαις*, (fimul ex divaricatione ramorum ad apices,) *εκφυει και τ' ανθος*, (florem producit,) vii. 9. fucceffive

floret, vii. 10. caulis magnus, ad apicem αποφυσεις emittens, radice magna, vii. 11.

ΚΛΗΘΡΑ. *Monœc.*

In humidis æque ac in aridis, i. 7. in planis Macedoniæ, iii. 4. quibusdam in locis ακαρπος, iii. 5. βλαςανει μετα ζεφυρον, (fructificat autumno,) iii. 6. cito crescit, iii. 7. Sp. simplex, sterilis; lignum molle, medulla intus; surculi tenues, cavi intus: folia Pyri, sed majora, et magis nervosa: cortex scaber; interior ruber, tinctorius: radices super terram, in aquosis, iii. 14. cum Salice, iv. 9.

ΚΛΥΜΕΝΟΝ. *Diadelph.*

Pl. medicinalis; καρπος colligendus primo mane πριν ἡλιον επιβαλλειν, ix. 9. radix ad abortiones, ix. 19.

ΚΝΕΩΡΟΝ. *Octandr.*

Frutex crassifolius, i 16. ανακανθης cum Cisto, Spiræa, &c. vi. 8. Spec. duæ: 1. K. λευκον. 2. K. μελαν. Sp. 1ma. foliis coriaceis, oblongis, Oleæ foliis similibus. Planta humilis, fragrans. Sp. 2da. foliis Myricæ; habitus elatior, odor nullus: florent ambo æquinoctio autumnali: flos durat; radices magni; ramuli densi, vi. 2.

ΚΝΗΚΟΣ. }
ΚΝΙΚΟΣ. } *Syngenes.*

Flos femini insidet, i. 22. ακανθωδη φυσιν εχει, (in ceteris partibus spinosa est,) το δε σπερματικον, (ακανον, pericarpium) ουχ ὁμοιως, (non similiter spinosum,) vi. 3. αποφυσεις εχει, (caulis supra ramosus,) ib. Spec. duæ: 1. K. αγρια. 2. K. ἡμερα. Prioris etiam sp. duæ. 1ma. ευθυκαυλοτατη; adeo ut πηνιοις (fusis) mulieribus inserviat; καρπῳ (pericarpio) magno, nigro, amaro. 2da. villosa, caule Sonchi; foliis procumbentibus, vi. 4.

ΚΟΙΞ. *Monœc.*

Καλαμοφυλλος, i. 16. Planta bulbosa; recte Κοϊξ scribitur sed Ald. Lect. κυιξ. fors. vox Ægyptia?

ΚΟΚΚΟΣ ΚΝΙΔΙΟΣ. *Claſſ. incert.*

Fructus rotundus, ruber, grano Piperis major, ισχυροτερος πολυ τη θερμοτητι, adeo ut ſuccus urat fauces: an Capſicum, *baccatum?* ix. 22.

ΚΟΚΚΥΓΡΙΑ. *Pentandr.*

Cum Arbuto et Andrachne enumeratur; foliis Ανδραχνης, δενδρον μικρον· καρπος εκπαππουμενος, (fructificatione *pappoſa*,) ιδιον τουτο, (peculiare hoc eſt,) ουδ᾽ αφ᾽ ἑνος ακηκοαμεν αλλου δενδρου; recte, iii. 16.

ΚΟΚΚΥΜΗΛΕΑ. *Icoſandr.*

Fructus carnoſus, i. 18. ſuccus fructûs aquoſus, i. 19. flos quinquepetalus, i. 21. ſuperus, i. 22. radices ſuper terram numeroſæ, iii. 7. arbor maxima; Meſpili habitu: πυρηνι στρογγυλω, (bacca rotunda,) floret vere; maturat fructum Octobri; arbor ſempervirens. Hab. Thebais.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ. *Monœc.*

Cum Cucumere enumeratur, ſuccus υδαρης, (aquoſus,) i. 19. flores ſuperi, i. 22. ſemen pullulat 6 vel 7 diebus, vii. 1. βραχυρριζα, vii. 3. varietates plurimæ; ſemina non durant longum tempus, vii. 6. inter culta numeratur.

ΚΟΛΟΥΤΕΑ. *Diadelph.*

Sp. 1. Arbor ſiliquoſa, i. 18. foliis εγγυθεν τοις της Ιτεας; ramoſiſſima: ib. καρπος ελλοβος, ὡσπερ τα χεδροπα· λοβοις πλατεσι, ου στενοις, (i. e. ſecundum ſpecies diverſas,) ſemine parvo, molliuſculo; ſiliquis ſparſis; arbor rara, iii. 14. Hab. M. Ida.

Sp. 2. Species peculiaris juxta Liparam. Arbor ευμεγεθης: ſemine in lobis magnitudine Φακου, (Fabæ,) cujus uſus in pecoribus ſaginandis mirus, et ideo ſeritur.

Sp. 3. fruticoſa πολυμασχαλος, (vid.) foliis Lauri, ſed rotundioribus, et Pyri *Mali* ſimilioribus; parte ſuperiore viridibus; inferiore glaucis, venis multis, cortice Vitis, ſine flore, vel fructu, ſed ſolummodo καχρυι κορυνωδει. Deſc. obſcura, ſi non textus corruptus.

KOMAPOΣ. }
KΩMAPOΣ. } *Decandr.*

Ῥηξιφλοιος, ὡςε εκπιπτειν, (cortice lacerato, decidente,) i. 8. fempervirens, i. 15. φερει μιμαικυλα εδωδιμα (fraga, fc.) Arb. med. magn. cortice tenui, inftar Myricæ; folio inter Prinum et Laurum; floret Octobri; flores απο μιας κρεμαςρας, (ex uno pediculo penfili,) επ' ακρον, βοτρυδον (in apice, racematim difpofiti,) floris Myrti magn. αφυλλοι δε, (fc. monophylli,) και κοιλοι, ὡσπερ ωον εκκεκολλαμμενον, (ut ovum excavatum,) το ςομα δε ανεωγμενον· ὁταν δ' απανθηση, ἡ προσφυσις τετρυπηται, (flore delapfo, fructus enafcens ftigmate perforatus,) το δ' απανθησαν (fructificatio, flore delapfo) λεπτον, ὡσπερ σφονδυλος περι ατρακτον, (ut verticillus circa fufum,) η Καρνειος Δωρικος, (vid. καρν.) fructus ενιαυτῳ πεπαινεται ὡςε συμβαινει ἁμα τουτον δ' εχειν, και τον ἑτερον ανθειν; optime, iii. 16.

KOMH ἡ. *Syngen.*

Radice fufiformi, *Bot.* guftu dulci: foliis Croci, fed longioribus: caule brevi; καλυκι μεγαλῳ, (perianthio magno,) πωγωνι εξ ακρου πολιῳ, (de capitulo papposo, unde nomen τραγοπωγων,) vii. 8.

KONYZA. *Syngen.*

Inter ποωδη ανακανθη cum Thymbra, Origano, &c. vi. 1. Spec. duæ: 1. K. αρρην. 2. K. θηλεια. 1. foliis majoribus, caule amplo, (παχει,) magis ramofo; fiore fpeciofiore; odore pungenti. 2. foliis tenuioribus: habitus συνεςηκως, (compreffus *Bot.*) odor βαρυς; adverfus infecta utilis, vi. 2.

KOPIANNOΣ. *Pentandr.*

Ποωδης· feritur cum Ανηθῳ και Καρδαμῳ εν πρωτοις αροτοις, (vid.) vii. 1. radix lignofa, γυμνοσπερμος, (vid.) vii. 3. genus fimplex, vii. 4. femen durat, vii. 6.

KOPONOΠOYΣ. *Tetrandr.*

Επιγειοφυλλος, cum Anthemio, Anchufa, &c. vii. 9.

KOPXOPOΣ. *Syngen.*

Inter λαχανα αβρωτα· proverbialiter amarus, vii. 7.

KOΣTOΣ. *Monandr.*

Inter aromata Indica, ix. 7.

KOTINOΣ. *Diandr.*

Sylveftres meliores, i. 7. κραδας in trunco generat, (vid.) κοιλοτητες ιδιοι in trunco, i. 13. opp. Ελαια, i. 24. ii. 3. iv. 14. lign. denfum album, v. 4. incorruptum, v. 5. aptum malleis, και τερετριοις πυρειας, (vid.) v. 9.

KOΨIMOΣ ἡ. *Claff. incert.*

Affinis Κραταιγου· καρπῳ ϛρογγυλῳ. Vel fpec. diverfa, iii. 15.

KOYKIOΦOPOΣ. *Palma.*

Similis Φοινικι trunco et foliis; fed capite divifo, ῥαϐδοις (fpathis) brevibus, raris; fructus χειροπληθης, rotundus, flavus, guftu dulcis; non congregatim fed feparatim; nucleo duriffimo intus: lign. a Palma valde diverfum: fc. non fibrofum, fed folidum ponderofum. Hab. Perfia.

KPANEIA. *Tetrandr.*

Lign. durum, i. 9. in maribus nodofum, i. 13. in planis Macedoniæ, iii. 4. Germinat προ ζεφυρου; fructum maturat περι τροπας θερινας, iii. 6. cito crefcit, iii. 7. Spec. duæ: 1. αρρην. 2. θηλεια: habitu folum differentes, ambo foliis Amygdali, fed pinguioribus, et magis craffis; cortice tenui fibrofo; trunco fubgracili; οζοις fimilibus Viticis, *Agni cafli*. Lign. Θηλυκρανειας molle, medulla intus nulla. Αρρην ακαρπος; Θηλυκρανεια, κ[illegible]ιμος, drupa edulis; nucleo intus, inftar Olivæ, duro; fructus racemofus. N. B. Duæ certe fpecies diverfæ, et ita a Linneo enumerantur, vid.

KPANION. *Cryptog.*

Fungus; cum Hydno, i. 9.

KPATAIOΓONON. }
KPATAIOΓONOΣ. } *Didyn.*

Fructus folum numeratur inter roborativa; fine defc. N. B. Fabulofa forfan planta. Vires generativæ, ut nomen græcum denotat, Vid. Ger. em. ix. 19.

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. }
ΚΡΑΤΑΙΓΩΝ. } *Icofandr.*

Folio Mefpili τετανῳ, (rigido; vid. τετανος) latiore, longiore; margine fimplici, non ferrato; arbor mediæ magn. lign. fubflavum, ποικιλον, (maculatum?) cortice Mefpili: καρπῳ (drupa *Bot.*) στρογγυλῳ, fimili Κοτινου, per maturitatem arefacto in arbore; et nigro, iii. 15.

ΚΡΙΘΗ. *Triandr.*

Πυκνοῤῥιζα, i. 9. πρωϊσπορος, viii. 1. αναφυεται μονοφυλλα, (monocotyledon *Bot.*) viii. 2. maturat femen 40 dies poft inflorefcentiam, viii. 3. γυμνη, (non glumis involuta,) στοιχειωδης, (grana in ordine collocata,) fc. διστιχοι, τριστιχοι, &c. viii. 4. amat folum ψαφαρες (vid.) K. Ετεοκριθη. de C. Pl. iii.

ΚΡΙΝΟΝ. *Hexandr.*

Inter στεφανωτικα cum Narciffo: coloribus variant, item habitu; μονοκαυλα· δικαυλα σπανιως; fed in eodem fcapo flos unicus, vel plures: radix ampla, σαρκωδης, (carnofa,) καρπος æque ac radix ad propagandum inferviens, vi. 6.

ΚΡΙΟΙ. *Diadelph.*

Κρ. οροβιαιοι var. Οροβου, viii. 5.

ΚΡΟΚΟΣ. *Triandr.*

Radix σαρκωδης, (bulbus non tunicatus?) i. 10, 11. foliis στενοις, (linearibus,) τριχοφυλλος, ευθυς ἁμα τοις φυλλοις το ανθος (optime,) φιλει πατεισθαι, (conculcari,) vi. 6. Inter flores autumnales. Spec. duæ: 1. K. ορεινος, ευοσμος. 2. K. ἡμερος. vi. 7. radix βαλανωδης, (glandiformis,) ὁμαλης, vii. 9. καυλῳ ανθους, (fcapo *Bot.*) forfan Cr. *aureus* Fl. Græc. t. 35. var. Κρ. ορεινης. Inter aromata, ix. 7.

ΚΡΟΜΜΥΟΝ. *Hexandr.*

Bulbus tunicatus. i. 8. corticatus etiam, i. 10. folia radicalia, intus cava, i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. ακροκαρπον, vii. 3.

Var. cultæ: 1. K. Σαρδιον. 2. Κνιδιον. 3. Σαμοθρακικον. 4. Σητανιον. 5. Σχιστον. 6. Ασκαλονικον. N. B. Pofteriores tres dif-

ferunt ab aliis : n. 4. μικρον, et γλυκυ ευ μαλα. n. 5. κατω σχιζεται. n. 6. αγονος (bulbos non producit) επι ταις ριζαις, Allium *Schœnoprasum*, Ang. "Cives," vii. 4. amat loca irrigua, iv. 5. λειοκαυλος, (vid.) iv. 8.

ΚΡΟΤΩΝ. *Monœc.*

Folia junioris plantæ rotunda, senioris angulosa; contrarium evenit in Hedera, i. 16. annon Ricini spec. arborescens. de C. Pl. ii.

1. ΚΥΑΜΟΣ. *Gynandr.*

Species paludosa et fluviatilis: caulis 4 cubitos altus, magn. dactyli; καλαμοειδης, mollis, non geniculatus διαφυσεσιν ενδον, (cavitatibus medullosis,) in apice caulis κωδια, (pericarpium,) παρομοια σφηκιω περιφερει, (vespæ nido,) και εν εκαςω των κυτταρων, (in singulis cellulis,) κυαμος, (semen,) μικρον υπεραιρον αυτου, (leviter supereminens in receptaculo,) seminum numerus circiter 30. Flos papaveraceus, coloris rosei, aquis i..natat; folia ampla loricæ Thettalicæ, similia; radix ampla; planta edulis. Hab. Ægypto.

2. ΚΥΑΜΟΣ. *Diadelph.*

Ποωδης, πολυχρονιος τη ανθησει, vii. 3. cum Ερεβινθω et Πισω, viii. 1. πρωισπορος, (vid.) Dicotyledon, viii. 2. foliis subrotundis; caule lignoso; ramis ex lateribus: solus inter χεδροπα ορθοκαυλος, (optime,) viii. 3. corculum seminis *Bot.* prominens, viii. 5. ου ταχυ βλαςανει, v. 10.

ΚΥΚΑΣ. *Palma.*

Hab. Æthiopia; species θαμνωδης, truncis pluribus simul junctis ad basim: ραβδοις (spathis?) cubitalibus: foliis latis, ωσπερ εκ δυοιν συγκειμενοις, (plicatis,) καρπω ςρογγυλοτερω, μειζονι, ηττον γλυκει· maturatur anno tertio: ex his conficiuntur panes, ii. 8.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ. *Pentandr.*

Bulbus cortice tectus, vii. 9. Vires medicæ in morbis pulmonum; mulieribus εν προσθετοις; (vid.) adversus ulcera, και προς τω μεθυσκειν, (ad providendum adversus ebrietatem,) ix. 10. Desc. nulla.

KΥΜΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Γυμνοσπερμον, cum Anetho; ſemen ϛενον, γραμμωδες, (lineare *Rot.*) δειν καταραν σπειραντας! vii. 3. variat, vii. 4.

ΚΥΝΟΡΟΔΟΝ. *Icoſandr.*

Το ὁλον φυτον ὁμοιον τοις Κυνοροδοις, iv. 5. ſyn. pr. Κυνοσβατου vel Roſa, *canina* L.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ. *Icoſandr.*

Ορθοφυης, και ὑψος εχων, καρπῳ ὑπερυθρῳ ὁμοιῳ τῳ της ῥοδης, δενδρου και θαμνου μεταξυ. Roſa, *Canina,* "Dog-roſe, or Hip-tree," Angl. Fructus κατ' ανεμον colligendus; ει μη· κινδυνον ειναι των οφθαλμων; anne ex filis quæ grana involvunt; an ſpec. peculiaris, ix. 1.

ΚΥΝΩΨ. *Tetrandr.*

Pl. κιχωριωδης, cum Aphaca et Bupreſti, vii. 8. βλαϛανει ἁμα τοις πρωτοις ὑετοις, ib. an diverſus ab Αχυνοψ, vii. 10. Error, ut ſuſpicor, textûs in hoc loco.

ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ. *Monœc.*

Procera arbor, i. 8. radicibus horizontalibus, i. 9. μονοϛελεχης, i. 14. ſempervirens, i. 5. σαρκοφυλλος, i. 16. maxime in Ida, iii. 3. et in Cyrenaica, iv. 3. Creta, Lycia, Rhodo, iv. 6. ex ligno fiebant ſtatuæ una cum Cedro, v. 5. Lign. incorruptum, ib.

ΚΥΠΕΙΡΟΣ. *Triandr.*

Cum Sparganio ὁμαλοτητι ιδιᾳ, (polita maxime,) radice ſingulari, i. 10. γωνιοφυλλος, (vid. γωνια,) i. 16. planta locuſtris λοχμωδης, (vid.) iv. 9. In Lacu Orchomeni, iv. 11. radice maxime ſingulari, ſc. inæqualis magnitudinis; pl. δυσολεθρος, ib.

1. ΚΥΤΙΣΟΣ. *Diadelph.*

i. 9. lign. duriſſimum, arbor vivax, iv. 20. lignum Ebeni ſimile, colore excepto, v. 4.

2. ΚΥΤΙΣΟΣ. *Diadelph.*

Species paraſitica vel ſcandens, quæ plantas alias creſcendo enecat: a quibuſdam Cytiſus Maranta dicta, Medicago, *arborea,* L. Semel occurrit, iv. 20.

ΚΩΜΑΚΟΣ. }
ΚΩΜΑΚΟΝ. } *Claff. incert.*

Fructus et fuccus Κωμακου folum occurrit, ix. 7.

ΚΩΝΕΙΟΝ. *Pentandr.*

Caulis carnofus, i. 8. ναρθηκωδης, (fiftulofus item,) vi. 2. οπος, lethalis, ix. 8. Hab. Sufis, ix. 15.

Λ.

ΛΑΘΥΡΟΣ. *Diadelph.*

Inter χεδροπα: foliis longioribus, viii. 3. επιγειοκαυλος, (pl. repens,) ib. femina obvoxia vermi, σκωληκι dicto, όταν υγρανθωσι, viii. 10.

ΛΑΚΑΘΗ. *Icofandr.*

In planis Macedoniæ, iii. 4. Sine defc.

ΛΑΚΑΡΑ, vel Λευκαρα. *Claff. incert.*

An idem cum præcedente? Arbor cito crefcens, cum Φηγῳ, Αρκευθῳ, Σφενδαμνῳ, in udis crefcens, iv. 7. Error forfan textûs.

ΛΑΠΑΘΟΣ. }
ΛΑΠΑΘΟΝ. } *Hexandr.*

Caulis carnofus, i. 8. μονορριζος; pl. επισπορα: feminatur cum Τευτλιῳ, Θριδακι &c. Spec. culta; an Rumex *acetofa?* vii. 1. radix 1¼ ped. longa, vii. 2. carnofa vel potius ξυλωδης, vii. 3. genus fimplex, vii. 4. crudæ inedules, vii. 7.

ΛΕΙΜΩΝΙΑ, Ανεμωνη.

Vid. Ανεμωνη, vi. 7.

1. ΛΕΙΡΙΟΝ, vel Ναρκισσος. *Hexand.*

Foliis radicalibus, Afphodeli fimilibus, fed latioribus; fcapo nudo, viridi; flore fpatha membranacea involuto in apice, vi. 7. Floret vere.

2. ΛΕΙΡΙΟΝ. *Hexandr.*

Λειριον ἑτερον dict. planta autumnalis, cum Croco montano, vi. 7.

ΛΕΜΝΑ. *Monœc.*

Ὁ *προσαγορευουσι Λεμνα.* Spec. fluviatilis. *Τουτο πλειον το καθ' ὑδατος εςιν,* (aquis pars major fupernatat,) fine defc. ut maxime omnium communis, iv. 11.

ΛΕΥΚΑΚΑΝΘΑ. *Syngen.*

Inter fpinofas capitulo, (*ακανῳ*) inermi? vi. 6. foliis folummodo fpinofis, ib.

ΛΕΥΚΗ. *Diœcia.*

Folia juniorum diverfæ formæ a foliis feniorum, i. 16. *ςρεφει τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας,* ib. Vid. Ελαια, p. 19. amat irrigua loca: propagatur *απο παρασπαδων,* (vid.) vel *καταπηγνυμενος,* iii. 1. in planis Macedoniæ, iii. 4. *πρωϊϐλαςος,* iii. 6. in aquofis cito crefcens, iii. 7. Spec. montana, iii. 10. cum Populo, cui affinis habitu; *ανανθη αμφω,* iii. 14. *βραχυϐιος,* iv. 14. Hiftoria mirabilis *Λευκης εν Σταγειροις, εν τῳ Μουσειῳ,* iv. 19.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ. *Hexandr.*

Planta bulbofa cum Sifyrinchio; bulbis rotundis, tunicatis, vii. 13. N. B. *Λωτος λευκοιος,* alia planta cum Anthemio enumerata, vii. 9. vid. *Λωτος.* Diadelph.

ΛΕΥΚΟΙΟΥ *ανθει δενδρον.* *Claff. incert.*

Semel occurrit, iv. 9.

ΛΙΒΑΝΟΣ. *Claff. incert.*

Οπος δακρυωδης; cum Cedro, Abiete, Pinu, ix. 1. An idem cum fequente?

1. ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ.
ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. } *Claff. incert.*

Odorifera pl. ex India, Arabia, Syria, cum *Σμυρνῃ,* Cafia, &c.

iv. 6. Gummi obtinetur poſt germinationem, ix. 2. in M. Arabum; arbor med. magn. ramoſiſſima, folio Απιυ, ſed minore; ſature viridi, ut Πηγανου: φλοιος λειος, ὡς Δαφνης, ix. 4.

2. ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. *Pentandr.*

ix. 12. N. B. Libanoti ſpec. duæ: 1. Λ. καρπιμος. 2. Λ. ακαρπός. Prioris fructus in uſu; poſterioris, radix: fructus vocatur καχρυς.

1. Folio Ἐλειοσελινου, ſed majore; caule cubitali; radice craſſa, alba; odore Libanoti; fructus albus, ſcaber, oblongus.

2. Folio Θριδακινης amaræ, ſed magis ſcabro; radice brevi, ix. 12.

ΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Φυλλα λιπαρα, (pinguia, nitentia,) viii. 7.

ΛΙΝΟΣΠΑΡΤΟΝ. *Triandr.*

Cortex πολυλοπος, cum Tilia, Vite, &c. i. 8. (vid.)

ΛΥΧΝΙΣ. *Decandr.*

Inter flores æſtivos cum Diantho *Armeria*, Lavandula, &c. vi. 7.

1. ΛΩΤΟΣ. arb. *Polygam.*

Cortex trunci ασαρκος, cum Cedro et Cypreſſo, i. 8. medulla ligni dura, i. 9. lignum præ duritie enode, i. 13. Arbor in Libya frequens et optima, iv. 3. magnitudine Pyri; foliis εντομας εχουσι πρινωδεις, (marginibus ſerratis,) lignum nigrum: fructus magn. Κυαμου, mutans colorem in maturando, ut uva; ſitu alternus, inſtar baccarum Myrti; dulcis guſtu; cibus Lotophagorum. Species plures, iv. 4. lign. Ebeno prox. v. 4. ex quo ſtatuæ, v. 5.

2. ΛΩΤΟΣ. Nymphæa. *Polyandr.*

Caulis ſimilis Ari, *Colocaſiæ*, και οἱ πετασοι (folia, ita ex forma πετασου, vid. vocata,) ὡσαυτως, πλην ελαττυς, επιφυεται δ' ὁμοιως ὁ Λωτος τῳ τυ Κυαμυ, (error, ut ſuſpicor, textûs: vid. ex deſc. Κυαμυ ſupr.) παραφυεται δε φυλλον μεγα παρ' ἑκαςου των κυαμων: flos albus, petalis anguſtis, liliaceis, denſe ſtipatis, quæ cum ſol occultatur intus ſeſe inflectunt, et diſcum floris occultant, μετ' απανθησιν καταδυνει, iv. 10. inter aromat. ix. 7.

3. ΛΩΤΟΣ. herb. *Diadelph.*

Ποωδης cum Picride et Anthemio, επικαυλοφυλλος, vii. 19. genera plura, quæ differunt caulibus, floribus, foliis. Qu. an Lotus Linn. vel Trifolium, *Melilotus* ejufdem, vii. 14.

M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ. *Claff. incert.*

Vox Ægyptia; cum Σιλφιω enumeratur. Vires medicæ in radicibus, i. 11.

ΜΑΛΑΧΗ. *Monadelph.*

Cultura δενδρυται, (Lavatera forfan arborea L.) i. 4. inter αρυραιας quæ λαχανη vocantur: δει πυρωσεως, (igni coquatur neceffe eft,) cum Τευτλιδι et Λαπαθω, vii. 7. επετειοκαυλος, vii. 8.

ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ. *Triandr.*

Foliis Cyperi; radix bulbofa, magnitudine Mefpili, fine nucleo, vel cortice craffo; guftu dulcis; edulis, vel cocta in jure, vel in τραγημασι, (bellariis.) Hab. Ægypt. iv. 10.

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδης, cum Helleboro, vi. 2. Vires foliorum in ulceribus; radicis ad morbos cutaneos; fuccûs in podagra, ix. 10.

ΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Γυμνοσπερμον, i. 18. vii. 3. fuccus fragrans, i. 19. ναρθηκωδες, (caule fiftulofo,) νευροκαυλον, (ftriato,) vi. 1. cum Κωνειω et Mandragora, vi. 2.

ΜΕΛΑΜΠΥΡΟΣ Ποντικος. *Didynam.*

Crefcit una cum Tritico, viii. 8.

ΜΕΛΑΝΙΟΝ. *Syngen.*

Vid. Ιον, Ιωνια. Inter στεφανωτικα ποωδη, vi. 6. inter æftivos flores, cum Oenanthe, vi. 7.

ΜΕΛΕΑ. *Diand. et Polygam.*

Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructificat æstate, cum Σφενδαμνῳ, iii. 6. cito crescit, iii. 7. πυκνοῤῥιζα, ib.

Spec. duæ: 1[ma]. M. ευμηκης. 2[da]. M. ταπεινοτερα. iii. 11 folia amborum, φυλλοῤῥοεντα αφ' ενος μισχου, (pinnata, cum lobis decidentia,) φυλλα (lobi singuli) Lauri similes, apice acutiores, et margine serrato, περι μιαν, οιον κατα γονυ, συζυγιαν, (ex adverso, pedunculo communi juncta,) τα φυλλα δε καθ' εκαστον πεφυκε, (lobi separatim producuntur,) συχνων ισχυσων των συζυγιων, (crebris paribus loborum,) ὁμοιως και επι της Οιης. Fructus in lobo tenui compresso, φερει δ' ετερ' αλλα, οιον βρυα· εκαστα καθ' αυτο σφαιροειδη, (sc. flores masculi,) τα μεν περι των καρπων· τα δ' απηρτημενα πολυ, (valde distantia.) N. B. Fraxinus secundum Linn. floribus hermaphroditis et fœminis; apud Botanicos recentiores, ut Genus Diandrum.

1. M. ευμηκης· ξυλῳ, λευκῳ, ευϊνῳ, (vid.) ανοζοτερῳ, σκληρῳ.
2. M. ταπεινοτερα, ἡττον ευαυξης, ξυλῳ ξανθοτερῳ τραχυτερῳ.

N. B. Prior vocatur Βυμελια, Fl. Græca, fasc. 1.

ΜΕΛΙΑΣ σιτος. *Octandr.*

Inter ποωδη cum Loto L. semel occurrit; variat habitu secundum loca, vii. 14.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ. *Diadelph.*

Enumeratur cum Loto; herba varians habitu secundum loca, vii. 14. de C. Pl. l. vi.

ΜΕΛΙΝΟΣ. *Triandr.*

Inter σιτωδη, cum Cenchro, viii. 3.

ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ. *Polyandr.*

Inter ποωδεις ακανθας, quæ foliis maxime differunt, cum Conyza, &c. vi. 1.

ΜΕΣΠΙΛΗ. *Icosandr.*

Spec. tres. 1. M. ανθηδων. 2. M. σητανειος. 3. M. ανθηδονοειδης.

1. Drupa major, luteo-alba, laxa, (χαυνα.)

2, 3. Drupa minore, ſaporis melioris, ſed ſucco aſtringenti. Omnium flores amygdalini, albi; folia πολυσχιδη, (lobata,) και επ' ακρῳ σελινοειδη; μειζοσι σχημασι, τεταvα, (diviſuris σελινου, ſed majoribus) περιχεχαραγμενα ὁλον, (undique ſerrata,) pedunculo tenui, longo: lign. firmum; folia rubeſcunt valde autumno, iii. 12.

MHΔIKH. *Diadelph.*

Μισοκοπρος, viii. 8.

MHKΩN. *Polyandr.*

Sempervirens, i. 15 Αγγειοσπερμος, i. 18. ſuccus ſpiſſus, (οπωδης,) i. 19.

MHΛEA MHΔIKH. *Polyadelph.*

Ανθες ηλακατη, (piſtillo *Bot.*) in medio, i. 22.

MHΛEA ΠEPΣIKH. *Polyadelph.* i. 22.

MHΛEA. *Icoſandr.*

Arbor μονοςελεχης, (trunco ſimplici,) αγωγη μονον, ("by training,") i. 5. cortice lævi, i. 8. medulla carnoſa; ολιγορριζα και επιλολαιορριζα, i. 19. οζοι ὁμοιοι θηριων προσωποις, (in venis ligni, ut videtur? vel facie externa) εἱς μεγιςος και περι αυτον, πλειονες, i. 13. foliis carnoſis, Pyri longioribus, i. 16. flos φυλλωδης, (polypetalus,) i. 21. flos ſuperus, *Bot.* i. 22. fructificatio εκ των ἑνων κλαδων, (ex ſurculis prioris anni,) i. 23. varietates plurimæ, cultæ, i. 24. Spec. duæ, verna et ſerotina, ii. 1. ſerendo degenerat, ii. 3. προμοσχευεται επ' αυτων των δενδρων, (inſitione propagatur,) ii. 7. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. οψιϐλαςος, ib. fructus maturatur ἁμα πρωτοις ψυχροις, iii. 6. Lignum vermibus minus obnoxium, iv. 16. Hab. Ponto, iv. 4.

MHΛΩΘPON. *Claſſ. incert.*

Inter φρυγανα ακανθα, cum Ciſto; ſine deſc. vi. 1.

MHNIANΘEΣ. *Pentandr.*

Paluſtre gen. in paludibus lacûs Orchomeni, iv. 11. ſine deſc.

MIΛOΣ. *Diœcia.*

In montibus Macedoniæ, iii. 4. οψιϐλαςος, iii. 6. magn.

maximæ, iii. 7. Genus ſimplex, foliis Ελατῆς, (Fir-tree,) πυλυμασχαλος, (vid. μασχαλη,) lignum flavo-rubeſcens, totum cor; fructus ruber, Piſo major, tener: folia equis lethalia; non tamen pecoribus, iii. 10. amat umbroſa loca, iv. 1. lign. ad opera ſculptilia, v. 8.

MINΘA. *Didynam.*

Cum Siſymbrio et aliis, quorum folia et ramuli odoriferi, vi. 7.

MNAΣΙΟΝ. }
MNAΥΣΙΟΝ. } *Claſſ. incert.*

Pl. ποωδης, edulis, guſtu dulcis: affinis Σαρι, iv. 9. N. B. Ambo voces Ægyptiacæ.

MΥΑΚΑΝΘΟΣ. *Claſſ. incert.* vi. 4.

MΥΚΗΣ. *Cryptog.*

Caulis ὁμαλης? forſan lævis et fungoſus. Spec. Agarici, vel Boleti ſtipitati, cum Hydno, i. 8.

MΥΚΗΣ λιθινος. *Lithoph.*

Απολιθεται ὑπο τȣ Ἡλιȣ. Hab. Mare Rubrum, iv. 8.

MΥΟΦΟΝΟΝ. *Claſſ. incert.*

Caulis fiſtuloſus, vi. 2. Μαραθρου affinis ſpecies, ib.

MΥΡΙΚΗ. *Diœcia.*

Sempervirens, i. 15. iii. 4. craſſifolia, i. 16. N, B. Species arborea occurrit in inſula Maris Rubri, Τυλος dict. v. 6.

MΥΡΡΙΣ. *Claſſ. incert.*

Λαχανον ευςομον; enumeratur cum Anetho et Fæniculo; de C. Pl. vi.

MΥΡΡΙΝΟΣ. }
MΥΡΤΟΣ. } *Icoſandr.*

Frutex, i. 4. ſempervirens, i. 15. flores ſuperi, *Bot.* i. 22. in

furculis anni prioris, i. 23. var. plurimæ, i. 24. germinat εκ τε ακρε και εκ των πλαγιων, iii. 7. baccæ vinofæ. Spec. Μικρομυρτος dict. de C. Pl. vi.

ΜΩΛΥ. *Hexandr.*

Radix bulbofa, inftar Κρομμυε; foliis Scyllæ. Hab. M. Cyllenio, et ad Pheneum, ix. 15.

N.

ΝΑΙΡΟΣ. *Claff. incert.*

Hinc fit unguentum ναιρον dict. ix. 7. Differt a Ναρδῳ, quia in eodem catalogo fimul recenfentur, ib.

ΝΑΠΥ. *Tetradyn.*

Succus δριμυς, (aufterus, pungens,) i. 19. fpec. επισπορα, (vid.) vii. 1. ελλοβοσπερμον, (angiofpermus,) cum 'Ραφανιδι και Γογγυλιδι, vii. 3.

ΝΑΡΔΟΣ.
ΝΑΡΤΟΣ. } *Polygam.*

Andropogonis fpec. ex India: vid. Act. Soc. Reg. Londini 1790. Semel occurrit. Unguentum ναρτη dict. ix. 7.

ΝΑΡΘΗΞ. *Pentandr.*

Pl. affinis Καλαμου, μητρα υμενωδει, (medulla caulis diffepimentis divifa,) caule fiftulofo ftriato; μονοκαυλος, γονατωδης; foliis amplexicaulibus, πολυσχιδεσι, (profunde et multum divifis,) ὡςε ειναι τριχωδη, (linearia *Bot.*) Flores lutei, parvi, Anethi fimiles. Caulis εξ ακρου σχιζεται, (furfum ramofus eft,) καρπῳ εν τοις παρακαυλιζουσι, (ramulis lateralibus?) radix fufiformis *Bot.* vi. 2.

ΝΑΡΘΗΚΥΙΑ. *Pentandr.*

Affinis, fed minor, vi. 2.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. *Hexandr.*

Affinis Λειριου; foliis radicalibus Afphodeli fimilibus, fed lati-

oribus; καυλος (ſcapus) αφυλλος, ανθει εξ ακρου εν ὑμενι τινι, (ſpatha membranacea *Bot.*) καθαπερ εν αγγειῳ· καρπος (pericarpium) magnum, oblongum; radix carnoſa, oblonga, vi. 6. floret vere primo cum Λειριῳ και Βολβοκωδιῳ, vi. 7. vii. 12.

NHΛEIA? *Claſſ. incert.*

N. B. Semel occurrit. Suſpicor ibi legendum pro Ανδραχνη, Νηλεια; Ανδραχνη ελεια; A. paludoſa, i. 8.

NHΠENΘEΣ. *Claſſ. incert.*

Nomen Poeticum, ut videtur: Plantæ narcoticæ, forſan Papaveris, *ſomniferi* Linn. Hab. Τυῤῥηνια, ix. 15.

NΥMΦAIA. *Polyandr.*

Succus dulcis: hab. in lacubus et aquoſis Orchomeni, Creta, Bœotia &c. ab Ægyptiis Μαδωναϊν vocatur. Bulbus edulis; folia rotunda, natantia; vires ſtypticæ, ix. 13.

Ξ.

ΞEIPIΣ. }
ΞIPIΣ. } *Triandr.*

Vid. Ιρις, ix. 9. ſi non Genus diverſum.

ΞIΦION. }
ΞIΦOΣ. } *Triandr.*

Enumeratur cum Aſphodelo: folia enſiformia; radix bulboſa, vii. 12.

O.

OH. }
OIH. }
OΥH. } *Icoſandr.*

Fervori ſolis expoſita ακαρπος γινεται, ii. 3, ſtatu ſylveſtri fructus dulcior, iii. 3. επιπολαιοριζος, iii. 7. Spec. duæ: 1. O. αρ-

ρην. 2. O. θηλεια. Fructus variat figura, oblonga, ovata, rotunda; folia pinnata; flores in racemo, iii. 12.

ΟΙΝΑΝΘΗ. *Hexandr.*

Spec. ποωδης. Inter ςεφανωτικα cum Ιωνιᾳ, Διος ανθει, Ἡμεροκαλλιδι, vi. 7.

ΟΙΝΑΡΟΣ? *Class. incert.*

Affinis Andrachnes, sempervirens, ramorum partibus inferioribus nudis, i. 15. Forsan legendum Ανδρ. οιναρος.

ΟΙΝΟΘΗΡΑ. *Class. incert.*

Foliis Amygdali, sed latioribus; floribus rubris, vel rosaceis; radice magna, rubra. Radix exsiccata vinum olet, unde nomen, ix. 21. Hab. in montibus, ib.

ΟΙΣΟΣ, vel Ισος. *Pentandr.*

Spec. duæ: 1. O. μελας. 2. O. λευκος; ita dict. a colore fructûs, iii. 17. foliis et ramulis tenuioribus, ib. N. B. In Cod. Aldini legitur Ισον.

ΟΚΙΜΟΣ. ΟΚΥΜΟΣ. } *Didyn.*

Radix lignosa, i. 9. caulis foliosus, i. 16. inter επισπορα τριτοις αροτοις, (quæ feruntur ter in anno,) vii. 1. propagatur απο βλαςων, ("slips,") vii. 2. radix fusiformis, ib. floret successive; τα κατω πρωτον, vii. 3. εμφλοιοσπερμος, (vid.) vii. 3, 6.

ὉΛΙΒΑΝΟΣ. *Class. incert.*

Enumeratur inter plantas balsamiferas Arabiæ, ix. 4. Forsan legendum ὁ Λιβανος. Gummi vocatur Olibanum.

ὉΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. vid. Σχοινος.

ΟΛΥΡΑ. *Triandr.*

Habitu Tritici, πρωϊσποροι, viii. 1. καρπος πολιλοπος, (semen

glumis numerofis tectum,) cum Τιφη, viii. 4. μαλακωτερα και ασθενεςερα Βρομου και Ζειας, viii. 9.

ΟΝΟΚΙΧΛΗΣ. *Claſſ. incert.*

Pl. ποωδης: cum Αφακη et Κιχωριω: floret ſucceſſive, vii. 10.

ΟΝΩΝΙΣ. *Diadelph.*

Caule ſpinoſo, πτορθακανθος, (ſpinis caulinis,) foliis πηγανωδεσι, (rutæformibus,) ὡσπερ ςεφανου την ὁλην μορφην, (radiatim, coronæ ad inſtar,) flore papilionaceo; ſemine lobato, lobis ſine diſſepimento, *Bot.* N. B. Planta Agricolis infeſta, vi. 1, 4, 5.

ΟΞΥΑ. *Monœc.*

Λεπτορριζος, iii. 7. cortex *lævis*; truncus enodis: lignum ευχρουν, (bene coloratum,) firmum, venoſum; folia indiviſa, apice acuminata, (unde forſan nomen,) fructus lævis, βαλανωδης· εν εχινῳ, (pericarpio ſetaceo,) πλην ουχ ὡς Διος βαλανος, (non aculeis; aut non æque rigidis ac Fagi, *Caſtaneæ,*) iii. 10. ξυλον ὑγροτατον, cujus uſus εις κλιναρια ενδιδοντα, (lectulos elaſticos?) v. 8.

ΟΞΥΑΚΑΝΘΑ. *Icoſandr.*

Sempervirens i. 15. hab. in planis Macedoniæ; floret primo vere; fructum maturat προς Πλειαδων δυσιν, iii. baccæ ſpecioſæ, et in fertis uſitatæ, vi. 7.

ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΟΝ. *Claſſ. incert.*

Cum Libanoto, Smyrna, &c. iv. 6. N. B. Forſan vox compoſita ex οπος (ſuccus) et βαλσαμον. Vid. Βαλσαμον.

ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentand.*

Differt ab Ἱπποσελινῳ et Ἐλειοσελινῳ, foliis ſimilibus Κωνειου; radice tenui; fructu Anethi ſimili, vii. 6.

ΟΡΙΓΑΝΟΣ. *Didyn.*

Sempervirens, i. 15. ſuccus δριμυς, (acris, aſtringens,) i. 19. ποωδης, ανακανθος, vi. 1.

Spec. duæ; 1. Ο. λευκη, καρπιμη.
2. Ο. μελαινα, ακαρπος.

Semen germinat 30 diebus, vii. 1. propagatur etiam a ramulis, vii. 2.

'ΟΡΜΗΝΟΝ. }
'ΟΡΜΙΝΟΝ. } *Diandr.*

Seritur vere cum Cenchro, &c. viii. 1. femen nigrum Cumini fimile, amarum, viii. 7.

ΟΡΟΒΑΓΧΗ. *Claff. incert.*

Φθειρει Οροβους δια το περιπλεκεσθαι, (circumvolvendo fuffocat;) ut fpec. quædam herbaceæ fcandentes, fc. Polyganum, Fumaria, &c. Semel occurrit. de C. Pl. I. v.

ΟΡΟΒΟΣ. *Diadelph.*

Pl. σιτωδης, leguminofa, οψισπερμος, viii. 1. femina proxime collocata in legumine, (συμψαυουσι αλληλους,) viii. 5.

N. B. Infecti fpecies Φαλαγγιον dicta, Orobi peculiaris, viii. 10. Siliqua cylindrica, viii. 5.

ΟΡΟΒΙΑΙΟΙ ΚΡΙΟΙ. *Diadelph.*

Genus intermedium inter Ερεβινθον et Οροβον, viii. 5. nifi textus fit corruptus · hinc Linnei, Cicer, *Arietinum*, ib.

ΟΡΤΥΞ.

Syn. Αρνογλωσσου, vii. 10.

ΟΡΥΖΟΝ. *Hexandr.*

Pl. Indica, ζων πολυν χρονον εν υδατι, (diu fub aquis vivens,) εξ ού το έψημα, (jufculum vel pulmentarium Indicum conficitur;) femen fimile Ζειας, εν φοβη (gluma) bivalvi; valvula exteriore cava, (vid. annot. in Ελυμον,) iv. 5. non fpicata, ut Κεγχρος.

ΟΡΧΙΣ. *Gynandr.*

Foliis Scillæ; radice duplici, bulbiformi: quorum major mas, minor fœmina vocatur, ix. 19.

ΟΣΤΡΥΑ, }
ΟΣΤΡΥΙΣ. } *Monœc.*

Arbor trunco nodofo, i. 13. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4.

ευαυξης, iii. 7. affinis Fagi; folia Pyri fimilia, πολυϊνα, (coftata, " ribbed,") femen parvum grano hordei fimile: lignum durum; iii. 10.

ΟΥΗ. Vid. Οη, Ουη.

ΟΥΙΓΓΟΣ. *Claff. incert.*

Fructu fub terra cum Arachidna, i. 1. radix magna carnofa; βλαςος βραχυς (flatura humilis,) καρπος (tuberculum) in deliciis apud Ægyptios, i. 11.

ΟΥΙΠΠΟΣ? }
ΟΥΙΤΤΟΣ? } *Claff. incert.*

Syn. prioris, i. 10. N. B. Pronuntiandum forfan Vingos, Vippos; voces Ægyptiacæ. Error textûs, ut videtur.

Π.

ΠΑΔΟΣ. *Icofandr.*

Umbra gaudet, ut Μιλος, iv. 1. Semel occurrit.

ΠΑΛΙΟΥΡΟΣ. *Pentandr.*

Frutex, i 4. caule fpinofo, i. 8. ramulis etiam fpinofis, i. 16. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. pullulat primo vere, iii. 6. καρπος εν λοβῳ τινι, (loculo quodam,) granis 3 vel 4; folia et λοβοι προς βηχας, (adverfus tuffes,) iii. 17. optimi in Libya, iv. 3. folia Loti vel Cercidis fimilia: fructu rotundo, rubro, iv. 4. in paludofis, iv. 9, 13. cum Βατῳ, (πτορθακανθος,) vid. vi. 1.

ΠΑΝΑΚΕΑ. }
ΠΑΝΑΚΕΣ. } *Pentandr.* ix. 12, 15.
ΠΑΝΑΞ. }

Spec. tres: 1. π. Ασκληπειον.
2. π. Ἡρακλειον.
3. π. Χειρωνειον.

π. 1. Foliis Θαψιας, craffis; caule nodofo: radice longa, fimplici; vires eædem, ac Θαψιας.

π. 2. Foliis latioribus; radice dactyli magn. δικρανη η τρικρανη, (bi- vel tri-cipiti,) ſuccus pharmaceuticus, adv. ἱεραν νοσον, (Epilepſiam.)

π. 3. Foliis Λαπαθου hirſutis; flore aureo; radice longa, tenui, ix. 12.

Hab. Pſophidi in ſaxoſis. N. B. Παναξ forſan ſuccus inſpiſſatus.

ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ. *Claſſ. incert.*

Planta ſpinoſa cum Ononide, Tribulo: ſine deſc. vi. 4.

ΠΑΠΥΡΟΣ. *Triandr.*

Planta aquatica in profundis fluvii Nili creſcens, radice carpo manûs magn. prælonga; caule (Παπυρος vocato) triquetro, 4 cubitos longo; κομη (panicula, *Bot.*) αχρεια, ασθενει· καρπῳ ουδενι: uſûs varii; ad victum humanum, ad navigia, vela, veſtimenta, ſtragula, funes, &c. iv. 9. ναρθηκωδης (fiſtuloſus) modo peculiari, vi. 2.

ΠΕΛΕΚΙΝΟΣ. *Diadelph.*

Species affinis Αφακης; ita dict. ex forma ſiliquæ πελεκεως ſimili, i. e. viii. 8.

ΠΕΝΤΑΠΕΤΕΣ. } ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. } *Icoſandr.*

Foliis Vitis, ſed minoribus; caule tenui, repente; κνημαις πυκναις, (flexuris numeroſis,) radice rubra, quadrangulari, ix. 14.

ΠΕΠΕΡΙ. *Diandr.*

Spec. duæ: 1. fructu rotundo: κελυφει (pericarpio) σαρκωδει, ερυθρῳ. 2. fructu oblongo, nigro; ſeminibus papaveraceis. N. B. Ambo θερμαντικα σφοδρα, ix. 22. Uſus in medicina cum Κωνειῳ, ib.

ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ. *Polygam.*

Genus herbaceum; radice magna, carnoſa, fibris numeroſis: affinis Σπαλακος et Κροκου, i. 11. N. B. Ita vocatur quia perdices amant εγκυλισθαι αυτῳ, ib. Nomen hodiernum Græc. Περδικακ', Fl. Græc. Prodrom.

ΠΕΡΣΕΑ. *Claſſ. incert.*

Δενδρον μεγα και καλον εν Αιγυπτῳ, ſimile Pyri foliis et flore; ſempervirens, και πασαν ὡραν καρπον πεπαινει, (fructus ſucceſſive maturatur,) iv. 2. Enumeratur cum Συκαμινῳ, Βαλανῳ, Ακανθῳ, ib. fructus oblongus magn. Pyri, viridis, nucleo intus, ſaporis dulcis, et maxime ſalutaris. Lignum, ut Loti, nigrum, ib.

ΠΕΡΣΙΚΑ μηλεα. *Polyadelph.*

Foliis Ανδραχνης: ſpinis Απιου, vel Οξυακανθης, læviſſimis tamen et prælongis. Pomum quod fert inedule, ſed valde fragrans, utpote et folia, quæ, cum veſtibus ſint repoſita, vermes arcent: fructus ſucceſſive maturatur. N. B. Hab. Medea, Perſia. Spec. altera Μηλεα Μηδικα dicta, iv. 4. N. B. Vid. Μηλεα Μηδικα, p. 49.

ΠΕΡΣΙΚΑ ΚΑΡΥΑ. Vid. Καρυα.

ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΝ. *Pentand.*

Pl. pharmaceutica: hab. in M. Pelio, Parnaſſo, Laconia, Tegea, Clitoria, Telethrio, ix. 15. ſemen inutile; ſed ſuccus in uſu: θερμαντικος valde, ix. 22.

ΠΕΥΚΗ. *Monœc.*

Sylveſtris naturæ, i. 6. ορθοφυης, οζωδης, (vid. οζος,) i. 8, 13. μητρα ξυλωδης· μονορριζος, μια ριζα μεγαλη, μικραις δ' απο ταυτης πλειοσι· απαραβλαστικος, i. 9. ſempervirens, i. 15. σπαθοφυλλος, (foliis baſi vaginatis,) i. 16. apice pungentibus, ib. ſemina oleoſa, ſuccus reſinoſus, i. 19. propagatur ſolum ex ſemine, ii. 2. iii. 1. non degenerat ſerendo, ii. 3. iii. 3, 4. Dubia res apud antiquos an flos ullus, ſed κυτταρου (iuli, vel amenti, *Bot.*) mentio, iii. 6. etiam καχρυος, iii. 7. αποκοπεισα ου βλαστανει, i. 8.

Spec. duæ: 1. π. αγρια.
2. π. ἡμερα.

II. αγριας. Etiam varietates duæ.
1. π. Ιδαια.
2. π. Παραλιας.

1ma. Arbor procera magis et ampla.

2da. Foliis tenuioribus, cortice læviore: ſtrobilo rotundiore, cito dehiſcente, iii. 10. N. B. Var. alia ακαρπος dicta ab ... radibus

Πιτυς, ib. Folia Πευκης αυχμωδη, πεφρικοτα, (arida, erecta,) lign. ad navium latera, v. 8. etiam ad carbones, v. 10. οπος δακρυωδης, ix. 1. ρητινη optima, ix. 2.

ΠΕΥΚΗ κωνοφορος.

iii. 10. de C. Pl. l. i. Spec. peculiaris; forsan Pinus, *Cedrus* L.

ΠΕΥΚΗΣ τι γενος. *Monœc.*

Spec. decidua, i. 15. N. B. In hoc capite Πευκης τι γενος (quædam species Pinûs) αειφυλλον: ergo datur species decidua. Pinus, *Larix* L.

ΠΗΓΑΝΟΝ. *Decand.*

Δενδρολαχανον, i. 4. sempervirens, i. 15. propagatur απο βλαστων, (vid.) vii. 2. nullæ species, vii. 4. μισοκοπρος, vii. 5.

ΠΙΚΡΙΣ. *Syngen.*

Ποωδης, cum Anthemio et Cichorio; επικαυλοφυλλος, vii. 9. floret per totam æstatem: succus gustu amarus valde, unde nomen, viii. 1.

ΠΙΛΟΣ. *Cryptog.*

Σφαιριον εριωδες μαλακον, iii. 8.

ΠΙΝΗ. *Cryptog.*

N. B. Πινη ut nomen generale Fungi. de Caus. Pl. l. iii.

ΠΙΣΟΣ. *Diadelph.*

Αρχη (principium germinationis in semine) εκ του αυτου, (sc. Corculum et Plumula, *Bot.* ex eodem puncto,) viii. 1. επιγειοκαυλος, foliis oblongis, viii. 3. λοβος αδιαφρακτος, (siliqua sine dissepimento, seminibus alternatim utrinque,) viii. 5. obnoxius vermi, σκωληκι, (vid.) viii. 10.

ΠΙΤΥΣ. *Monœc.*

Μητρα ξυλωδης, i. 9. arbor sempervirens, i. 15. σπαθοφυλλος, (foliis 2 vel 3 basi vaginatis,) apice pungentibus, i. 16. femina

oleofa, i. 19. propagatur ex femine, ii. 2. non degenerat ferendo, ii. 3. arbor Julifera *Bot.* iii. 6, 7. fuccifa perit, iii. 8. folia inftar Πευκης (vid. fupr.) Conus minor, i. 10. Ufus ligni ad navium latera et carbones, v. 10. ρητινη (fuccus "Tar" dict.) εντομαις (incifionibus) extrahitur, ix. 1, 2. N. B. Πευκη κωνοφορος ita dicta forfan ex magn. Coni. Πιτυς φθειροφορος ex parvitate, ii. 3. de C. Pl. I. i.

ΠΙΤΥΙΝΗ. *Claff. incert.*

Περιαλλοκαυλος, (planta fcandens,) cum Ακαρινη, vii. 8.

ΠΙΤΥΟΥΣΑ.
ΠΙΤΥΩΝ. } *Claff. incert.*

Inter βολβωδη cum Βολβινη, Σισυριγχιῳ &c. vii. 13.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ. *Monœc.*

In aquofis, i. 7. κραδαις (vid.) obnoxia; πλατοφυλλος, i. 16. βλαςανει απο παρασπαδων, ("cuttings,") iii. 1. πρωϊβλαςος, iii. 6. arbor rara in Italia, iv. 7. et in Ægypto, iv. 9. Specimen celebre ab Agamemnone plantatum, iv. 14. cortice ablato non moritur, (N. B. Ipfe expertus fum,) ib. Lign. ψυχρον, v. 4. ad τορνειας navium, (vid.) v. 8.

ΠΟΑ. *Triandr.*

Pl. paludofa in Ægypto miræ fertilitatis, iv. 10.

ΠΟΛΙΟΝ. *Claff. incert.*

Σαρκοφυλλον, i. 16. fempervirens; cum Heliotropio enumeratur. N. B. Nomen ex canitie foliorum.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ. *Cryptog.*

Radix hirfuta, habens κοτυληδονας, (tentacula,) ὡσπερ Πολυποδος πλεκτανai, (cirrhi,) ix. 14. folia Πτεριδος, (vid. infr. Πτερις) ου φυει σπερμα: fc. nudo oculo vifibile, ix. 22.

ΠΡΑΣΙΟΝ. *Didyn.*

Θαμνος πολυκλαδος, ὑποδασυς, (foliis fub-pubefcentibus,) λευκος, (incanis,) foliis εντομας βαθειας (ferraturas profundas) εχουσι ῥαβδοις τετραγωνοις· ανθεσιν εκ διαςηματων επι ... καυλων,

(floribus ad intervalla verticillatim dispositis,) vi. 1, 2. Var. duæ: 1. π. ποωδης, foliis majoribus. 2. π. αυχμωδης, foliis minoribus, glaucis, ib.

ΠΡΑΣΟΝ. *Hexand.*

Affinis Γηθυου et Κρομμυου; bulbis propagatur, vii. 1.

ΠΡΑΣΟΝ ΠΟΝΤΙΟΝ. *Cryptog.*

Πλατυφυλλον· παλαιςιαιον, θαυμαςου μεγεθους, iv. 7.

ΠΡΙΝΟΣ. *Monœc.*

Μητρα σκληροτερα, i. 9. sempervirens, i. 15. foliis παρακανθιζουσι, (margine spinosis,) i. 16. Hab. montibus Macedoniæ, iii. 4, 5. ενιαυτοφορος, iii. 6. βαθυριζοτατος, iii. 7. κοκκος (galla) rubra? iii. 8. cortex λειοτερος, (aliis) lign. compactum, tenax; fructus βαλανωδης, sed minor glande Quercûs; ὁ νεος περικαταλαμβανει τον ἑνον, (fructus recens prodit antequam fructus prioris anni deciderit,) φερει παρα την βαλανον κοκκον φοινικουν, (v. supr.) iii. 16. v. 7. lignum ad axes, et alia, v. 8.

ΠΡΟΥΜΝΟΣ. / ΠΡΟΥΜΝΗ. *Icosandr.*

Gummosa arbor, ix. 1. οπος δακρυωδης hujus arboris, cum Κερασῳ et aliis, ib.

ΠΤΕΛΕΑ. *Pentandr.*

Truncus κραδαις (vid.) obnoxia, i. 13. ςρεφονται τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, i. 16. vid. Ελαια. Spec. φιλυδρα· βλαςανει απο παρασπαδων, (surculos ex radicibus emittit,) iii. 1. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur de fructu Πτελεας, utpote et Salicis et Populi, iii. 6. πρωϊβλαςος, ib. παρυδρα, και ευαυξης, iii. 7. præter folia fert βοτρυν, και θυλακωδες τι, (Perianthium monophyllum turbinatum Linn. G. Pl. 316.) primo vere, antequam folia prodeant. N. B. Θυλακος folliculus, iii. 3.

Spec. duæ: 1. Πτελεα.
2. Ορειπτελεα.

ex loco natali. Folia Ulmi κεχαραγμενα ησυχη, (leviter serrata,)

τραχεα δε, και ου λιαν, (ſub-aſpera.) Arbor magna, ligno flavo, firmo, fibroſo; γλισχρῳ· (lento) totum cor; variis uſibus inſerviens. Spec. ſterilis, αλλ' εν κωρυκεσι, (id. q. θυλακοις?) · το κομμι, και θηρια αττα κωνωποειδη, (vid. Κωνωψ,) τας δε καχρυς ιδιας εχει πολλας, μικρας, μελαινας· εν δε ταις αλλαις χωραις ουκ επισκεπτεται, iii. 14. lignum αστραβεστατον, (vid.) ασαπες εν αερι, qu. v. 4, 5. ad cardines ligneos, v. 8. οπος δακρυωδης εν κωρυκεσι, ix. 1.

ΠΤΕΡΙΣ. *Cryptog.*

Μισοκοπρος· απολλυται δε επικοιμωμενων των προβατων, viii. 8. radix pulveriſata adverſus tæniam, ("tape-worm.") Hab. Ægyptia, Arabia, &c. ix. 22. Deſc. nulla, ſed nomen certe ex forma folii πτερυγα æmulante.

ΠΥΓΟΣ? *Claſſ. incert.*

Semel occurrit, et, ut videtur, ex errore textûs, pro Φηγος. Enumeratur cum Πυξῳ, iii. 4.

1. ΠΥΞΟΣ. *Monœc.*

Lign. ponderoſum, i. 8. ſine μητρα, i. 9. ανοζος. i. 13. ſempervirens, i. 15. ευαυξης, iii. 4, 7. foliis Myrti, iii. 15. amat frigida et montuoſa loca, ib. Flores abundant melle, ſed pravi ſaporis, ib. Lign. in aqua ſubſidens, v. 4. utile ad ſtatuas faciendas, v. 5. item εις αξονας, και ἑλκηθρα τοις αροτοις, (vid.) v. 7.

2. ΠΥΞΟΣ. *Cryptog.*

Cum Μυκητι, (Agarico L.) Κρανιῳ, (Lycoperdoni L.) i. 9.

ΠΥΡΟΣ. *Triandr.*

Caulis ινοφλοιος, (cuticula fibroſa,) i. 8. πυκνορριζος, i. 9. ευυμενισπερμος, (ſemen in gluma membranacea,) i. 18. mutatio fabuloſa in Αιραν, ii. 5. πρωισπορος, viii. ſemen germinat ἑκατερον εξ ἑκατερου του ακρου, (Corculum ex uno apice, plumula ex altero *Bot.*) viii. 2. maturatur ſemen 40 dies μετ' ανανθησιν, viii. 3. ſemen εν χιτωσι πολλοις, (glumis) σταχυς αστοιχος, (opp. ordine regulari ſeminum in ſpica hordeacea,) viii. 11. Var. cultæ Tritici hæ.

π. Λιϐυκος.	π. Αλεξανδρειος.
π. Ποντικος.	π. Ασσυριος.
π. Θρακικος.	π. Αιγυπτιος.
π. Καγχρυδιας.	π. Σικελικος.

N. B. π. Σικελικος omnium βαρυτατος, viii. 4, 5. Grana Πυρου servantur 30 vel 40 annos.

P.

ῬΑΜΝΟΣ ἡ. *Pentandr.*

Fruticosa. Spec. duæ: 1. ρ. λευκη. 2. ρ. μελαινα; fructûs colore discrepantes: ambo spinosæ, iii. 17. χειφυλλος. de C. Pl. i. Lignum durum ad εσχαραν πυρειας utile, (vid.) v. 10.

ῬΑΦΑΝΙΣ. *Tetradyn.*

Δενδρου φυσιν εχων, i. 4. radix σαρκωδης, i. 9. vii. 3. corticata, i. 10. inter λαχανα culta, cujus satio μετα τροπας χειμερινας, vii. 1. radix μια, μακρα, παχεια, ορθη, αποφυσεσι μικραις, (radiculis lateralibus,) vii. 2. φλοιος αφαιρετος, (avulsu facilis,) ib. caulis πλαγιοκαρπος, (fructum ferens in ramulis lateralibus,) vii. 8. Var. cultæ plurimæ.

1. ρ. Καρινθια.	4. ρ. Κλεωνια.
2. ρ. Λειοθαλασσια.	5. ρ. Ευζωμος.
3. ρ. Βοιωτια.	

N. 1. Ευαυξεστατης, ριζα γυμνη, i. e. εξω της γης.

N. 2. Aliter λειοθασια vel Θρακικα; var. ισχυρος adversum hyemem.

N. 3. Radice orbiculari, succo dulci.

N. 4. Radice μακρα, (longa.)

N. 5. Foliis Ευζωμου.

N. B. Species, foliis lævioribus, dulciores. vii. 4.

ῬΑΦΑΝΟΣ. *Tetradyn.*

Μονορριζος, (sed non σαρκορριζος,) i. 9. sempervirens, i. 15.

σαρκοφυλλος, i. 16. αλλον τροπον σαρκωδης· εν πλατει, ουκ εν ϛρογγυλοτητι, (folia carnofa, cum expanfione.) ακροκαρπος, και πλαγιοκαρπος, i. 23. odor noxius Viti, iv. 20. feritur μετα πρωτοις αροτοις, vii. 1. Var. tres.

1. ρ. ουλοφυλλος.
2. ρ. λειοφυλλος.
3. ρ. αγρια.

Foliorum προσθεσις πλατεια, (ima pars pedunculi folii expanditur, et caulem amplectitur,) vii. 6.

'ΡΟΔΟΝ. 'ΡΟΔΩΝΙΑ. } *Icofandr.*

Frutex fempervirens, i. 15. Flores fuperi *Bot.* i. 22. προρθακανθος, (ramis fpinofis,) vi. 1. propagatur quandoque ex femine: fæpius καταχοπτοντες τον καυλον εμφυτευουσι, vi. 6. Var. plurimæ.

1. πενταφυλλα.
2. δωδεκαφυλλα.
3. εικοσιφυλλα.
4. ἑκατονταφυλλα.

'ΡΟΔΟΥ ανθει δενδρον. *Claff. incert.*

Arbor πολυφυλλος, flore Rofæ, nocte clauditur; unde dicitur καθευδειν, iv. 9.

'ΡΟΙΑ. 'ΡΟΑ. } *Icofandr.*

Arbor mediæ magn. cum Μηλεα, i. 4. βραχυϛελεχης, i. 8. μητρα σαρκωδης; radices horizontales, i. 9. truncus parte fuperiore major, i. 14. ϛενοφυλλος, i. 16. fapor fructus acidus, i. 19. flores punicei, i. 21. fuperi, i. 22. floret in furculis prioris anni, i. 22, 23. Pericarpium vel fructus, humidus, εχων τα ανω μυχωδη, (de loculamentis Pericarpii. L. G. Pl. 618 [a].) Var. plurimæ. Serendo degenerat, ii. 3. Germinat bis in anno, iii. 7. βραχυβιος, iv. 14. προρθακανθος ftatu fylveftri, vi. 1.

[a] Φανερωτατα δε τω κεχωρισθαι τα (περικαρπια) της 'Ροιας, (de Pomo Punicæ novemloculari L. G. Pl. 618.) i. 18

'ΡΟΥΣ. *Pentandr.*

Spec. duæ; 1. ῥ. αῤῥην. 2. ῥ. θηλεια. Folia amborum ὁμοια Πτελεας, fed longiora, pubefcentia, των δε κλονιων των νεων εξ ισου τα φυλλα εις δυο, (foliis pinnatis per paria oppofita,) καταλληλα δε, (folia ipfa alterna,) βαπτουσι τυτοις οἱ σκυτοδεψικοι τα λευκα δερματα, (Coriarii utuntur hifce ad coria depilanda,) ολιγοῤῥιζος, επιπολαιοριζος. Lign. fine medulla, iii. 18.

'ΡΥΤΡΟΣ. *Claff. incert.*

Planta ακανθωδης, Κνικου affinis, ανωθεν αποφυσεις εχων, (vid. αποφυσις,) femel occurrit, vi. 3.

Σ.

ΣΑΡΙ το. *Triandr.*

Vox Ægyptia: Pl. paluftris, cum Παπυρῳ et Μνασιῳ; nafcitur poft Nili inundationem: radix dura, contorta; caulis (σαριον dict.) bicubitalis, magn. pollicaris, triqueter. Panicula laxa, inftar Papyri: fuccus dulcis, manducando ab incolis expreffus: radix ad carbonandum optima, iv. 9.

ΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. caulis foliofus, i. 16. ευωδης, i. 19. affinis Anethi et Fœniculi; radix fufiformis, i. 9. Planta herbacea, loca irrigua amans, iv. 9. feritur μεθ' ἡλιυ τροπας, δευτεροις αροτοις, (autumno,) femen δυσφυεςατον παντων, (tardiffime germinans,) vii. 5. non tranfplantatur, ib.

ΣΕΣΕΛΙ. *Pentandr.*

Enumeratur cum Ariftolochia et Hippofelino: vires pharmaceuticæ. Hab. montibus Arcadiæ, Tegeæ, Clitoriæ, Telethrii, ix. 15.

ΣΗΜΥΔΑ. *Monœc.*

Arbor mediæ magn. cum Alno: foliis Coryli, ſed anguſtioribus: cortex verſicolor: lignum leve ad baculos faciendos; iii. 14.

ΣΗΣΑΜΟΝ. *Didyn.*

Pericarpium peculiare, i. 18. Inter ανωνυμα κοιν. προσηγορια cum Κεγχρῳ et Ελυμῳ, viii. 1. ſemen germinat cito; cum Eryſimo enumeratur, ut affinis, ανθει φυλλωδει, (flore monopetalo, in quo differt a Κεγχρῳ, cujus flos χνοωδης,) πολυκαρποτατος, viii. 3. ſemina non comeduntur cruda, viii. 7.

ΣΙΔΗ. *Claſſ. incert.*

Species aquatica, ita vocata ex ſimilitudine fructûs σιδιων vel pomo Mali, *granati*. Pericarpium deſc. ὡς κυτινωδες τι τοιουτον πλην μειζω, (vid. κυτινος,) μεγεθει δε ὁλος ὁ ογκος ἡλικον μηλον· φυλλοις ποωδεσι εξωθεν παραπλησια τοις των ʽΡοδων, τετταρα τον αριθμον. Intus κοκκους ερυθρους εχει, rotundos, parvos; ſuccus aquoſus. Flos ὁμοιος ʽΡοδου καλυκι, (q. an calyci?) ſed duplo major, aquis innatans utpote et folium. Pericarpium maturum κατακλινει εις το ὑδωρ και συναπτει επι τῃ γῃ, unde ſemina germinant, iv. 11.

ΣΙΚΥΑ. *Monœc.*

Δενδρου ὑψος εχει, (ſp. habitu valde luxurians et altiſſime ſcandens loco natali.) de C. Pl. l. v. Cum Σικυῳ, i. 22.

ΣΙΚΥΟΣ. *Monœc.*

Succus aquoſus, i. 19. flores ſuperi, i. 22. ſeritur æſtate, vii. 1. ſemen germinat diebus ſex, ib. βραχυριζος, (radicibus tenuibus,) floret longum tempus, και επιβλαστανει, (ramulos novos profert,) vii. 3. Var. cultæ.

1. σ. Λακωνικη.
2. σ. Σκυταλεια.
3. σ. Βοιωτικη.

Irrigatione gaudet, vii. 4, 5. κονιορτῳ maturatur. Vid. κονιασις. de C. Pl. iii.

ΣΙΚΥΟΣ αγριος. *Monœc.*

Spec. perennis, vii. 10.

ΣΙΛΦΙΟΝ. *Pentandr.*

Radix magna, carnoſa, pharmaceutica, i. 11. ſylveſtr. naturæ, iii. 3. Hab. Cyrene, iv. 3. caulis fiſtuloſus peculiari modo: habitus Papyri, vi. 2. radix cubitum longa: folia, μασπετα dict. Σελινου ſimilia, ſed majora: ſemina lata, φυλλωδη, (membrana cincta,) vii. 3. επετειοκαυλον, (perenne.) Vere comeditur ſalutis cauſa, cruda, vel cocta. Porcos mire ſaginat. Succus duplex reſpectu virium; caulinus et radicalis. Athenis in vaſibus farinâ mixtus venditur. Hab. Libya περι την Συρτιν, υπ' Ευεσπεριδων, vi. 3. ſemen latum Ανδραφαξυος ſimile, membrana ad margines, vii. 3.

ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ. *Tetrandr.*

Ανθος ἁπλον τοις ειδεσι, (forſan unicolor, vel herbaceus,) enumeratur cum Ἑρπυλλῳ et Ἑλενιῳ, vi. 6. raro provenit ex ſemine, vi. 7.

ΣΙΣΥΡΙΓΧΙΟΝ. *Triandr.*

Enumeratur cum Aſphodelo; folia radicalia, i. 16. Planta bulboſa, bulbis non tunicatis: affinis Leucojo, vii. 13.

ΣΙΤΟΣ. *Triandr.*

Προωσει τῃ ὑπαρχουσῃ αυξανεται, (ſenſim, et ſine nova germinatione, εξ ακρου ſeſe producit creſcendo,) iii. 7. Vid. Πυρος.

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ. *Pentandr.*

Amat loca frigida; enumeratur cum Abſinthio, Helleboro, et aliis montanis, iv. 6. φαρμακωδης τῃ ῥιζα, ib. radix gummoſa, ix. 1. gummi, vel οπος inter medicamenta, ix, 10, 22.

ΣΚΑΝΔΙΞ. *Pentandr.*

Planta herbacea, επετειοκαυλος, (perennis,) cum Σικυῳ αγριῳ, vii. 8.

ΣΚΙΛΛΑ.
ΣΚΥΛΛΑ. } *Hexandr.*

In marinis, et arenofis prope mare, i. 7. radix corticata et tunicata, i. 10. vii. 9. folia αμισχα, (feffilia, *Bot.*) longa, nitentia, Afphodeli latiora, ευδιαιρετα, vii. 12. Spec. duæ: 1. σ. φαρμακωδης. 2. σ. επιμενιδειος, vii. 11.

ΣΚΟΛΥΜΟΣ. *Syngen.*

Foliis non fpinofis, vi. 3. radix edulis cruda et cocta: optima hyeme, vi. 4. floret vere cum Σικυῳ αγριῳ, viii. 10. ακολεθει τα αςρα, ut Heliotropium, vii. 14.

ΣΚΟΛΥΜΩΔΗΣ τις. *Claff. incert.*

Οπος εκςατικος, (maniam inducens.) Hab. Tegea, ix 13.

ΣΚΟΡΟΔΟΝ. *Hexandr.*

Enumeratur cum Κρομμυῳ, Σκιλλᾳ, &c. i. 16. Var. plurimæ, diftinguendæ foliis et radicibus, vii. 4. fc.

1. σκ. πρωϊον.
2. σκ. οψιμον,
3. σκ. Κυπριον.
4. σκ. ανευ γελγιδων, ib.
5. σκ. λειοκαυλον. vii. 8.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ. *Claff. incert.*

Cum Afparago fylveftri enumeratur, florens autumno; flos εν τῳ σαρκωδει τῳ εξοιδεντι ὑπο το ακρον της ακανου, (textus corruptus: forf. επι το ακρον, fc. ex fummitate Pericarpii,) vi. 3. flores primo albi, dein purpurafcentes: radix fimplex brevis, intorta Scorpii caudæ fimilis, unde nomen. Vires alexipharmacæ, ix. 14.

ΣΚΥΘΙΚΗ ʽΡΙΖΑ. *Claſſ. incert.*

Forſan Glycyrhiza L. ſuccus dulcis; Ευθυγλυκεια alio nomine; vires ad aſthmata et tuſſes. Hab. Mæotis. Deſc. nulla, ix. 13.

1. ΣΜΙΛΑΞ. *Diœcia.*

Species επαμφοκαυλος, (vid.) caule ſpinoſo; ſpinis rectis; foliis hederaceis; νωτηρῳ τινι κατα την τȣ μισχȣ προσφυσιν, (glandula ad baſin pedunculi?) ιδιον δε, ὁτι την δια μεσȣ ῥαχιν (nervum folii intermedium) εχει, και τας ςημονιȣς διαληψεις, (nervos ſtamineos, vel intermedios,) ȣκ απο ταυτης, (non pervenientes ex ipſo nervo centrali,) αλλα περι αυτην περιφερως ηγμενας, (lineis concentricis ductos,) ιουλος ἑλικτος, (cirrhus volubilis,) ανθος ευωδες, λειρινον· καρπος ςρυφνȣ, in ſummis ramulis, iii. 18. folia εις οξυ προηκοντα παρακανθιζοντα, i. 16.

2. ΣΜΙΛΑΞ. *Diœc.*

Spec. Quercus ab Arcadibus ſic dicta; αναμεσον Πρινȣ και Δρυος, iv. 7.

ΣΜΥΡΝΑ. *Claſſ. incert.*

Arbor odorifera maxime; hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. οπος δακρυωδης, (gummoſus,) ix. 1. colligitur ὑπο Κυνα, ("in the Dog-days,") ix. 2. cum ſucco Λιβανωτȣ: arb. mediæ magn. trunco nodoſo, flexuoſo; ſuræ magn. cortice ſpinoſo, ſcabro: folio Oleæformi, ix. 4, 7.

ΣΟΓΧΟΣ. *Syngen.*

Planta ακανθωδης, ακανῳ (capitulo) lævi, affinis Στρȣθιου, vi. 3. radix carnoſa, edulis; ακανος oblongus, poſt floreſcentiam εκπαππȣμενος, (pappo coronatus,) folium arefactione διαχειται, (laxum fit,) και ου κεντει, iv. 4.

ΣΠΑΛΑΞ. *Claſſ. incert.*

Enumeratur cum Croco et Περδικιῳ, radice magna, carnoſa, i. 11. an id. quod Ασπαλαθος? cujus ſuccus aromaticus, ix. 7.

ΣΠΕΙΡΑΙΑ. *Claſſ. incert.*

Spec. ακροκαρπος cum Ερεικα, i. 23. affinis Marrubii, &c. vi. 1.

ΣΠΟΔΙΑ. Syn. Κοκκυμηλιας.

ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ. *Triandr.*

Spica cylindrica, æquali, florens ſimul per totam ſpicam, ut Triticum; nomen ex figura ſpicæ: enumeratur cum Alopecuro, vii. 10.

ΣΤΕΛΙΣ. *Claſſ. incert.*

Cum Ιξια et Υφεαρ. de C. Pl. ii. p. 155.

ΣΤΟΙΒΗ. *Syngen.*

Foliis carnoſis, i. 16. παρ' ακανθαν ἑτερον εχων φυλλον, a quibuſdam dicta Φεως, vi. 1. Enumeratur cum Ononidi, Tribolo, ib.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ. *Claſſ. incert.*

Species φυλλακανθωδης: capitulo lævi, ut Σογχος, vi. 3.

ΣΤΡΥΧΝΟΣ. *Pentandr.*

Ab aliis Ευηπατον· radix edulis cocta et cruda, vii. 6. Var. tres.

1. Fr. dulci, eduli.
2. Fr. narcotico.
3. Fr. lethali, vel maniam ind. vii. 14.

N. 1. non deſcribitur.

N. 2. Radix recens alba; arefacta rubra: foliis Tithymalli: vires in cortice radicis.

N. 3. Dicta Θρυορος, radice magna, intus cava, ix. 12. Hab. M. Pelion, Oſſa, Tegea.

ΣΤΥΡΑΞ. *Monœc.*

Enumeratur inter aromata Mediæ et Indiæ. Fructus, vel Gummi ſolum occurrit, ix. 7.

ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ. *Monœc.*

Μητρα σκληροτατα, utpote et lignum totum; instar Ebeni et Loti, i. 9. arbor decidua, bacca οινωδει, i. 19. flos staminœus, i. 21. εν'αυτοις τοις ὁλοις περικαρπιοις; non in apicibus, ουδ' εν τοις περιειληφοσι καθ' ἑυχς-ον, αλλ' εν τοις παραμεσον, ib. Textus hic corruptus vide. De fructu tenello Mori, *nigræ* L. cum flosculis fœmineis granulis singulis insidentibus? Comparatur cum Hedera, i. 22. ex ligno θερμω (vid.) arb. hujus fiunt terebra πυρειας, (vid.) ικρια navium, (opera sculptilia,) και ςεφαναι, v. 7, 8.

1. ΣΥΚΗ. *Polygam.*

Amputatione eget, i. 5. βραχυςελεχης, λειοφλοιος, cortice μονολοπω: (vid) lignum carnosum, molle, porosum, i. 8. Medulla carnosa; radix horizontalis, i. 9, 11. lignum trunci sine nodis, i. 13. πλατυφυλλος, i. 16. fructus saporis mellei, οπωδης, (spissus,) ut Papaveris, i. 19. fructificat ex surculis ejusdem anni, i. 23. Cultura eget, ut aliæ fructiferæ spec. i. 22. Serendo degenerat, ii. 3. προμοσχευεται επ' αυτων των δενδρων, (inserendo cultæ species propagantur,) φυτευεται δε (etiam surculis propagatur, vel ex ramis, vel κραδαις trunci, ii. 7.) secunda germinatio ευδηλος, iii. 6, 7. Differentia inter Συκην et Κοτινον, (sylvestrem et cultam,) iv. 14. Lign. minus obnoxium vermibus, iv. 16. Si truncus scindatur, non perit, iv. 19. lign. ισχυρον, v. 7. de C. Pl. l. v. ubi tres differentiæ occurrunt.

1. σ. Λακωνικη.
2. σ. Λευκομφαλιος.
3. σ. Οπισθοκαρπιος.

De C. Pl. l. v. morbus peculiaris ψωριασις, vid.

2. ΣΥΚΗ Αιγυπτια. *Polygam.*

Καρποφορει εκ του ςελεχους, i. 23. habitus prioris; differt tamen modo fructificandi; fructus magn. ficûs, succo dulcedine ολινθοις simili, sine granis: επικνισθεις (vid.) maturatur citius, arbor πολυοπος σφοδρα; lign. utile, si statim submergatur, iv. 2.

3. ΣΥΚΗ Κυπρια. *Polygam.*

Species affinis Σ. Αιγυπτιας, sed non fructificans εκ ςελεχους, αλλ' εκ βλαςοις αφυλλοις, ("spurs;") δενδρον μεγα, iv. 2.

4. ΣΥΚΗ Ινδικη. *Dodecand.*

Radices agit ex ramis ſummis, i. 12. Radices hæ terram attingentes ſurſum ſeſe attollunt, *ποιουντες ὡσπερ δρυφρακτον*, (ſepimentum,) *ὡςε γινεσθαι καθαπερ σκηνην*; hoc modo arbor extenditur *επι δυο ςαδια*: folia ampla orbiculata, clypei parvi magn. fructus *συκοειδης* parvus, iv. 5. Hab. Fluvio Aceſin.

5. ΣΥΚΗ Ποντια. *Molluſc.*

Αφυλλος, μεγεθει ου μεγαλη, iv. 7.

ΣΦΑΙΡΙΟΝ.

1. *σφ. πιλος* vocat. *εριωδες, μαλακον, περι πυρηνος σκληροτερον*, (forſ. *περιπυρηνιον σκληρ.* Ald.) *ᾧ χρωνται προς τους λυχνους*, iii. 8.

2. *σφ. κομην εχον* (vid.) *αχρειον τ' αλλα, επιβαπτον δε χυλῳ μελιτηριῳ κατα την ἁφην*, (morbum cutis, an Lepra?) *και γευσιν*, (vid.) ib.

3. *σφ. αμισχον, η κοιλομισχον· ιδιον και ποικιλον· τας γαρ εσπανηκοτας ομφαλους* (*εχει*) *επιλευκους, η επιςιγμενους μελανι, και το αναμεσον κοκκοβαφες*, (ſenſus obſcurus; ſed *ομφαλοι* forſan cancelli) Clathrus, *cancellatus* hic deſcribi videtur, ib. Vid. Bull. Fungi.

4. *σφ. φυλλικον, συμπεπιλημενον, προμηκες*, (ſuper foliis naſcens? denſe ſtipatum.)

5. *σφ. λευκον, διαυγες* (pellucidum) *ὑδατωδες ὁταν ἁπαλον η* (primo ſtatu gelatinoſum) *τελειουμενον δε σκληρυνεται*, ut ſæpe fit in Boletis &c. ib.

ΣΦΑΚΕΛΟΣ. *Diandr.*

Inter *φρυγανα λαχανηρα* ſine ſpinis, cum *Ελελισφακῳ, Θυμβρᾳ, Κονυζῳ*, vi. 1. *Σφακελος*, foliis minoribus, odore minus acri, (Salvia officinalis?) *Ελελισφακος* e contra folio majore, odore *βαρυτερῳ*. (Vid. not. ad Tab. Syſtem.) vi. 2.

ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ. *Polygam.*

Hab. in montibus Macedoniæ, cum *Ζυγιᾳ*, iii. 4. ſpec. ſylveſtris dicitur *ανανθη ειναι*, iii. 6. *ευαυξης*, iii. 7. *ολιγορριζος*, ib. Spec. tres:

1. σφ. αγρια.
2. σφ. ζυγια.
3. σφ. κλινοτροχος.

N. 1. Lign. inutile.
N. 2. Lign. flavum, ϐλον, (molle? tortuofum?)
N. 3. Lign. album ευϊνον, (opp. ϐλῳ, fibris rectis,) foliis omnium lobatis inftar Platani, τεταχοις, (rigidis?) fed non æque carnofis, iii. 11. apice acuminatis, ib. cortice haud æque lævi ac Tiliæ, &c. υποπελιῳ, (leviter maculato,) radicibus pancis, horizontalibus. Hab. in locis irriguis circa Idam; flos incognitus: fructus Παλιϐρϐ fimilis. N. 3. aliter Γλεινος, voc. hyeme cæditur, v. i, 4.

ΣΧΟΙΝΟΣ. }
ΣΧΙΝΟΣ. } *Triandr.*

Planta ενυδρος. Species tres:
1. σχ. αρρην......οξυς, ακαρπος.
2. σχ. μελαγκρανιος / μελαγκρανις } καρπιμος.

3. σχ. ὁλοσχοινος....ευσαρκης, (folio rotundo craffo,) cujus ufus maxime προς πλεγματα, ("platted Rufh-work,") κορυνα δε ὁ καρπιμος, (fc. n. 2.) εξ αυτου του γραμμωδους εξοιδησας, (ex medio fcirpi linearis intumefcens,) κα'πειτα εκτικτει καθαπερ ωα, η ϛρογγυλοτητας, επισχαζουσας, (Pericarpia fubglobofa apicehiantia,) femen nigrum ακιδωδης, (cufpidi fagittæ fimile, triquetrum, acuminatum Linn. G. Pl. 67.) radix longa, craffa, iv. 13.

2. ΣΧΟΙΝΟΣ Καλαμος. *Hexandr.*

Radix miræ fuavitatis. Hab. in Lacu Orchomeni et in Αυλωνι της Συριας, ix. 7. N. B. Σχοινος και Καλαμος ut genera diverfa notantur. de C. Pl. I. vi.

3. ΣΧΟΙΝΟΣ Λιθινος. *Corall.*

Haud dignofcendus a Σχοινῳ ipfo, iv. 8.

T.

ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ.
ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ. } *Diœcia.*

Species duæ : 1. τ. αῤῥην, ακαρπος.
2. τ. θηλεια,

N. 1. Arbor excelſa. Hab. mont. Macedoniæ.
N. 2. Arb. humilis. } ſempervirentes, i. 15.

φυλλοις περι ενα μισχον πλειοσι, (foliis pinnatis, paribus numeroſiſſimis,) κατα συζυγιαν αγωνιωτερον της Οιης, (vid. γωνια) το εξ ακρου περιττον, (folio impari, *Bot.*) ανθει τῳ της Ελαιας ? ſed coloris rubri. Ligno γλισχρῳ (vid.) utpote et fructu; ſucco reſinoſo; φερει δε κωρυκωδη τινα κοιλα καθαπερ ἡ Πτελεα, (de amento laxo ſquamulis ovatis Linn. G. Pl. 1108.) τινι ῥητινωδει εντος, ſed non inde Reſina officinarum colligitur, iii. 15. ῥητινη απεπτος λευκη, ib. Germinat primo vere, iii. 6. lignum reſinoſum ad alia inutile, v. 8. Inciſione æſtate media reſina obtinetur. Mons tota in Syria Terebinthis cooperta, ix. 2.

ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ ὁμοιος. *Claſſ. incert.*

Similis Τερμινθῳ, fructu excepto. Fructus amygdaloides, guſtu gratus, iv. 5.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΑ. *Pentandr.*

Οψιβλαστοτατος· enumeratur cum Aria, iii. 6. ſic dictus a forma quadrangulari Pericarpii, ib.

ΤΕΤΡΑΛΙΞ. *Claſſ. incert.*

Cardui ſpecies ex ordine loborum folii per paria oppoſita, *Bot:* æſtate florens cum Ιξινῃ, vi. 3.

ΤΕΥΤΛΟΣ.
ΤΕΥΤΛΟΝ.
ΤΕΥΤΛΙΟΝ.
ΤΕΥΤΛΙΣ. } *Pentandr.*

Cultura ligneſcit, i. 15. caulis carnoſus, i. 8. radix f...ormis,

i. 9. folia *carnosa*, succo dulci, i. 16. επισπορος, (vid.) vii. 1. εμφλοιοσπερμος, (seminibus membranaceis tenuibus, compressis calyce involutis, Linn. G. Pl. 310.) Var. plurimæ inter cultas, vii 4. coctione eget ad usus culinarios, vii. 6, 7.

ΤΙΓΡΙΝΟΝ ξυλον. *Class. incert.*

Ex insula Τυλω in Arabia: βαρυ σφοδρα: striis in ligno, ut in pelle Tigridis. Usus ad baculos, v. 6.

ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΣ. *Dodecand.*

Spec. quatuor: 1. τ. παραλιας. 3. τ. μυρτιτις.
2. τ. αρρην. 4. τ. Συριακος.

omnes communi nomine ut plantæ πανακεις cum Στρυχνω, sc. οἱ Στυχνοι, και οἱ Τιθυμαλλοι, ix. 12. τ. παραλιας vocatur κοκκος, folio subrotundo; caule magn. σπιθαμης; fructu albo, ib. τ. αρρην, folio Oleæ; altitudo caulis διπηχυαιος, (bicubitalis.) τ. μυρτιτις, aliis τ. λευκος, folio Myrti magn. apice spinoso: ramulis sparsis per terram: fructus vocatur καρυον, ix. 12. τ. Συριακος, alias Πανακης, hab. Syria: vires φαρμακευτικαι σφοδρα, ix. 8, Hab. n. 1, 2, 3. Pelion, Ossa, Tegæa, Telethrium, ix. 15.

ΤΙΦΗ. *Triandr.*

Enumeratur cum Πυρω ut πυκνορριζος, i. 9. mutatio fabulosa, ii. 5. πρωϊσπορος æque ac Πυρος, Ζεια, Κριθη, viii. 1. maturat semen 40 dies μετ' απανθησιν, viii. granum (vel forsan spica) omnium maxime leve, ib.

ΤΙΦΥΟΝ. Vid. Ιφυον.

ΤΟΞΙΚΟΣ. Vid. Καλαμος.

ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΑ. *Diadelph.*

Enumeratur cum Ιξια, ut species gummifera, ix. 1. Gummi sponte fluit, ix. 8. Hab. Laconia, ix. 15.

ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ. *Syngen.*

Caule brevi; perianthio magno; barba (πωγων) pappo longo, πολιω Bot. vii. 7.

1. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Tetrandr.*

Species fluviatilis, εν ελωδεσι των ποταμων, (in profundis et limoſis fluviorum,) folia aquis innatant, in quorum medio fructus: folia ſimilia Πτελεας, pedunculis longiſſimis: caulis ſuperne craſſus, inferne tenuis, εχων αποπεφυκοτα τριχωδη, (Stipulas *Bot.* lineares,) τα μεν πλειστα παραλληλα, (oppoſita,) τα δε και παραλλαττοντα, (alterna,) το μεν παραβλαστημα εστι, ωσπερ καυλος αλλος, (caules ſecundarii magn. æquales primario,) fructus ater, και σκληρος σφοδρα, iv. 11.

2. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Decandr.*

Provenit in novalibus, iii. 1. εχων παρ' ακανθον φυλλα, (ſpinis a folio ſeparatis,) vi. 1., ſpinis ad caules, et in foliis, vi. 3. επετειοκαυλος, (ſpecies perennis,) vii. 8.

ΤΡΙΟΖΟΣ. Vid. Ακανθα.

ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ. *Claſſ. incert.*

Planta pharmaceutica decantata ab Homero et Heſiodo. Radix in uſu, quæ nocte effodienda eſt εις παν πραγμα σπουδαιον (antequam res magni momenti aggredienda ſit.) Deſc. nulla, ix. 21.

ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. *Cryptog.*

Caule Adianti nigri; folia parva admodum, και πυκνα.

ΤΥΦΗ. *Monœc.*

Caulis αδιαφρακτος, (ſine nodis,) hab. in Lacu Orchomeni, i. 8. enumeratur cum Σχοινῳ· ιδιωτατον γενος; foliis nullis; radicibus paucis; εχων εις τα κατω την ορμην, (profunde radicata,) iv. 11.

Υ.

ὙΑΚΙΝΘΟΣ. *Hexandr.*

Inter στεφανωτικα. Species duæ:

υ. αγρια.
υ. σπαρτη.

Flos διαμενει, vi. 7. Hab. in montosis.

'ΥΔΝΟΝ. *Cryptog.*

Sub terra degit, cum Ασκιῳ, Ουιτῳ, sine radice, i. 9, 10.

'ΥΛΗΜΑ τι. *Polygam.*

Παθος συμβαινον αυτῳ ιδιον, (sensibilitas, vel irritatio peculiaris,) εαν τις άψηται των κλονιων, τα φυλλα, ώσπερ αφαυαινομενα συμπιπτει, ειτα μετα τινα χρονον αναβιωσκει, και θαλλει. (Descriptio accuratissima του παθους Mimosæ, *sensitivæ* L.) folia pinnata, ramis spinosis, iv. 3.

'ΥΠΟΧΟΙΡΙΣ. *Syngen.*

Inter olera culta κιχωριωδη, vii. 7. foliis lævibus; succo haud æque amaro ac Cichorii: successive floret; semina φοβη (capsula vid.) involuta. Spec. ad usus humanos, vii. 11.

'ΥΦΕΑΡ. *Class. incert.*

Species parasitica, in arborum truncis. Enumeratur cum Ιξιᾳ, ut affinis. Amat meridionale latus; Ιξια προς βορῥαν, iii. 16.

Φ.

1. ΦΑΚΟΣ. *Diadelph.*

Leguminis gen. Indicum, ita a Græcis sub Alexandro magno vocatum, iv. 5.

2. ΦΑΚΟΣ. *Diadelph.*

Leguminis gen. οψισπορος, viii. 1. πλαγιοκαυλος: enumeratur cum Erebintho et Οροβῳ: omnium πολυκαρποτατος, viii. 3.

Spec. duæ: 1. φ. λευκος.
2. φ. μελας.

Prioris semina dulciora, viii. 5.

ΦΑΣΓΑΝΟΝ. Vid. Ξιφιον, vii. 11, 12.

ΦΑΣΚΟΣ. *Cryptog.*

Ὁμοιος τοις βραγχιοις ιχθυων, ("Gills,") Anne Lichen? iii. 9.

ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ.
ΦΕΛΛΟΣ. } *Monœc.*

Cortice aſpero, i. 8. ſempervirens, i. 15. ϛρεφονται τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, (vid. Ελαια, p. 19. et Lex. Theophraſt.)

Spec. duæ: 1. φ. Αρκαδων.
2. φ. Τυῤῥηνων.

N. 2. arbor decidua, iii. 16. cortex duplex; exteriore αφαιρομενῳ ευθενει το δενδρον, iv. 18.

ΦΕΩΣ. *Claſſ. incert.*

Caule et foliis ſpinoſis, vi. 3. folio carnoſo, cum Ononide, Tribulo &c. vi. 4.

ΦΗΓΟΣ. Vid. Δρυς.

ΦΙΛΛΥΡΑ. *Diandr.*

Sempervirens, i. 15. λεπτοφλοιος· ϛρεφει τα ὑπτια των φυλλων, (vid. Ελαια, p. 19.) i. 16.

ΦΙΛΥΚΗ. *Claſſ. incert.*

Species ſempervirens, i. 15. hab. in mont. Macedoniæ, iii. 4. ſero germinat, iii. 6. lign. ευεργοτατον, μαλακον, v. 7.

ΦΙΛΥΡΑ. *Polyand.*

Lign. ευκαμπτον, i. 8. folia guſtu dulcia, fructus autem αβρωτος, i. 20. Καχρυας εχει, (vid. infra) iii. 7.

Spec. duæ: 1. φ. αῤῥην.
2. φ. θηλεια.

N. 1. ſine fructu; ligno duro, enodi.

N. 2. ανθος καλυκωδες (apetalus) παρα τον του φυλλου μισχον, (ex pedunculo folii enaſcens,) και παρα την εις νεωτα καχρυν εφ' ἑτερυ μισχυ, (an de calyce deciduo? Linn. G. Pl. 660.)

Fructus pisiformis; pedunculo longo: γωνιαις πεντε, (eminentiis, Angl. "ridges?") οἱον ινεσι προεχουσαις, semina intus plura, parva; folia subrotundo-acuminata, πλην εκ προσαγωγης μαλλον ἡ περιφερεια, και το προς μισχον κυρτοτατον, (inferior pars versus basin brevior,) iii. 10. folia margine serrato, ib. hyeme lign. cæditur, substantia μανα, (porosa,) v. 4, 6. προς σανιδωματα νεων, (vid.) v. 8.

ΦΛΟΓΙΜΟΝ. *Class. incert.*

Forsan ex colore flammeo? οἱ ςεφανηπλοκοι χρωνται· πολυ εκτρεχει των αλλων, (omnium præcocissimum,) vi. 7.

ΦΛΟΜΟΣ. *Class. incert.*

Species Φλομε, μελαινα dicta. Obiter mentio fit per comparationem, ix. 15.

ΦΛΟΞ. *Class. incert.*

Inter ςεφανωτικα αοσμα cum Διος ανθει, vi. 6.

1. ΦΟΙΝΙΞ. *Palmæ.*

Amat maris littus, i. 7. απαραβλαςος, i. 13. τραχυφλοιος, ξυλωδει, i. 8. μητρα nulla, i. 9. μονοςελεχος, εις μηκος μονον αυξητικος, (magn. fere æquali,) i. 14. sempervirens, i. 14, 15. καλαμοφυλλος, και γωνιοφυλλος, (vid.) i. 16. ευθυς σπερμα μετα το περιεχον, (nucleus immediate infra corticem,) succus fructûs μελιτωδης, i. 19. ακροκαρπος, i. 23. propagatur σπερμασι μονον, ii. 2, 3. amat arenosa salina. Spec. sex:

1. φ. Βασιλικος.	4. φ. Αιγυπτιος.
2. φ. Κυπριος.	5. φ. Κυκας.
3. φ. Βαβυλωνιος.	6. φ. Χαμαιρεφης.

N. B. Dantur etiam species διφυεις και τριφυεις, (bi- tri-cipites, ii. 8.) Hab. Nasamone juxta Hammonis templum, iv. 3. et Ins. Delos, iv. 14. Decacuminatione moriuntur, iv. 19. lign. in usu ad statuas faciendas, v. 4. lign. ισχυρον, αναπαλιν γαρ ἡ καμψις, ἡ τοις αλλοις, (de elasticitate ligni?) τα μεν γαρ εις τα κατω καμπτεται· ὁ δε Φοινιξ εις τα ανω, v. 7. δυσκαπνος ιδια φυσει, (an

ad ignem concipiendum, vel reſpectu carbonationis ?) v. 10. methodus propagandi ex ſpatha. de C. Pl. i.

2. ΦΟΙΝΙΞ ποντιος. *Lithoph.*

Βραχυςελεχης σφοδρα. εκφυσεις ῥαϐδων (ramuli ſecundarii) ευθειαι· ε κυκλοθεν, καθαπερ των ῥαϐδων οἱ ακρεμονες· αλλ' ὡς εν πλατει, (habitus ſurſum complanatus, *Bot.*) κατα μιαν συνεχεις, (ſerie continua,) iv. 7.

ΦΥΚΟΣ. *Cryptog.*

Nomen generale plantarum marinarum. Dividuntur in προσγεια (littoralia) et ποντια (pelagica :) item in πλατυφυλλα et τριχοφυλλα.

1. Πλατυ τετανοειδες, radice tunicata, hirſuta, iv. 7.

2. Δρυς ποντια, επι λιθοις προσπεφυκυια, ſine radice; ὡσπερ λεπαδες ad baſin caulis, ib.

3. Ελατη ποντια σαρκοφυλλα; ſed ramis longioribus, ib. v. 20.

4. Αμπελος ποντια, fructu rotundo, uvæ magn. ib. v. Vid. ſupr.

5. Πρασον ποντιον, affine, n. i. ib. Vid. ſupr.

6. Ἑτερον πρασον ποντιον, cujus longitudo bicubitalis ad columnas Herculis, ib.

7. Φυκος βαπτικος. Hab. in littoribus Cretæ, ib.

8. Φ. ὡσπερ Μαραθρον, ib.

9. Φ. ὁμοιον Αγρωςει, caule nodoſo, ib.

10. Φ. ὁμοιον Θριδακιναις, πλην ῥυτοδεςερον (rugoſiorem.) ſpec. acaulis, ib.

11. Συκη ποντια, αφυλλος, μεγεθει ε μεγα, coloris φοινικες. Vid. ſupr. p. 72.

12. Φοινιξ ποντια, ib. N. B. n. 11. inter Mollufcas Linn. n. 12. inter Lithophyta ? Vid. ſupr. p. 79.

ΦΥΛΛΟΝ το. *Claſſ. incert.*

Spec. duæ : φ. αῤῥενογονον.
φ. θηλυγονον.

X.

ΧΑΛΒΑΝΗ. *Pentandr.*

Planta gummofa, cujus odor βαρυς, ix. 7. Gummi vocatur Χαλβανον, item Γαλβανον, ix. 1.

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ. *Didynam.*

Foliis Quercûs, fragrantibus: fpecies humilis; vires alexipharmacæ, ix. 10. folia tunfa ulceribus applicantur αργεμασι, (vid.) fructus καθαιρει χολον, ib. Alt. σπιθαμιαιος.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ. *Syngen.*

Affinis Atractylidis, Cnici, &c. ε φυλλακανθης, vi. 3.

Species duæ: 1. χ. λευκος.
2. χ. μελας.

N. 1. Foliis Σκολυμε· ακανῳ (pericarpio) μεγαλῳ· οπῳ γλυκει. vi. 3.

N. 2. Foliis fimilibus, fed minoribus; radice craffa, coloris flavi; οπῳ βαρει. Hab. in montofis frigidis. Canes et fues necat, ix. 13.

ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. Vid. Φοινιξ.

ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατος.

Spec. repens; ἑρπων επι της γης, ἡ συναπτει.

ΧΑΡΑΚΙΑΣ. Vid. Καλαμος.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ. *Polyandr.*

Affinis Heliotropii et Scolymi, ἁμα τῃ Χελιδονι ανθει· η αιτια φυσικη, η συμπτωματικη, vii. 14.

ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ. *Syngen.*

Inter λαχανα, vii. 11.

Ψ.

ΨΕΥΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Dictamni affinis. Hab. in asperis montium Cretæ, ix. 16.

Ω.

ΩΚΙΜΟΝ. Vid. Οκιμον.

ΩΧΡΟΣ. *Diadelph.*

Species leguminosa, folio longiore, cum Piso, Lathyro, viii. 3: επιγειοκαυλος, ib. obnoxius σκωληκι, viii. 10.

Vegetabilia, Græco ſermone, fere ſemper Maſculini, vel Feminei generis; Fructus autem, Gummi, Succus, aliudve quoddam inde natum, ſemper Generis neutri. Exempla quæ ſequuntur ex Theophraſto, et inter legendum occurrentia, ſiſto.

ΑΜΥΓΔΑΛΗ, Arb.
ΑΜΥΓΔΑΛΟΝ, Nux.

ΑΠΙΟΣ, Arb.
ΑΠΙΟΝ, Fructus.

ΕΛΑΙΑ, Arb.
ΕΛΑΟΝ, Fructus.

ΕΡΙΝΕΟΣ, Arb.
ΕΡΙΝΟΝ, Fructus.

ΙΩΝΙΑ? Planta.
ΙΟΝ, Flos.

ΚΑΡΔΑΜΟΣ, Planta.
ΚΑΡΔΑΜΟΝ, Semen.

ΚΑΡΥΑ, Arb.
ΚΑΡΥΟΝ, Nux.

ΚΑΣΤΑΝΟΣ, Arb.
ΚΑΣΤΑΝΟΝ, Nux.

ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΣ, Arb.
ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ, Cortex vel Oleum.

ΚΡΑΝΕΙΑ, Arb.
ΚΡΑΝΙΟΝ, Fructus.

ΜΗΛΕΑ, Arb.
ΜΗΛΟΝ, Fructus.

ΟΥΗ, Arb.
ΟΟΝ, Fructus.

ΠΑΝΑΚΗΣ, Planta.
ΠΑΝΑΞ, Succus inſpiſſatus.

ΟΛΙΒΑΝΟΣ? Arb.
ΟΛΙΒΑΝΟΝ, Gummi.

ʽΡΟΙΑ, Arb.
ʽΡΟΟΝ, Fructus.

ʽΡΟΔΩΝΙΑ*? Planta.
ʽΡΟΔΟΝ, Flos.

---

* Vide notam p. 13.

TABULA SYSTEMATICA,

LINNEANA,

PLANTARUM THEOPHRASTI.

TABULA SYSTEMATICA,

LINNEANA,

PLANTARUM THEOPHRASTI.

Monandria.

ʽΑΛΙΜΟΝ. Salicornia, *fruticosa?* iv. 20. de C. Pl. vi.

ΑΜΩΜΟΝ[a]. Amomum? ix. 6, 7.

ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ[b]. Amomum, *Cardamomum?* ix. 7.

ΚΟΣΤΟΣ. Coſtus, *Arabicus,* ix. 7.

Diandria.

ΒΟΥΜΕΛΙΑ. Fraxinus, *excelſior,* iii. 11. iv. 9.

ΕΛΑΙΑ. Olea, *Europæa,* i. 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23. ii. 7. iii. 3, 5, 8. iv. 15, 19. v. 4, 5. vi. 2.

ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ[c]. Salvia, *officinalis,* vi. 1, 2.

ΚΟΤΙΝΟΣ[d]. Olea, *ſylveſtris,* i. 7, 13, 24. ii. 3. iv. 14. v. 4, 9.

ΜΕΛΙΑ[e]. Fraxinus, *Ornus,* iii. 4, 6, 7, 11. iv. 14. v. 8.

---

[a] Fructus ſolum inter unguentaria memoratur.

[b] Incertum an A. *Cardamomum* L. cujus nulla apud Bauhinum mentio: forſ. A. gran. Paradiſi Bauh. Pin. 413. An id. cum priore?

[c] Salvia L. genus ampliſſimum, cujus in Syſt. Pl. Linn. ed. 3. ſpec. 32; in ed. D. Willdenow, A. D. 1797. 76 enumerantur. Spec. duæ ſolum apud Theophr. occurrunt, Ελελισφακος et Σφακελος. Flor. Græc. faſc. 1mo. 13 Salviæ ſpecies accuratiſſime delineantur. Notandum eſt Salvias ſcabritie foliorum, nec non odore, adeo inter ſe convenire, ut non, niſi a Botanicis ſyſtematicis, ita ſubtiliter eas partiri opus fuerit.

[d] Nulla ſpecifica differentia inter Ελαιαν et Κοτινον in Syſt. Linn.

[e] Vid. Flor. Græc. faſc. 1. t. 4. N. B. Nulla mentio Βουμελιας in hoc opere.

ʽΟΡΜΙΝΟΝ. Salvia, *horminum*, viii. 1, 7.

ΠΕΠΕΡΙ. Piper, *nigrum*, ix. 22.

ΣΦΑΚΕΛΟΣ. Salvia, *hortensis?* vi. 1, 2.

ΦΙΛΛΥΡΑ[a]. Phillyrea, *latifolia*, i. 8, 15.

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ[b]. Veronica, *Chamædrys*, ix. 10.

Triandria.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ[c]. Agrostis, i. 10. iv. 11[d].

ΑΙΓΙΛΩΨ. Avena, *fatua*, vii. 7, 8, 9, 11, 12.

ΑΙΡΑ. Lolium, *temulentum*, i. 8. viii. 4. 9.

ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ[e]. Alopecurus? vii. 10.

ΒΡΟΜΟΣ[f]. Secale, *Cereale*, iv. 9. viii. 4, 11.

ΔΟΝΑΞ[g]. Arundo, *Donax*, iv. 12.

ΕΛΥΜΟΣ. Panicum, viii. 10.

ΖΕΙΑ[h]. Triticum, *monococcum*, viii. 1, 9.

ΙΡΙΣ[i]. Iris, *Florentina?* iv. 6. vi. 7. vii. 12. ix. 7.

ΚΑΛΑΜΟΣ. Arundo, i. 8, 10, 16. iv. 9, 12. vi. 2. ix. 5.

κ. αυλητικος.
κ. βομβυκιας[k].
κ. επιγειος.
κ. δοναξ.
κ. πλοκιμος[l],

---

[a] Diosc. Φιλλυρια, unde nomen Latinum; vid. iconem nitidiss. Flor. Græc. t. 2.

[b] Inter Veronicas L. extat gen. V. Chamædrys dict. inter Φαρμακωδεις recensetur. (vid. Didynam.) apud Linn. Teucrii gen. *Chamædrys* vocatur.

[c] Nomen graminis generale αγρο-εστις, (campi vestis,) sed l. iv. 11. spec. paludosa Ægypti describitur.

[d] Αιγιλωψ Dioscor. aliud genus. Vid. Fl. Gr. t. 93. Spec. hæc Βρωμος Diosc.

[e] Ex forma spicæ; sed non Alopecurus Linn. In Fl. Græc. sub nomine Phlei, *criniti*, delineatur spec. cujus spica caudam Vulpinam accurate refert.

[f] Bromus Theophr. differt a Bromo L. ut ex descriptione constat. Inter σιτωδεις enumeratur; spica omnium maxime paleacea, viii. 4. ʽΟμοιοπυρος vocatur, viii. 9. (spica simplici, non paniculata, *Bot.*)

[g] Vid. Καλαμος.

[h] Vox Zea occurrit inter syn. Tritici, *Speltæ*, et *Monococci*. Zea monococcos et dicoccos. Bauh. Pin. 21. 22.

[i] Iridis spec. octo in Græcia occurrunt; quarum tres barbatæ; quinque imberbes: prioribus annumeranda Ιρις hæc: posterioribus Σισυριγχιον. Vid. Prodr. Fl. Græc. N. B. In fasc. 1mo. Fl. Græc. Irides barbatæ, I. *Florentina*, et I. *Germanica*: imberbes, I. *tuberosa*, et I. *Sisyrinchium*, accurate delineantur.

[k] In Classi sexta, Bambusa, *arundinacea* L.

[l] Arundo, *Phragmitis*.

κ. τοξικος.

κ. χαρακιας.

ΚΝΕΩΡΟΝ. CNEORUM ? i. 16. vi. 1, 2.

ΚΡΙΘΗ[a]. Hordeum, *vulgare*, i. 9. viii. 1, 2, 3, 4.

κρ. διστιχος.

κρ. τριστιχος.

κρ. τετραστιχος.

κρ. πεντατιχος.

κρ. ἑξαστιχος.

κρ. παραβλαστικος.

κρ. στιοκριθης. de C. Pl. iii.

ΚΡΟΚΟΣ[b]. CROCUS, i. 9. vi. 6, 7. vii. 9, 12. ix. 7.

κρ. ορεινος.

κρ. ἡμερος.

ΚΥΠΕΙΡΟΣ[c]. Cyperus, *longus*, i. 8, [d] 10, 16, iv. 9, 11. ix. 7.

ΛΙΝΟΣΠΑΡΤΟΝ. Lygeum, *spartum*, i. 8.

ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ[e]. Cyperus, *esculentus*, iv. 8.

ΜΕΛΙΝΟΣ[f]. Panicum, *Italicum ?*

ΞΙΡΙΣ. Vid. viii. 1, 3. An Ιρις ? ix. 9.

ΞΙΦΟΣ[g]. } GLADIOLUS, vii. 12.
ΞΙΦΙΟΝ. }

ὉΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. Vid. Σχοινος.

ΟΛΥΡΑ[h]. Hordeum, *Zeocriton ?* viii. 1, 4, 9.

ΠΑΠΥΡΟΣ[i]. Cyperus, *Papyrus*, iv. 9. vi. 12.

ΠΟΑ[k]. POA ? nomen generale.

ΠΟΑ. Spec. palustris, iv. 10. in Ægypto.

ΠΥΡΟΣ. Triticum, *æstivum*, i.

---

[a] Hordei culti apud L. species 4: H. *vulgare*, H. *distichon*, H. *hexastichon*, H. *zeocriton*. Gramina hordeacea 4. N. B. Κριθη παραβλαστικος, forsan Triticum *compositum* L.

[b] Croci L. species duæ: sativus et vernus. Var. officinalis a Theophr. sub nomine κρ. ἡμερου indicari videtur. Inter unguentaria aromatica, ix. 7. occurrit; pistillum sc. Extat icon Croci *aurei*, fasc. i. t. 35. Flor. Græc. An. Κρ. ἡμερος Theophr. (vid. καυλον ανθους,) vii. 9.

[c] Cyperi L. spec. quatuordecim, apud Græcos decem. Prodr. Fl. Græc.

[d] Ex singulari habitu radicis, i. 10. C. *comosus* Flor. Græc. i. t. 44. innui videtur.

[e] Forsan Μαλιναθαλλα ex forma tuberis: a Plinio vocatur Malum Anthalium.

[f] Forsan Milium *paradoxum*, sed inter σιτωδη culta recensetur: nomen ex gustu melleo seminis.

[g] Vid. Fl. Græc. t. 37. N. B. Var. occurrit ibi Gladioli, t. 38. labiis inferioribus litteris A. A. signatis. Vid. Athen. Deipnos. 15.

[h] Spec. σιτωδης ὁμοιοπυρος (spica simplici) apud Homerum ut pabulum equinum occurrit, una cum Κρι (κριθη) λευκῳ. A quibusdam Secale, *Cereale* L.

[i] Aliis Βιβλος.

[k] Vox ποα pro viridi, vel herbacea plantæ parte: quandoque pro gramine in genere.

8, 9, 18. ii. 5. viii. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11.

π. Αλεξανδρειος.
π. Αιγυπτιος.
π. Ασσυριος.
π. Θρακικος.
π. Καγχρυδιας.
π. Λιβυκος.
π. Ποντικος.
π. Σικελικος.

ΣΙΣΥΡΙΓΧΙΟΝ[a]. Iris, *Sisyrinchium*, i. 16. vii. 13.

ΣΙΤΟΣ. Vid. Πυρος.

ΣΧΟΙΝΟΣ. } SCHŒNUS, i. 8.
ΣΧΙΝΟΣ. } iv. 9, 13. ix. 7.

σχ. σχοινος[b].
σχ. ὁλοσχοινος.
σχ. μελαγκρανιον.

ΤΙΦΗ[c]. Triticum, *Spelta*, ii. 5. viii. 1, 3, 9.

ΦΑΣΓΑΝΟΝ. Iris, *Xiphium*, vii. 11, 12.

ΦΛΕΩΣ[d]. SCIRPUS, iv. 9, 12.

Tetrandria.

ΑΠΑΡΙΝΗ. Galium, *verrucosum*, vii. 8, 14. viii. 8[e].

ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ[f]. Plantago, *major*, vii. 10.

ΕΡΥΘΕΔΑΝΟΝ. Rubia, *tinctorum*, vi. 1. vii. 19. ix. 14.

ΘΗΛΥΚΡΑΝΕΙΑ. Cornus, *sanguinea*, i. 13. iii. 4, 6, 11, 12.

ἹΠΠΟΦΕΩΣ[g]. } Dipsacus,
ἹΠΠΟΦΥΟΝ. } *Fullonum?* vi. 3, 4. ix. 14.

ΚΡΑΝΕΙΑ. Cornus, *mas*, i. 9, 13. iii. 4, 6, 7, 12. v. 8[h].

ΚΟΡΟΝΟΠΟΥΣ[i]. Plantago, *Coronopus*, vii. 9.

ΚΥΝΩΨ[k]. Plantago, *Cynops*, vii. 8, 10.

---

[a] Extat icon Fl. Græc. t. 42. radice fupra fobolifera, ut apud Theoph. vii. 13.

[b] Schœnus marifcus ex defcriptione. N. B. Holofchœnus ufurpatur ut triviale nomen, a Linn. Sc. *mucronatus* folum delineatur, Fl. Græc. t. 43. σχ. μελαγκρανιον incert.

[c] Librariorum incuria duo genera confunduntur, Τιφη et Τυφη; quorum pofterior Typha *latifolia* L. Vid. Monœc. N. B. In Abyffinia colitur hodie frumenti gen. "Teff" dict. teftibus Bruceo et D. Valentia: forfan nativa vox antiquorum.

[d] Differt a Φλεω, planta fpinofa: fed forfan textus corruptus.

[e] Flor. Græc. t. 133.

[f] Ab aliis Στελεφουρος, vii. 10. (Spica cylindrica, vid. Lex. στελεφουρος.)

[g] Genus certe fpinofum: an affine Φλεως. vid. Alii legunt Ἱπποφυον. N. B. Dipfacus, *fylveftris*: Διψακος Diofc. Mallem igitur plantam hanc inter incertas numerare.

[h] Flor. Græc. t. 151.

[i] Nomen ex habitu inditum, foliis radiatim fuper terram.

[k] Forf. Plantago, *Pfyllium*. Fl. Græc. t. 149.

ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ [a]. SISYMBRIUM? ii. 5. vi. 6.

ΤΡΙΒΟΛΟΣ [b]. Trapa, *natans*, iv. 11.

Pentandria.

ΑΓΧΟΥΣΑ. Anchusa, *tinctoria*, vii. 9.

ΑΚΤΗ [c]. ΑΚΤΕΟΣ. Sambucus, *nigra*, i. 8, 9, 13. iii. 6, 13, 14. v. 4.

ΑΜΠΕΛΟΣ. Vitis, *vinifera*, i. 8, 9, 16, 19, 21, 22, 23, 24. ii. 3, 4, 7. iii. 7. 11. iv. 6, 7, 14. v. 4. ix. 21.

α. αγρια [d].
α. ἡμερη.
α. Ιδαια.
α. καπνια.
α. λευκομφαλια.
α. μαινομενα. de C. Pl. i.

ΑΝΗΘΟΝ. ΑΝΗΣΟΝ. Anethum, *hortense*, i. 17. vi. 2. vii. 1, 3. ix. 21.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΙΣ. ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. Chenopodium, *Bonus Henricus*, i. 23. vii. 1, 2, 3, 4, 6.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ [e]. Thapsia, *Asclepium*, ix. 12.

ΑΦΑΡΚΗ [f]. Rhamnus, *Alaternus*.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Vid. Χαλβανον.

'ΕΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ [g]. Apium, *graveolens?* vii. 6.

'ΕΛΙΞ [h]. Hedera, *Helix*, iii. 18. vii. 8.

ἑ. ποικιλη.
ἑ. ποωδης.
ἑ. χλωρα.

'ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ. Heliotropium, *Europæum*, vii. 8, 9, 10, 14.

ΘΑΨΙΑ [i]. THAPSIA? ix. 9, 10, 22.

ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ. Viburnum, *Opulus*, iii. 7. iv. 1.

ΘΡΥΑΛΛΙΣ [k]. VERBASCUM?

---

[a] Menthæ species videtur, et idcirco inter Didynamias.

[b] Vox τριβολος, Tribulum terrestrem indicans, occurrit inter Decandrias.

[c] Forsan Samb. *racemosa*.

[d] Haud satis constat ex desc. an spec. diversæ sub nomine A. αγριας et Ιδαιας; folia enim non lobata. N. B. Haud crediderim cum Linn. Vaccinii speciem esse.

[e] Vox Ασκληπιας; ut trivialis Panaces, L. vid. Πανακη: forsan Asc. *vincetoxicum* L. vel potius Thapsia, *Asclepium*, Prodr. Fl. Græc.

[f] Forsan Celastrus Clusii.

[g] Tria occurrunt Σιλινα, quorum duo ex loco natali nominata; Ελειο, Ορειο; N. B. 'Ιπποσελινον, forsan Selinum *palustre* L. et Bauh.

[h] An gen. diversum a Κιττω? Vid. infr.

[i] Seseli, *turpith*. L. et Bauh. 148.

[k] Genus ex orbe novo sub nomine Thryallis apud Linn. parum caute enumeratur.

ΙΑΣΙΩΝΗ[a]. Convolvulus, *sepium?* i. 21.

'ΙΠΠΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. Ferula, *communis*, vi. 1.

'ΙΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ. Smyrnium, *olusatrum*, i. 15. vii. 6. de C. Pl. v.

ΚΑΥΚΑΛΙΣ. CAUCALIS, vii. 7.

ΚΗΛΑΣΤΡΟΣ. CELASTRUS, i. 6, 15. iii. 2, 6. iv. 1. v. 8.

ΚΗΡΙΝΘΟΝ. Cerinthe, *aspera*, vi. 7.

ΚΙΤΤΟΣ[b]. HEDERA, i. 4, 15, 16, 22. ii. 1. iii. 6, 18, 20. v. 4. vi. 1. ix. 19.

κ. λευκη.
κ. μελαινα.
κ. ἑλιξ.
κ. επιγειος.

ΚΟΚΚΥΓΡΙΑ. Rhus, *Cotinus*, iii. 16.

ΚΟΡΙΑΝΝΟΝ. Coriandrum, *sativum*, vii. 1, 3, 4, 6.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ. Cyclamen, *Europæum*, vii. 9. ix. 10.

ΚΥΜΙΝΟΝ. Cuminum, *cyminum*, i. 18. vii. 3, 4. viii. 10.

ΚΩΝΕΙΟΝ. Conium, *maculatum*, i. 8. vi. 2. ix. 1, 8, 15, 18.

ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. (herba) ATHAMANTHA.

λ. καρπιμος.
λ. ακαρπος.

ΛΙΝΟΝ[c]. Linum, *usitatissimum*, viii. 7.

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. Atropa, *Mandragoras*. vi. 2. ix. 10.

ΜΑΡΑΘΡΟΝ[d]. Anethum, *Fæniculum*, i. 18, 19. vi. 1, 2. vii. 3.

ΜΗΝΙΑΝΘΗΣ. Menyanthes, *trifoliata*, iv. 11[e].

ΝΑΡΘΗΚΥΙΑ[f]. } Ferula, *Ferulago?* i. 9. vi. 1, 2.
ΝΑΡΘΗΞ. }

ΟΙΣΟΣ. } Ribes, *Grossularia*, iii. 17.
ΙΣΟΣ. }

ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ[g]. Athamanta, *Oreoselinum*, vii. 6.

ΠΑΛΙΟΥΡΟΣ[h]. Rhamnus, *Spina Christi*, i. 4, 8, 16. iii.

---

[a] Aliis Aquilegia *vulgaris*; sed petalum expresse dicitur μονον ειναι. Vid. Dioscor. item Cat. Alph. p. 28.

[b] Genus Hedera L. spec. duas continet: H. *Helix*, H. *quinque-folia*: var. tamen tres enumerantur: H. *Poetica*, H. *sterilis*, H. *humi repens*. N. B. H. *Helix* Theophrasti, syn. H. *sterilis Bauhini*. H. επιγειος, syn. H. *humi repentis* ejusdem: Hederæ fructu albo apud Theophr. iii. 18. mentio fit sub nomine Κιττου λευκης: de qua inquirendum.

[c] Lin. *sativum* Bauh.

[d] Forsan var. β. Linn. Fæniculum *vulgare*, *Italicum*, Bauh.

[e] Forsan M. *Nymphæoides*: vid. Prodr. Fl. Græc.

[f] Genus ita denominatum ex caule nodoso, fistuloso. Antiqui internodiis caulinis Ferulæ vice phialarum utebantur. Ναρθηξ major; Ναρθηκυια minor.

[g] Vid. supr. notam in 'Ελειοσελινον.

[h] Fors. Rh. *Paliurus* L.

4, 6, 17, iv. 3, 4, 9, 13. vi. 1.

ΠΑΝΑΚΕΑ [a]. } LASERPITI-
ΠΑΝΑΚΕΣ. } UM, ix. 12, 15.

π. Ασκληπιας [b].
π. Ἡρακλεια.
π. Χειρωνειον.

ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΝ [c]. Peucedanum, *officinale*, ix. 15, 22.

ΠΙΤΥΙΝΗ [d]. Creſſa, *erratica?* vii. 8.

ΠΤΕΛΕΑ. Ulmus, *campeſtris*, i. 13, 16. iii. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14. iv. 7. v. 4, 5, 8. ix. 1.

πτ. πτελεα.
πτ. ορειπτελεα [e].

ῬΑΜΝΟΣ [f]. RHAMNUS? iii. 17. v. 10.

ῥ. μελαινα.
ῥ. λευκη.

ῬΟΥΣ [g]. Rhus, *Coriaria*, iii. 18.

ῥ. αῤῥην.
ῥ. θηλυς.

ΣΕΛΙΝΟΝ [h]. SELINUM? i. 9, 15, 16, 19. iv. 9. vii. 1, 5.

ΣΕΣΕΛΙ: Tordylium, *officinale*, ix. 15.

ΣΙΛΦΙΟΝ [i]. Laſerpitium, *latifolium*, i. 11. iii. 3. iv. 3. vi. 2, 3. vii. 3. ix. 1, 2.

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ. Convolvulus, *Scammonia*, iv. 6. ix. 1, 10, 22.

ΣΚΑΝΔΙΞ [k]. Scandix, *Pecten?* vii. 8.

ΣΤΡΥΧΝΟΣ [l]. SOLANUM? vii. 6, 14. ix. 12, 15, 21.

σ. ἡμερος, vel φοινικος.
σ. μελας, vel ὑπνωτικος.
σ. θρυορος, vel μανικος.

---

[a] Prior forſan planta; poſterior gummi. Vid. Obſ. ad fin. tab.

[b] Vid. Ασκληπιας ſupr. N. B. π. Ηρακλεια, Heracleum, *Panaces*. π. Χειρωνειον Laſerpitii ſpec.?

[c] An P. *officinalis* var. β?

[d] Chamæpetys, *incana* forſan Bauhini.

[e] Ulmi, *campeſtris* var. nullæ apud Linn. Attamen recenter Ulmi, *Abelicia* mentio fit Act. Linn. Lond. v. 9. ex ſpecimine in Herbario Linn. a cl. Prof. J. E. Smith, et in Prodromo Fl. Græc.

[f] Rhamni, *cathartici* baccæ nigræ. Ῥαμνος Græcorum hodie Lycium, *Europæum*. Vid. Prodrom. Fl. Græc. 155.

[g] Nullæ var. ap. Linn. An ſpec. duæ?

[h] Vid. ſupr. Ἐλειοσελινον, &c. forſan Selinum, *ſylveſtre* L. Anne Apium, *Petroſelinum* antiquis notum inter λαχανα?

[i] Nulla Silphii mentio ap. Linn. forſan ex deſc. Ferulæ ſpec. F. *nodiflora*, vel F. *Aſſafœtida*.

[k] Semel occurrit ſine deſc.

[l] Στρυχνου tres ſpecies Theophr. tria genera Linn. conſtituunt: 1. στρ. ἡμερος, Solanum, *Melongena*. στρ. ὑπνωτικος, Phyſalis, *ſomnifera*. στρ. μανικος, Atropa, *Belladonna*. Vid. Prodr. Fl. Græc.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΑ[a]. Euonymus, *Europæus*, iii. 6.

ΤΕΥΤΛΙΟΝ. ΤΕΥΤΛΟΝ. } Beta, *vulgaris*, i. 5, 8, 9, 16. vii. 1, 3, 4, 6, 7.

ΧΑΛΒΑΝΗ[b]. Bubon, *Galbanum*, ix. 1.

Hexandria.

ΑΚΟΡΟΣ[c]. Acorus; *Calamus?* i. 22.

ΑΜΑΡΑΚΟΣ. Asphodelus, vi. 7.

ΑΝΕΜΩΝΗ Λειμωνια[d]. Narcissus, *Pseudo-Narcissus*, vi. 7.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΣ. Asphodelus, *luteus*, i. 7. vi. 2.

ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ. ΑΣΦΑΡΑΓΟΣ. } Asparagus, *aphyllus*, i. 16. vi. 1, 3.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ[e]. Asphodelus, *ramosus*, i. 16. vii. 9, 11, 12.

ΒΟΛΒΙΝΗ. Scilla, *unifolia*, vii. 13.

ΒΟΛΒΟΚΩΔΙΟΝ[f]. Bulbocodium, *vernum*, vi. 8.

ΓΗΘΥΟΝ. ΓΗΤΕΙΟΝ. } Allium, i. 4, 5, 16. vi. 1, 3.

ΚΡΙΝΟΝ[g]. Lilium, *album*, vi. 6, 8.

ΚΡΟΜΜΥΟΝ. Allium, *Cepa*, i. 8, 10; 16. vii. 2, 3, 4, 5, 8.

κρ. Ασκαλονικον[h].
κρ. Κνιδιον.
κρ. Σαμοθρακικον.
κρ. Σαρδιον.
κρ. Σηταvειον.
κρ. Σχιστον.

ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ. Allium, iv. 7.

ΛΑΠΑΘΟΣ. Rumex, *acetosa*, i. 8, 9. vii. 1, 2, 3, 4, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝ. vid. Ναρκισσος, vi. 6, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝ[i] ἑτερον, vi. 6.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ. Leucoium, *vernum*, vii. 9, 13.

ΜΩΛΥ. Allium, *Moly*, ix. 15.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. Narcissus? vi. 6, 7. vii. 12.

ΟΙΝΑΝΘΗ. Convallaria, vi. 7.

ΟΡΥΖΟΝ. Oryza, *sativa*, iv. 5.

---

[a] Ex forma fructus quadrangulari.

[b] Gummi χαλβανον vel γαλβανον.

[c] Ex situ cum Cnico, suspicor genus hoc Carduis affine esse, sed ita a Linn. acceptum.

[d] Ανεμωνη, simpliciter, Anemonem L. indicat; vid. Polyandr.

[e] Ασφοδιλος et Ανθερικον proxime stant in Syst. Linn.

[f] Forsan Narcissus *minor* L. vel *bulbocodium*. Datur etiam Ixiæ spec. *bulbocodium* dict. L. Flor. Græc. t. 56. N. B. Omnes (ex voce κωδια) bulbis lanosis, vel gossypinis extus.

[g] Genus Crinum L. antiquis ignotum.

[h] Ang. "Shallott," sono Græcæ vocis retento. N. B. Haud satis liquet respectu κρ. γητειου, et κρ. σχιστου, an All. *ampeloprasum*, et *schænoprasum*.

[i] Forsan Narcissus, *Poeticus*, vel *Pseudo-Narcissus* L.

ΠΡΑΣΟΝ. Allium, *Porrum*, vii. 4, 8.

ΣΚΙΛΛΑ. ΣΚΥΛΛΑ. { Scilla, i. 7, 10, 16. vii. 9, 12.

σκ. Diofc. Scilla, *maritima*.

σκ. Επιμενιδεια, Scilla, *Italica*.

ΣΚΟΡΟΔΟΝ[a]. Allium, *Scorodoprasum*, vii. 4, 8.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ[b]. Hyacinthus, *comosus ?*

Heptandria.

Mirum videbitur nullam Æsculi *Hippocastani* L. apud Theophraftum mentionem incidiffe: Clufius refert Conftantinopoli Viennam delatam.

Octandria.

ΕΡΕΙΚΗ[c]. Erica, i. 23.

ΚΝΕΩΡΟΝ[d]. Daphne, *Cneorum ?* i. 16. vi. 1, 2.

κν. λευκει.

κν. μελαν.

ΜΕΛΙΑΣ[e], Σιτος. Polygonum, *Fagopyrum*, vii. 14.

Enneandria.

ΔΑΦΝΗ. Laurus, *nobilis*, i. 8, 9, 13, 5, 19, 24.1 iii. 4, 6, 8. iv. 6, 8, 20. v. 3, 4, 8, 10.

ΔΑΦΝΗ[f] αγρια, iv. 8.

ΚΑΣΙΑ. Laurus, *gracilis*[g], ix. 4, 5.

ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΣ[h]. Laurus, *Cassia*, ix. 7.

ΘΗΣΕΙΟΝ[i]. Rheum, *Rhaponticum*, vii. 11.

Decandria.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ. Arbutus, *Andrachne*, i. 8, 15. iii. 4, 6. 7, 16. v. 8.

α. αγρια.

α. ἡμερα.

ΒΑΛΑΝΟΣ. ἡ. Guilandina, *Bonduc*, i. 17. iv. 2.

ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ[k]. Dianthus *Caryophyllus ?* vi. 1, 6, 7

---

[a] Forfan A. Scorodopraf. var. β.

[b] Spec. Hyacinthi apud L. 13; quarum 10 Bauhino notæ. Forfan Hyacinthus Theophrafti? H. *Poeticus* L. apud nos frequentiffima. N. B. Omnium pulcherrima fpecies in hortis noftris H. *orientalis*, antiquis ignota.

[c] Semel occurrit ut frutex apice florifero: nomen ufurpatur a Bauhino, Clufio, et Linn.

[d] Incertum an Daphne: forfan Cneorum L. Chamælea Bauh. Vid. Triandr.

[e] Ex colore grani: forfan P. *Convolvulus*; Convolv. niger Dodon.

[f] L. *nobilis* nulla datur var. Spec. hæc Viburnum, *Tinus* Bauh. rectius Viburnum *Lantana*; vid. Prodr. Fl. Græc.

[g] Laurus, *Cinnamomum* antiquis ignota.

[h] Cortex, vel oleum folum inter unguentaria.

[i] Mallem fane Rheum, *palmatum* Thefei nomine infigniri, fed locus natalis prohibere videtur.

[k] Aliis Agroftemma *Flos Jovis* L. vel *coronaria* L.

ΚΕΡΚΙΣ. Cercis, *siliquastrum*, iii. 14.

ΚΟΜΑΡΟΣ. Arbutus, *Unedo*, i. 8, 15. iii. 16. v. 10.

ΛΥΧΝΙΣ [a]. LYCHNIS.

ΠΗΓΑΝΟΝ. Ruta, *graveolens*, i. 4, 15. vii. 2, 4, 5, 9.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΝ. Gypsophila, *Struthium*.

ΤΡΙΒΟΛΟΣ [b]. Tribulus, *terrestris*.

Dodecandria.

ΑΕΙΖΩΟΝ. Sempervivum, *arboreum*, i. 16. vii. 14.

ΣΥΚΗ ΙΝΔΙΚΗ [c]. RHIZOPHORA, i. 12. iv. 4.

ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΝ [d]. EUPHORBIA, ix. 8, 12, 15.

τ. παραλιος.

τ. αρρην.

τ. μυρτιτις.

Icosandria.

ΑΜΥΓΔΑΛΗ. ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ. Amygdalus, *communis*, i. 18, 19, 21, 23. ii. 3. vii. 12. ix. 12.

ΑΠΙΟΣ. Pyrus, *communis*, 1, 4, 16, 19, 21, 23, 24. ii. 3, 7. iv. 6, 14, 16.

ΑΡΙΑ. Cratægus, *Aria*, iii. 6, 16. v. 1, 4, 5, 6, 10.

ΑΧΡΑΣ [e]. Pyrus, sylvestri statu, i. 7, 24. ii. 3. iii. 4, 6, 7. iv. 14.

ΒΑΤΟΣ ἡ. RUBUS, i. 2, 8, 15, 16. iii. 18.

β. ορθοφυης. R. *fruticosus*.

β. χαμαιβατος. R. *Chamæmorus*.

β. κυνοσβατος. R. *Idæus*.

ΚΑΚΤΟΣ. Cactus, *Opuntia*, vi. 4.

ΚΕΡΑΣΟΣ. Prunus, *Cerasus*, iii. 13. ix. 1.

1. ΚΟΚΚΥΜΕΛΙΑ [f]. Prunus, *Laurocerasus?* i. 18, 19, 21, 22. iii. 7. iv. 3.

2. Κ. ΣΠΟΔΙΑ, iii. 7. *incert.*

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. Cratægus, *torminalis*, iii. 15.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ. Rubus, *Idæus*, iii. 18. Vid. Βατος.

ΛΑΚΑΘΗ. Prunus, *Mahaleb*, iii. 4.

ΜΕΣΠΙΛΗ. MESPILUS, iii. 1 ...

---

[a] Ex medulla in caule lucernis apta?

[b] Duo sub nomine τριβολος occurrunt genera. Vid. Tetrand.

[c] Incertum an Rh. *conjugata*, vel *gymnorhiza* L.

[d] Plurima dantur genera apud antiquos sub nominibus Tithymalus, Esula, Apios, Peplus. Vid. Ger. em. 498. Sp. 1ma Euph. *Paralias*: 2da Euph. *Amygdaloides* Dioscor. 3tia Euph. *Myrsinitis*.

[e] P. Pyraster L. P. sylvestris Bauhin. Οχνη.

[f] Incertum ex desc. nulla tamen vocis Κοκκυμηλιας apud Bauh. vel Clusium mentio. N. B. Prunus, *Laurocerasus* L. Anglice "Laurel" vocatur; Laurus autem nobilis L. "Sweet Bay." Κ. σποδια spec. sylvestris, ignota.

μ. ανθηδων. Cratægus Azarota.
μ. σατανειος. M. Germanica.
μ. ανθηδωνοιδης. Crat. Oxyacantha.

ΜΗΛΕΑ[a]. Pyrus, *malus*, i. 4, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24. ii. 1, 3, 7. iii. 4, 6. iv. 16, 19.
μ. οψια.
μ. ιαρινη.

ΜΥΡΡΙΝΗ. / ΜΥΡΡΙΝΟΣ. } Myrtus, *communis*, i. 4, 15, 16, 22, 23, 24. iii. 4, 6, 7.

ΜΥΡΤΟΣ. id. i. 9.

ΟΞΥΑΚΑΝΘΑ. Cratægus, *Pyracantha*, i. 15. iii. 4, 6. vi. 7.

ΟΥΗ. / ΟΗ. } Sorbus, *domeſtica*, ii. 3. iii. 3, 7, 12.

ΠΑΔΟΣ. Prunus, *Padus*, iv. 1.

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. / ΠΕΝΤΑΠΕΤΗΣ. } Tormentilla, ix. 4.

ΠΡΟΥΜΝΗ. Prunus, ix. 1.

'ΡΟΔΟΝ[b]. / 'ΡΟΔΩΝΙΑ. } Rosa, i. 15, 22. vi. 1, 6, 7.
ρ. πενταφυλλ. vel *κυνοροδον.* R. *Canina.*
ρ. δικαφυλλ. incert.
ρ. εικοσιφυλλ. R. *Cinnamomea.*
ρ. ἑκατονταφυλλ. R. *Centifolia.*

'ΡΟΙΑ. / 'ΡΟΑ. } Punica, *granata*, i. 4, 8, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24. iii. 7. iv. 6, 14. vi. 1

ΣΤΡΟΥΘΙΟΝ. Pyrus, *Cydonia*, ii 3[c].

ΣΠΟΔΙΑ. vi. 3. Vid. Κοκκυμηλια.

ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατος.

Polyandria.

ΑΚΟΝΙΤΟΝ. Aconitum, *Lycoctonum*, ix. 16, 17.

ΑΝΕΜΩΝΗ[d]. Anemone, vi. 7. vii. 8.

ΑΤΡΑΓΕΝΗ[e]. Clematis, *Orientalis?*

ΓΛΥΚΥΣΙΔΗ. Vid. Παιωνια, ix. 9.

'ΕΛΕΒΟΡΟΣ. Helleborus, iv. 6. vi. 2. ix. 9, 11, 15.
ἑ. μελας[f].
ἑ. λευκος.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ. Capparis, *ſpinoſa*, i. 6. iii. 3, 5, 1. vii. 8.

---

[a] Pyrus, *malus* ſtatu ſylveſtri non notatur (Ang. " Crab-tree.")

[b] Roſa, *canina* L. Κυνοροδον Theophr. N. B. Vox 'Ροδωνια fere ſemper *roſetum* indicat, ut et Ιωνια violetum; ſed quandoque, ut ſuſpicor, plantam ipſam.

[c] Στρουθιου genera duo, quorum alterum Gypſophila, *Struthium*, L. Vid. Decandria.

[d] Vid. Ανεμωνη Λειμωνια Hexandr. ſed ſecundum alios Ανεμωνη ſimpliciter, A. *hortenſis*. A. λειμωνια, A. *pratenſis* vel *nemoroſa*.

[e] Genus Atragene Linn. apud Bauhin. vocatur Clematis. N. B. Planta hæc forſ. Clematis, *Vitalba* L.

[f] Icones nitidiſſimæ plantarum Corollarii Tournefortiani, ab ipſo depictæ in Annalibus Muſei Hiſt. Nat. Pariſiis nuperrime prodiere. Inter has H. *niger*, *Orientalis*, vel H. *niger* Theophraſti accurate delineatur, " foliis Pla-

ΚΙΣΤΟΣ[a]. Cistus, vi. 2.
ΛΩΤΟΣ[b]. Nymphæa, *Lotus*, iv. 10.
ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ[c]. Melittis, *Melissophillum*.
ΜΗΚΩΝ. Papaver, *Orientale*, i. 15, 18, 19.
ΝΥΜΦΑΙΑ[d]. Nymphæa, *Nelumbo*, ix. 13.
ΦΙΛΥΡΑ[e]. Tilia, *Europæa*, i. 16, 20. iii. 4, 6, 7, 9, 10. v. 1, 4, 6, 8.
ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ. Chelidonium, *majus*, vii. 14.

Didynamia.

ΑΓΝΟΣ. Vitex, *agnus castus*, i. 4, 21, 22, 23.
ʽΑΙΜΑΔΩΡΟΝ[f]. Orobanche? viii. 8.
ΑΜΑΡΑΚΟΣ. Origanum, *Ægyptiacum*.
ΓΛΗΧΩΝ. } ΒΛΗΚΩΝ. } Mentha, *Pulegium*, vii. 5.
ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. Origanum, *Dictamnus*, ix. 16.
ʽΕΡΠΥΛΛΟΝ. Thymus, *serpyllum*, i. 15. vi. 1, 6, 7.
ΕΥΖΩΜΟΝ[g]. Satureia, *hortensis*, i. 9. vii. 1, 3, 6.
ΘΥΜΒΡΑ[h]. } ΘΥΜΒΡΟΝ. } Thymbra, vi. 1, 2. vii. 1, 6.
ΘΥΜΟΝ. Thymus, *vulgaris*, i. 19. vi. 1, 2. viii. 1, 6.
ΙΦΥΟΝ. } ΙΦΥΣΟΝ. } Lavandula, *spica*? vi. 7.
ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝ[i]. Euphrasia, *odontitis*? ix. 19.
ΜΕΛΑΜΠΥΡΟΣ. Melampyrum, *arvense*, viii. 8.
ΜΙΝΘΑ[k]. Mentha, vi. 7.
ΟΚΙΜΟΝ. } ΟΚΥΜΟΝ. } Ocymum, *Basilicum*, i. 9, 16. vii. 1, 2, 3, 6.
ΟΡΙΓΑΝΟΣ. Origanum, *majorana*, i. 19. vi. 1.
ἱ. λευκη.
ἱ. μελαινα.

tani, sed divisuris pluribus," Turcis hod. "Zopteme." Operæ pretium erit descriptionem cel. Desfontaines perlegere, Ann. Mus. A. vi. fasc. 4. p. 278.

[a] In ed. Bas. legitur *Κιττος*.

[b] Tres *Λωτοι*. Vid. Diadelph. et Polygam.

[c] Rectius forsan Melissa, *officinalis* Didyn.

[d] Nymphæa *Lotus* et N. *Nelumbo* spec. ejusdem generis. Nescio an recte nominantur; ambo crescunt in Lacu Orchomeni, et in Nilo fluvio.

[e] Vox *Φιλλυρα* Phillyream indicat, duplici λ. Vid. Diandr.

[f] Parasitica pl. radici vel cauli adnascens. N. B. Vox Orobanche minus proprie a Linn. usurpatur. Vid. Pl. Class. incert.

[g] Eruca quorundam. Ex suavitate et usu in jure condiendo nomen Græcum. Angl. "Winter Savoury," quod id. significat ac vox Gr.

[h] An Hyssopus, *officinalis* L. vel Satureia, *Thymbra*.

[i] Nulla *Κραταιογονου* apud Linn. mentio inter synonyma. Fors. Melampyrum, *album* Ger. em.

[k] Menthæ 14 spec. Linn. Sp. Pl. 204.

ΠΡΑΣΙΟΝ. Marrubium, *album*, vi. 1, 2.

ΣΗΣΑΜΟΝ [a]. Sesamum, *Orientale*, i. 18. viii. 1, 3, 4, 7

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ [b]. Teucrium, *Chamædrys?* ix. 10.

ΨΕΥΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. Origanum, *Ægyptiacum*, ix. 16.

Tetradynamia.

ΓΟΓΓΥΛΙΣ. Brassica, *Rapa*, i. 9, 10. vi. 7. vii. 1, 2, 3, 4, 5, 9.

γ. ἡμερα.
γ. αγρια. vii. 6.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ [c]. Erysimum, *officinale*, viii. 3, 7.

ʽΕΣΠΕΡΙΣ. Hesperis, *matronalis*. de C. Pl. vi.

ΚΑΡΔΑΜΟΝ. Sisymbrium, *Nasturtium*, i. 19. vii. 1, 4

ΝΑΠΥ. Sinapi, *nigrum*, i. 19. vii. 1, 4.

ʽΡΑΦΑΝΙΣ. Raphanus, *sativus*, i. 4, 9, 10. vii. 2, 3, 4.

ῥ. Κορινθια. ῥ. Λειοθαλασσια.
ῥ. Κλεωνια. ῥ. Βοιωτικα.

ʽΡΑΦΑΝΟΣ. Brassica, *oleracea*, i. 9, 15, 16, 23. iv. 20. vii. 1, 4.

ῥ. ουλοφυλλος, "curled Savoy."
ῥ. λειοφυλλος, "smooth Cabbage."
ῥ. αγρια, B. *arvensis*.

Monadelphia.

ΑΛΘΑΙΑ. Lavatera, *arborea*, ix. 15. 19.

ΕΡΙΟΦΟΡΑ. Gossypium, *arboreum*, iv. 9.

ΜΑΛΑΧΗ [d]. Althæa, *officinalis*.

Diadelphia.

ΑΡΑΚΟΣ [e]. Vicia, *cracca?* viii. 8.

ΑΡΑΧΙΔΝΑ [f]. Lathyrus, *amphicarpus*, i. 1. 11.

ΑΦΑΚΗ. Lathyrus, *Aphaca?* i. 5, 6, 10.

ΔΟΛΙΧΟΣ. Phaseolus, *vulgaris*, viii. 3, 10.

ΕΒΕΝΟΣ [g]. Ebenus, *Cretica*, i. 8, 9. iv. 5. v. 4, 5. ix. 22.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ [h]. Ervum, *Lens*, viii. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

ΘΕΡΜΟΣ [i]. LUPINUS, i. 6, 12. iii. 3. viii. 1, 2, 7, 10.

---

[a] Sesamum inter Σιτωδη Αιωνυμα; semina forsan ad usus culinarios.

[b] Veronicæ species sub nomine triviali *Chamædrys*. Vid. Diandr.

[c] Inter plantas Αρουραιας cum Sesamo. Forsan E. *barbarea*.

[d] Affinitas satis arcta inter Αλθαιαν et Μαλαχην. Posterior forsan nominanda Μαλακη ex mollitie foliorum.

[e] Ex sono vocis forsan Linn. nomen triviale inditum. Var. Αρακου ὁμοιος dict.

[f] Error videtur textûs; forsan scribendum Αραχιδνα ab Αρακα, quia habitu affines ambo: occurrit Αρακου ομοιος cum Arachidna, i. 11.

[g] Quare Ebenus *Cretica* L.? antiquis spec. certe nota. Vid. desc.

[h] Inter culta Αρουραια.

[i] Lupinorum apud antiquos mentio frequens in cibis: forsan L. *sativus* flore albo Bauh.

ΚΕΡΑΣΒΟΛΟΝ. Vid. Ερεβινθος.

ΚΟΛΟΥΤΕΑ[a]. COLUTEA, i. 18. iii. 14, 17.

κ. Ιδαια.

κ. περι Λιπαραν.

κ. φρυγανωδης.

ΚΛΥΜΕΝΟΝ[b]. Lathyrus, *Clymenum* ix. 9.

ΚΡΙΟΙ ΟΡΟΒΙΑΙΟΙ[c]. Cicer, *Arietinum*, viii. 5.

ΚΥΑΜΟΣ[d]. Vicia, *Faba*, viii. 1, 2, 3, 5, 10.

ΚΥΤΙΣΟΣ. CYTISUS, i. 9. v. 4.

κ. δενδρωδης. Cyt. *Laburnum*.

κ. φρυγανωδης. Medicago, *arborea*.

ΛΑΘΥΡΟΣ. Lathyrus, *ſativus*, viii. 3, 10.

ΛΩΤΟΣ[e]. Lotus, *Melilotus*, vii. 1, 9, 14.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ. Trifolium, *officinale*. de C. Pl. l. vi.

ΜΗΔΙΚΗ. Medica, *ſativa*, viii. 8.

ΟΝΩΝΙΣ. Ononis, *Antiquorum ?* vi. 1, 4, 5.

ΟΡΟΒΟΣ[f]. OROBUS. vii. 6. viii. 1, 5, 10.

ΠΕΛΕΚΙΝΟΣ. Coronilla, *ſecuridaca*, viii. 8.

ΠΙΣΟΣ. Piſum, *ſativum*, viii. 1, 2, 3, 5, 10.

ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΑ. Aſtragalus, *Tragacantha*, ix. 1, 8, 15.

ΦΑΚΟΣ[g]. ERVUM ? iv. 5. viii. 1, 3, 5.

ΩΧΡΟΣ. Piſum, *Ochrus*, viii. 3, 10.

Polyadelphia.

ΜΗΛΕΑ ΜΗΔΙΚΑ. Citrus, *Medica*, i. 22.

ΜΗΛΕΑ ΠΕΡΣΙΚΑ. Citrus, *Aurantium*, iv. 4[h].

Syngeneſia.

ΑΒΡΟΤΑΝΟΝ. Santolina, *Roſmarinifolia ?* i. 15. vi. 1, 7.

1. ΑΚΑΝΘΑ[i]. ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ. Atractylis, *gummifera ?* iv. 5, vi. 3, 4. ix. 1.

---

[a] Forſan C. arboreſcens deſc. ὡς δενδρον μεγα, iii. 14. Nomen ex κολουω de actione folia colligendi, et præparandi ad uſus pecorum ſaginandorum.

[b] Κλυμενον Theophr. medicinale valde, et forſan diverſum. Κλυμενον Dioſc. Calendula, *officinalis*, ſecundum alios Lathyrus, *Clymenum* L. De viribus inquirendum.

[c] Ex forma ſeminis caput arietis referente ?

[d] Κυαμος alter occurrit in Claſſ. Gynandr. Arum, *Colocaſia* L.

[e] Tres Loti. Vid. Claſſ. Polyandr. et Polygam.

[f] Enumeratur cum Ερεβινθῳ; ſpec. culta forſan antiquitus; an Ervum, *Ervilia ?*

[g] Affinis Ερεβινθου, forſan E. *hirſutum*. N. B. Spec. Indica memoratur, iv. 5.

[h] Dicitur inedulis eſſe, ſed fragrans. Var. quædam ignota.

[i] Spec. Indica, Cardui affinis, gummifera.

2. ΑΚΑΝΘΑ ΑΦΤΛΛΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.

3. ΑΚΑΝΘΑ, ΔΙΨΑΣ[a]. Spec. ignota, iv. 8.

4. ΑΚΑΝΘΑ ΙΝΔΙΚΗ. Vid. Ακανθα n. i.

5. ΑΚΑΝΘΑ ΚΕΑΝΩΘΟΣ. Serratula, *arvensis*, iv. 5, 11.

6. ΑΚΑΝΘΑ ΤΡΙΟΖΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.

7. ΑΚΑΝΘΑ ʽΗΡΑΚΛΕΙΑ. Spec. ignota, iv. 5.

8. ΑΚΑΝΘΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ. vi. 3.

ΑΚΑΡΝΑ. ΑΚΟΡΝΑ. } Carduus, *Acarna*, i. 16. vi. 3, 4.

ΑΝΔΡΤΑΛΙΑ[b]. Andryala, *integrifolia?* vii. 7.

ΑΝΘΕΜΙΟΝ[c]. ΑΝΘΕΜΟΣ. } ANTHEMIS? i. 22. vii. 9, 12, 13.

ΑΤΡΑΚΤΤΛΙΣ. Vid. Ακανθα 1.

ΑΦΑΚΗ[d]. Leontodon, *Taraxicum*.

ΑΦΙΑ. Caltha, *palustris*, vii. 8.

ΑΨΙΝΘΙΟΝ. Artemisia, *Absinthium*, i. 19. iv. 6. vii. 9.

ΕΛΕΙΟΧΡΤΣΟΣ. Caltha, *palustris?* vi. 7. ix. 21.

ΗΡΙΓΕΡΩΝ. Erigeron, *graveolens*, vii. 7, 8.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ. ΘΡΙΔΑΞ. } Lactuca, *sativa*, i. 16, 19. vii. 2, 3, 4, 5, 6. ix. 8.

ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ *αγρια*. Lactuca, *sylvestris*.

ΙΞΙΝΗ[e]. CARDUUS, vi. 3, 4. ix. 1.

ΙΟΝ. ΙΩΝΙΑ[f]. } Viola, *odorata*, i. 15. vi. 1, 6, 7. viii. 6.

ι. λευκη.

ι. μελαινα[g].

ΚΕΝΤΑΤΡΕΑ. ΚΕΝΤΑΤΡΙΟΝ. } Centaurea, *Centaurium*, i. 19. iv. 6. vii. 9. ix. 1.

ΚΙΧΩΡΙΟΝ. Cichorium, *Intybus*, i. 16. vii. 7, 8, 9, 11.

---

[a] In Lybiæ arenosis, aridissimis; herba prorsus deficiente. N. B. Spec. octo Ακανθ.. huc referuntur, etsi forsan nonnullæ nihil habeant affinitatis cum Carduis, 1, ʽnis exceptis. A peregrinantibus sedulo investigandæ sunt hæ species.—Ακανθ. Nov. Test. perperam interpretatur "thorn."

[b] Nulla Andryaliæ mentio inter synonyma Linn. Fors. Sonchus, *asper* Linn.

[c] Forsan Matricariæ, vel Cotulæ, spec.

[d] Datur Lathyri species Αφακη dict. vid. Diadelph. aliis Απαπη dict.

[e] Spec. Gummi mastiche ferens. N. B. Ixine Fabii Columnæ. 1.

[f] Vid. not in ʽΡοδωνια Cl. Icosandr.

[g] Purpureo-nigra, "the dark blue double violet," Ang.

ΚΝΙΚΟΣ. } Cnicus? i. 22. vi.
ΚΝΗΚΟΣ. } 3, 4.

ΚΟΜΗ ἡ. Tragopogon, *Orientale?* vii. 7 [a].

ΚΟΝΥΖΑ [b], Conyza? vi. 1, 2.

ΚΟΡΚΟΡΟΣ. Hieracium, *murorum*.

ΛΕΥΚΑΚΑΝΘΑ [c]. Onopordum, *Acanthium*, vi. 3.

ΜΕΛΑΝΙΟΝ. Vid. Ιον, vi, 6, 7.

ΠΙΚΡΙΣ [d]. Picris? vii. 9, 11.

ΣΚΟΛΥΜΟΣ [e]. Scolymus, *Hispanicus*, vi. 3, 4. vii. 10, 14.

ΣΟΓΧΟΣ. Sonchus, *oleraceus*, vi. 4, 3.

ΣΤΟΙΒΗ [f]. Centaurea, *Stœbe*, i. 16. vi. 1.

ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ. Vid. Κομη supra, vii. 7.

'ΥΠΟΧΟΙΡΙΣ [g]. Hypochœris? vii. 7, 11.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ. Carlina? vi. 3. ix. 13.

χ. λευκος. C. *acaulis*.

χ. μελας. Carthamus, *corymbosus*.

ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ [h]. Chondrilla *juncea*, vii. 11.

Gynandria.

ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ. Aristolochia, ix. 13, 15, 22.

ΑΡΟΝ. Arum, *Dracunculus*, i. 9, 10. vii. 9, 12.

ΒΟΥΚΕΡΑΣ. Ophrys, *nidus avis?* viii. 8.

ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ. Arum, *maculatum*, ix. 22.

'ΕΛΛΕΒΟΡΙΝΗ [i]. Serapias, *Helleborine*, ix. 11.

ΚΥΑΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑ [k]. Arum, *Colocasia*, iv. 9. vii. 3.

ΟΡΧΙΣ [l]. Orchis.

---

[a] Κατ' ἐξοχην ita dict. N. B. Ex voce κομη, rectius forsan Geropogon, *glaber*. Vid. infra, Τραγοπωγων.

[b] Conyzæ Linn. spec. 19. valde affines Erigerontis: in loco natali investigandæ.

[c] Spina alba Bauhini.

[d] Ita dict. ab amaritudine; nescio an Picris Linn.

[e] Radix edulis. N. B. Cynara, *Scolymus* Linn. Angl. "the Artichoke." Theophr. ignota, ut videtur.

[f] Genus Stœbe non occurrit apud Linn. sed Bauhinum et Clusium sequor.

[g] Bis occurrit inter Cichoracea.

[h] Plures Chondrillæ inter pl. affines: Sonchus, Prenanthes, Leontodon, Hieracium, Lapsana, Erigeron, Centaurea. Videant Peregrinatores.

[i] Forsan Satyrium.

[k] Κυαμος simpliciter Vicia, *faba*. Vid. Diadelph.

[l] Inter 32 species Orchidis difficillimum foret seligere; maxime communis, Orchis, *morio* L.

Monœcia.

ΑΙΓΙΛΩΨ[a]. Quercus, *Ægilops*, iii. 9.

ΒΛΙΤΟΝ. Amaranthus, *Blitum*, i. 23. vii. 1, 2, 3, 4.

ΒΟΥΤΟΜΟΣ[b]. SPARGANIUM? i. 8, 16. iv. 9, 11.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Vid. Ζυγια, iii. 4.

ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. Fagus, *Castanea*, iii. 3, 4, 6, 7. iv. 6.

ΔΡΥΣ[c]. QUERCUS, i. 8, 9, 13. 16. iii. 4, 6, 7, 9. iv. 6. v. 5, 6, 10.

1. δ. ἡμερις. q. *Robur.*
2. δ. αιγιλωψ. (supr.) q. *Ægilops.*
3. δ. πλατυφυλλος.
4. δ. φηγος. q. *Esculus.*
5. δ. ἁλιφλοιος.
6. δ. φελλος. q. *Suber.*
7. δ. ευμοδρυς.
8. δ. ασπρις. q. *Cerris?*

ΕΛΑΤΗ[d]. PINUS, i. 6, 8, 9, 13, 15, 16. iii. 8, 10. iv. 1, 6, 7, 19. v. 1, 2, 4, 7, 8. vi. 2. ix.

ε. αρρην. P. *Abies.*
ε. θηλεια. P. *Picea.*

ΖΥΓΙΑ. Carpinus, *Betulus*, iii. 4, 6, 7. v. 1, 4.

ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ, καρυα. CORYLUS, i. 4, 16, 17, 19. iii. 3, 4, 6, 7, 8.

η. ἡμερος. C. *Colurna.*
η. αγρια. C. *Avellana.*

ΘΥΙΑ. Thuja, *aphylla*, i. 15. iii. 6. iv. 1.

ΚΑΡΥΑ[e] Ευβοϊκη. ⎫
ΚΑΡΥΑ Περσικη. ⎬ Juglans, *Regia*, iii. 6, 7. iv. 6. v. 5. 8, 10.
ΚΑΡΥΑ Βασιλικη. ⎭

ΚΛΗΘΡΑ. Betula, *Alnus*, i. 7. iii. 4, 5, 6, 7, 14. iv. 9.

ΚΟΙΞ. Coix, *Lachryma Jobi*, i. 16.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ. Cucumis, *Colocynthis*, i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 6.

ΚΡΟΤΩΝ. Ricinus, *Palma Christi*, i. 16.

ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ. Cupressus, *sempervirens*, i. 8, 9, 13, 14, 15, 16. iii. 3. iv. 3, 6. v. 5.

ΛΕΜΝΑ. Lemna, *trisculca*, iv. 11.

---

[a] Ægilops graminis spec. v. Polygamia.

[b] Spec. affinis Cyperi: non Butomus L.

[c] Quercus spec. apud Linn. Sp. Pl. enumerantur 14; inter quas Q. Phellus. N. B. Vox Phellus minus proprie generi novi orbis attribuitur a Linneo. δρ. ἁλιφλοιος forsan αλλοφλοιος, (cortice duplici,) syn. Q. *Suberis.* ευμοδρυς forsan. Q. *Robur.* N. B. An Q. *Ilex* L.?

[d] Genus Pinus L. dividitur in species foliis simplicibus Ελατη; et species foliis basi unitis σπαθοφυλλοις, ut Πευκη, Πιτυς. vid.

[e] Καρυον neutr. gen. Nux. Vid. not. ad finem Cat. Alph.

ΟΞΥΑ[a]. Fagus, *fylvatica*, i. 16. iii. 6, 7. v. 5, 8. vii. 13.

ΟΣΤΡΥΑ. } Carpinus, *Betulus*,
ΟΣΤΡΥΙΣ. } i. 13. iii. 4, 7, 10.

ΟΣΠΡΙΣ. Vid. Δρυς.

ΠΕΥΚΗ[b]. Pinus, *Pinea*, i. 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19. ii. 2, 3. iii. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. iv. 1, 6, 19. v. 1, 2, 7, 8, 9. ix. 1, 2.

π. παραλιας. P. *Pinafter*.

π. Ιδαια. qu.

1. ΠΙΤΥΣ. Pinus, *fylveftris*, i. 9, 15, 16, 19. ii. 2, 3. iii. 1, 4, 6, 8, 10. iv. 1, 6, 19. v. 1, 2, 7, 8, 9. ix. 1, 2.

2. ΠΙΤΥΣ Κωνοφορος. iii. 10.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ. Platanus, *Orientalis*, i. 7, 13, 16. iii. 1, 6, 7. iv. 7, 9, 14, 18. v. 4, 8.

ΠΡΙΝΟΣ[c]. Quercus, *Prinus*, i. 9, 15, 16. iii. 4, 5, 6, 7, 8, 15. v. 7, 8. ix. 4.

ΠΥΞΟΣ. Buxus, *fempervirens*, i. 8, 9, 13, 15. iii. 4, 7, 15. v. 4, 5, 7, 8.

ΣΗΜΥΔΑ. Betula, *alba*, iii. 14.

ΣΙΚΥΑ. Cucurbita. de C. Pl. v.

ΣΙΚΥΟΣ[d]. Cucumis, *fativus*, i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. ix. 10, 15.

ΣΙΚΥΟΣ αγριος. Momordica, vii. 10.

ΣΜΙΛΑΞ. Quercus fpec. ita ab Arcadibus vocata, iv. 7.

ΣΤΥΡΑΞ. Liquidambar, *ftyraciflua*, ix. 7.

ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ[e]. Morus, *nigra*, i. 19, 21, 22. v. 4, 5, 7, 8.

ΤΥΦΗ[f]. Typha, *latifolia*, i. 8. iv. 11.

ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ. } Vid. Δρυς.
ΦΕΛΛΟΣ. }

ΦΗΓΟΣ. Vid. Δρυς.

Diœcia.

ΑΙΓΕΙΡΟΣ. Populus, *nigra*, i. 8. ii. 3, 4, 5, 6, 7, 14. iv. 14.

ΑΡΚΕΥΘΟΣ. Juniperus, *communis*, i. 15. iii. 4, 6, 7. iv. 1. v. 8.

---

[a] Folio rigido acuto, unde nomen.

[b] Difficile admodum ex Theophr. verbis diftinguere inter Πευκην et Πιτυν: annon prior P. *Pinea* vel *Cembra*? P. *Larix* obfcure innuitur l. 15. ubi inter αειφυλλα, πευκης τι γενος occurrit; neceffe eft igitur aliud genus effe deciduum.

[c] Species hæc non enumeratur inter Quercus Theophrafti, fed ut genus diverfum, foliis utrinque acuminatis.

[d] Nulla Cucumeris *Melonis* L. apud Theophraftum mentio, cujus hab. ignotum.

[e] Occurrit Ficûs fpec. apud Linneum fub nomine F. *Morus*. Vid. etiam Συκαμινος Αιγυπτια. Polygam.

[f] Occurrit hîc vox τιφη, vitio textûs, in codd. quibufdam. Vid. Τιφη *Triandr.*

ΔΑΦΝΗ[a] Αλεξανδρεια. Ruſcus, *hypophyllum*, i. 16. iii. 7.

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ[b]. Myrica, *Gale*, iv. 11.

ΙΞΙΑ[c]. Viſcum, *album*, iii. 9, 16. ix. 1.

ΙΤΕΑ. Salix, i. 7, 8. iii. 1, 2, 4, 6, 7, 13. iv. 7, 11, 14, 19. v. 8, 4.

ι. λευκη.
ι. μελαινα.
ι. ἑλικη.

ΚΕΔΡΙΣ. } Juniperus, *Sabina*,
ΚΕΔΡΙΑ. } i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ[d]. Juniperus, *Oxycedrus*, i. 8, 15, 16. iii. 7, 12. iv. 6, 19. v. 5, 8, 9. ix. 1.

ΚΕΝΤΡΟΜΥΡΡΙΝΗ. Ruſcus, *aculeatus*, iii. 17.

ΛΕΥΚΗ[e]. Populus, *alba*, i. 16. iii. 1, 4, 6, 7, 10, 14. iv. 14, 19.

ΛΙΒΑΝΟΣ[f]. Juniperus, *Lycia?* ix. 1.

ΜΙΛΟΣ. Taxus, *baccata*, iii. 4, 6, 7, 10. iv. 1. v. 8.

ΜΥΡΙΚΗ[g]. Myrica, *Cordifolia*, i. 15, 16. iii. 4. iv. 7. v. 6.

ΣΜΙΛΑΞ. Smilax, *aſpera*, i. 15, 16, 18. vii. 8.

ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ. } Piſtacia, *Terebinthus*, i.
ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ. } 15. iii. 4, 6, 15. v. 8. ix. 1, 2.

Polygamia.

ΑΙΓΙΛΩΨ. Ægilops, *ovata*, vii. 12. viii. 7, 8.

ΑΚΑΝΘΟΣ[h]. Mimoſa, *Nilotica*, iii. 4. iv. 3. vi. 1.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΥΣ. } Atriplex,
ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. } i. 23. vii. 1, 2, 3, 4, 6.

ΕΡΙΝΕΟΣ. Ficus, *Caprificus*, (vid. Συκη, p. 22.) i. 24. ii. 3, 4, 6. iii. 6. iv. 14. v. 7.

ΙΣΧΑΙΜΟΣ. Andropogon, *Iſchæmum*, ix. 15.

ΚΕΡΩΝΙΑ[i]. Ceratonia, *ſiliqua*, i. 18, 23. iv. 2.

---

[a] Vide infr. Κεντρομυρρινη ambo ſub nomine, Ruſcus L.

[b] Chamæleagnus Dodon.

[c] Fructus Ιξιας expreſſe vocatur diverſus a fr. Ὑφεαρος. Vid. Claſſ. incert. p. 29.

[d] Cedri ſpecies omnes ſub genere, Juniperus L.

[e] Vid. Αιγειρος ſupr. Forſan Populus *tremula* L. niſi Europæ frigidioribus propria.

[f] Notam dubitationis adjeci. Reſina Juniperi cujuſdam vel Pinûs antiquitus in uſu inter ſuffimenta. N. B. Vox λιβανον (reſina) ſolummodo occurrit, ix. 1.

[g] Vid. Ελαιαγνος.

[h] Hodie ſub nomine Acacia in hortis et alibi; arbor ſpecioſa.

[i] Obſervandum Ceratoniam et Ficum ordinis Triœcii. L.

ΛΩΤΟΣ[a]. Celtis, *Australis*, i. 8, 9, 13. iv. 3, 4.

ΝΑΡΔΟΣ[b]. } Andropogon,
ΝΑΡΤΗ[c]. } *Nardus*, ix. 7.

ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ[d]. Parietaria, *officinalis*, i. 11.

1. ΣΥΚΗ[e]. Ficus, *Carica*, i. 5, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 23, 24. ii. 3, 7. iii. 6, 7, 17. iv. 2, 6, 14, 16, 19. v. 7.

2. ΣΥΚΗ[f] Αιγυπτια. Ficus, *Religiosa*, i. 23. iv. 2.

3. ΣΥΚΗ Κυπρια. ib.

ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ[g]. Acer, *campestre*, iii. 4, 6, 7, 11. v. 1, 4.

ʽΥΛΗΜΑ τι[h]. Mimosa, *sensitiva*, iv. 3.

Palmæ.

ΚΟΥΚΙΟΦΟΡΟΣ[i]. An Cocos? iv. 2.

ΚΥΚΑΣ. Cycas, *revoluta*, ii. 8.

ΦΟΙΝΙΞ. Phœnix, *Dactylifera*, i. 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23. ii. 2, 3, 8.

ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. CHAMÆROPS, ii. 8.

Cryptogamia.

Filices.

ΑΔΙΑΝΤΟΝ[k]. ADIANTUM.

ʽΗΜΙΟΝΟΣ[l]. Asplenium, *Hemionitis*, ix. 19.

ΘΗΛΥΠΤΕΡΙΣ[m]. Acrosticum, *Thelypteris*, ix. 20.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ[n]. POLYPODIUM.

---

[a] Vid. *Polyand.* et *Diadelph.*

[b] Unguentum Ναρδον solum memoratur. Spec. Graminis diu latens, cujus radix et spica odoratissima. Vid. Act. Reg. Soc. Lond. 1790.

[c] Ναρτη unguenti spec. diversa a Ναρδῳ. Vid. ix. 7. et Ναιρον, *Class. incert.*

[d] Nomen adhuc servatur apud Græcos hodiernos Περδικακι. Vid. Prodr. Fl. Græc.

[e] Vid. Ερινεος, p. 21. N. B. Genus Ficus, ordinis Triœcii, L. Theophrastus recte observat ὁλως πολυειδες ειναι το γενος των Συκων, de C. Pl. v. Genus Ficus in hac Classe collocatur, etsi proprie Genus Triœcium. N. B. Συκη Ινδικη Rhizophora L. Vid. Dodecandr.

[f] Arbor hæc perperam vocatur Συκαμινος, i. 23. Vid. Class. Monœc.

[g] Forsan A. Pseudo-Platanus L.

[h] Mimosa *sensitiva* L. etsi sine nomine, descriptione tamen habitûs, et præcipue ιδιοτητι του παθους inter plantas Theophrasto notas proculdubie enumeranda est. vid. p. 77.

[i] An Cocos a Κουκι? Palma, *Thebaica*, Coryphæ affinis L. Ang. "Doom Tree," Bruce's Trav. v. 45. N. B. Non enumeratur inter sex species Palmarum, ii. 8.

[k] Adiantum genus L. 19 species continens: ex textura folii humorem repellente, nomen Græcum.

[l] Hemionitis L. Genus novi orbis.

[m] Non occurrit Genus Thelypteris apud Linn. Planta hæc fronde indivisa (μονοκαυλῳ.) Vid. Lex: Theophr.

[n] Nomen ex lobis frondis pedes Πολυποδος referentibus.

ΠΤΕΡΙΣ[a]. Pteris.

ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. Adiantum, *Trichomanes*.

Musci.

ΦΑΣΚΟΣ[b]. Lichen, *pulmonaris*.

Algæ.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ Ποντια. Zoftera, *marina*, iv. 7.

ΑΜΠΕΛΟΣ Ποντια. Fucus, *natans*, vel *bacciferus*, ib.

ΔΡΥΣ Ποντια, F. *veficulofus*, ib.

ΕΛΑΤΗ Ποντια. F. *Abies marina Gmel*, ib.

ΠΡΑΣΟΝ Ποντιον. F. *nodofus?* ib.

ΠΡΑΣΟΝ ἑτερον. F. *loreus?* ib.

ΦΥΚΟΣ[c] Βαπτικον. F. *palmatus*, ib. &c.

ΦΥΚΟΣ Θριδακινη. Ulva, *Lactuca*, ib.

ΦΥΚΟΣ πλατυ, τετανωδης. F. *digitatus*, vel F. *polyfchides*, ib.

ΦΥΚΟΣ Μαραθρον. F. *fæniculaceus*, ib.

Fungi.

ΑΙΔΟΙΟΙΔΕΣ τι. Phallus.

ΑΣΚΙΟΝ[d]. Tuber, i. 10.

ΚΡΑΝΙΟΝ. Lycoperdon, *Bovifta*.

ΜΥΚΗΣ. Agaricus?

ΠΕΖΙΣ[e]. Peziza? de C. Pl.

ΠΙΝΗ. de C. Pl. iv.

ΠΥΞΟΣ. An ΠΥΓΟΣ?

ΣΦΑΙΡΙΟΝ. Peziza[f]? iii. 8.

ὙΔΝΟΝ. Hydnum?

---

[a] A. πτερυξ, frons alato-pinnata.

[b] Καθαπερ τρυχος οθονιον in truncis arborum. N. B. φασκος item Galla.

[c] Ὡ, βαπτουσιν ερια περι Κρητην. Hinc Latini *fucare* pro tingere.

[d] In umbra, vel fub terra proveniens.

[e] Hinc Linnei, et aliorum nomen: fynon. videtur Πυξου apud Ald.

[f] Quinque enumerantur fpecies fungorum in foliis et truncis arborum crefcentium, iii. 8.

ERRATA ET OMISSA.

ΑΜΠΕΛΟΣ, Ιδαια[a]. Vaccinium, *Vitis Idæa*, iii. 17.

ΑΠΑΤΗ. Syn. Αφακης, p. 17.

ΚΑΛΑΜΙΝΘΑ. (vid. Μινθα, p. 14.) de C. Pl. ii.

ΚΕΓΧΡΟΣ[b]. Cenchrus, viii. 1, 2.

ΚΥΔΩΝΙΟΣ. Pyrus, *Cydonea*, ii. 3.

ΜΗΛΕΑ *αγρια*. P. *Malus*, ſylveſtri ſtatu: Angl, "Crab-tree." de C. Pl. vi.

ΟΙΣΟΣ. Salix, *viminalis*, vi. 2.

'ΟΡΜΙΝΟΝ *αγριον*. Salvia, *Schlarea*. de C. Pl. vi.

ΟΧΝΗ. Syn. Αχρας, p. 12.

ΣΥΡΙΓΞ. Species Arundinis, p. 1.

ΧΑΝΔΡΑΣ. Syn. Χονδριλλας, p. 18.

---

[a] Vid. *Αμπελος*, p. 7. N. B. Locus natalis *περι φαλακρας καλουμενας Ιδης*, ill. 17. ſaxoſis et calvis M. Idæ cacuminibus; utpote et altitudo *πυγονιαιος*, Vaccinii ſpeciem indicant, non obſtante ſententia in notula, p. 7. expreſſa.

[b] Rectius Panici ſpec. cujus ſemen inter *αρωυραια* et *σιτηρα*.

PLANTÆ CLASSIS INCERTÆ.

A.

ΑΔΩΝΙΣ. v. *Ονωνις* ?
ΑΙΓΕΙΠΥΡΟΣ ? ii. 9.
ΑΚΑΛΥΦΗ[a]. vii. 7.
ΑΚΑΝΟΣ[b]. ix. 13.
ΑΚΑΡΝΙΚΟΣ[c]. iii. 18.
ΑΛΣΙΝΗ. ix. 13.
ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ[d]. de C. Pl. v.
ΑΝΤΙΡΡΙΝΟΝ[e]. } ix. 21.
ΑΝΤΙΡΡΙΖΟΝ. }
ΑΠΑΡΓΙΑ. vii. 9.
ΑΠΙΟΣ[f].
ΑΣΙΝΗ[g]. de C. Pl. ii.
ΑΣΠΑΛΑΞ[h]. } i. 11.
ΣΠΑΛΑΞ. }
ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ[i]. ix. 7.
ΑΦΥΛΛΑΝΘΕΣ. vii. 9.
ΑΧΥΝΩΨ[k].

B.

ΒΑΛΣΑΜΟΣ[l]. ix. 2, 6, 7
ΒΟΛΒΟΣ[m]. i. 10, 16. vii. 2.

---

[a] Spec. *ποωδης* cum *Τευτλιδι*; edulis poſt coctionem.

[b] Vox *ακανος* pericarpium Carduorum indicat; ſed ſemel, ut ſyn. *Χαμαιλεοντος λευκης*.

[c] Forſan Hederæ ſpec. nomen Gentilitium. Vid. Hederæ varietates, p. 8.

[d] Semel occurrit; *Αναδενδρας* et *Συκη συντροφαι αλληλαις*, ib. An Paraſita trunco Ficûs innaſcens?

[e] Forſan planta magica, *και γαρ αει ποιει ευκλειαν*. forma floris *ὡς μοσχου ῥινος*.

[f] Videtur Euphorbiæ ſpec. Vid. *Απιος*. Pyrus, *communis*, p. 12.

[g] Cum *Ἑρπυλλῳ*, ut ſpecies repens; an error textûs pro *Απαρινη*?

[h] Semel occurrit, ubi radix craſſa memoratur.

[i] Deſc. nulla, ſed inter Aromata vox occurrit: an fructus vel *ειδος Ασπαλαθος*. Vid. *Σπαλαξ*.

[k] Forſan legendum *Κυνωψ*. Vid.

[l] Forſan Amyris, *Gileadenſis*, Encycl. Brit.

[m] Allii L. genus radice bulboſa: vel Scilla unifolia Falc[r]. ſyn. *Βολβινης*. Hexandr.

---

[a] Spec. incognita, Hyacintho Peruviano forsan affinis, cujus bulbus ἰχει το εριον ὑπο τους πρωτους χιτωνας. vii. 13.

[b] A quibusdam Bupleurum, *rigidum*.

[c] Spec. Ζυγιας· εν τῳ ορει Ζυγια· εν δε πεδιῳ Γλινος. Vid. Ζυγια, Monœc.

[d] Spec. venenosa, sine desc. fors. Thapsia L.

[e] Arbor, cujus lignum densum et pulchre variegatum.

[f] Δρυπεψ usurpatur de fructibus deciduis: vid. Lex. Theophr. Hic planta spinosa designatur. N. B. Vox Drupa, *Bot.* Bacca, nucleo intus.

[g] Enumeratur in Catalogo cum Helleboro et Scammonia; fors. Momordica, *Elaterium* L.

[h] Allis Λυλιμωνια, palustris planta; textus certe corruptus

[i] Differt ab Helenio L.

[k] An Polygoni scandentis spec. vel Fumaria claviculata, vel capreolata.

[l] Nomen triviale spec. Σκυλλας. Vid. Cl. *hexandr.*

[m] Cum 'Ηδυοσμῳ enumeratur: anne Thymus, *mastichina* L. ex odore pungenti.

[n] Forsan Alchemilla, *arvensis* L.

[o] Semel occurrit. Planta fausti ominis, ut nomen indicat. Differt ab Euonymo L. fructus similis Sesami, εν φοβῳ.

[p] Species tota fragrans, ut videtur, caule sc. et foliis.

[q] Syn. Σκορπιου. Vid. infra.

[r] Fors. error textûs pr. Ιξια.

[s] Planta palustris, cum 'Ιπνῳ: vox derivari videtur ab ικμας, humor.

'ΙΠΠΟΝ [a]. } iv. 11.
'ΙΠΝΟΝ. }
'ΙΠΠΟΜΑΝΕΣ [b]. ix. 15.
ΙΣΧΑΣ [c]. ix. 10.
ΙΨΟΣ [d]. iii. 6.

K.

ΚΑΔΥΤΑΣ [e]. de C. Pl. ii.
ΚΕΝΤΑΥΡΙΣ [f] τριορχις.
ΚΟΚΚΟΣ [g] Κνιδιος. ix. 22.
ΚΟΨΙΜΟΣ [h]. iii. 15.
ΚΥΝΩΨ [i]. vii. 8, 10.
ΚΩΜΑΚΟΣ [k]. ix. 7.

Λ.

ΛΑΚΑΡΑ [l]. iii. 7.
ΛΕΙΜΟΔΩΡΟΝ [m]. de C. Pl. vi.
ΛΕΙΜΩΝΙΑ. v. Ελειολειμωνια.
ΛΕΥΚΟΙΟΥ ανθει δενδρον, iv. 9.
ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ [n]. } iv. 6. ix. 2,
ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ. } 4, 12
ΛΙΜΝΩΔΕΣ [o] τι.

M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ [p]. i. 11. vi. 3.
ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΟΝ [q] τι σφοδρα.
ΜΗΛΩΘΡΟΝ [r]. vi. 1.
ΜΝΑΣΙΟΝ [s]. } iv. 9.
ΜΝΑΥΣΙΟΝ. }

---

[a] In aquis nafcens, cum priore. N. B. Ex nomine conjicere libet Equifitum L. vel Hippurim indicari.

[b] Τιθυμαλλου fpecies, (vid.) fi non fuccus infpiffatus.

[c] Legitur Ισχας Απιος, vel Ισχας, η Απιος. forf. fynon.

[d] Defc. nulla, nec apud Botanicos vox occurrit; planta forfan venenofa, ab ιπτω.

[e] Vox Syriaca, fpec. parafiticam indicans.

[f] Forf. fpecies Centauriæ. Vid. p. 17. Ex radice facile diftinguenda.

[g] Forfan Capficum, *frutefcens*.

[h] Affinis Cratægi fructu rotundo.

[i] An Echinops? vel ex forma floris ringenti, *Bot.* Antirrhini fpec. Angl. "Snap-dragon." Vid. Αχυνωψ, p. 26.

[k] Arbor fructu aromatico L. Myrobalano affinis. A quibufdam Myrifticæ, fpec.

[l] Forf. Λακαθη. Vid. Icofandr.

[m] Ευθυς τη ριζη παραφυομενον. Parafitica fpec. An error textûs pro Αἱμαδωρον? Vid. Didyn. Affinis videtur Βουκερατες, vel potius fyn. Λειμωδωρον τὸ Βουκερας. de C. Pl. v.

[n] Arbor Thurifera nondum clare inveftigata; ab aliis herba: Athamanta, vel Ligufticum.

[o] An Hottonia, *paluftris?* Vid. defc. floris et foliorum, Cat. Alph.

[p] Laferpitii fpec. ut videtur. Vox Æthiopica?

[q] An Mangifera, *Indica* L. item ἡδυκαρπος σφοδρα.

[r] Fruticis inermis fpec. cum Cifto, et Eruthedano.

[s] Vox Ægyptiaca fpeciem paluftrem indicans, cujus nulla in fynon. Linn. mentio.

ΜΥΑ [a]. vi. 8.
ΜΥΑΚΑΝΘΟΣ [b]. vi. 4.
ΜΥΔΙΟΝ [c]. vi. ?
ΜΥΟΦΟΝΟΣ [d]. vi. 1, 2. vii. 10.
ΜΥΡΡΙΣ [e].

N.

ΝΑΙΡΟΣ [f]. } ix. 7.
ΝΑΡΤΗ. }
ΝΗΛΕΙΑ [g] i. 8.
ΝΗΠΕΝΘΕΣ [h]. ix. 15.

O.

ΟΙΝΑΡΟΣ [i]. i. 15.
ΟΙΝΟΘΗΡΑ [k]. ix. 21.
ΟΙΝΟΡΑΝΘΗΣ [l]. de C. Pl. vi.
ΟΛΙΒΑΝΟΣ [m]. ix. 4.
ΟΝΟΚΙΧΛΗΣ [n]. vii. 10.
ΟΝΟΠΥΞΟΣ. De C. Pl. vi.
ΟΞΥΑΚΑΡΠΑ [o]. } iii. 6.
ΟΞΥΚΑΡΠΑ. }
ΟΡΟΒΑΓΧΗ [p]. de C. Pl. v.
ΟΥΙΓΓΟΣ [q]. } i. 10, 11.
ΟΥΙΤΟΣ. }

Π.

ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ [r]. vi. 4.
ΠΕΡΣΕΑ [s]. } iv. 2.
ΠΕΡΣΙΟΝ. }

---

[a] Cum Celaſtro. Forſ. error textûs.
[b] A quibuſdam Aſparagus ſylveſtris: ab aliis Ἱπποφέως ſyn. v. p. 6.
[c] Arbor quædam glandifera, forſan Quercûs ſpecies.
[d] Inter umbelliferas, cum Ναρθηκι et Μαραθρῳ.
[e] An id. q. Μυρῥινη.
[f] Unguentum Ναιρον una cum Ναρτη memorantur. V. Ναρδος, p. 22.
[g] Error, ut videtur, pro Ελεια, paluſtri. Ανδραχνη Νηλεια, ib. pr. A. Ελεια.
[h] An ſuccus inſpiſſatus Papaveris, *Somniferi*, Angl. "Opium," vel Papaveris ſpecies? Vires ab Homero decantatæ.
[i] Cum Andrachne; ſi non nomen triviale.
[k] Vires εκςατικαι; odor vinoſus: affinis Στρυχνου, vel Οναγρας Falc[r].
[l] Forſ. legend. Οιναν9ης.
[m] Mentio fit Gummi, Olibanum. Anne ſcribendum ὁ Λιβανος? Vid. Λιβανος, p. 21.
[n] Cum Cichorio.
[o] An error textûs? Forſan legendum οξυακανθα, ſyn. Cratægi?
[p] Amplexu et luxuria plantas necat, ut Polygonum, *Fagopyrum*; minime Orobanche, L. Moldenhauer conjicit vocem hanc gentilitiam eſſe Ari, *Colocaſiæ*. V. Tentamen in Theophr. p. 60.
[q] Pronuntiandum Vingos. Vox Ægyptiaca. Species ſub terra radice tuberoſa.
[r] Nullibi occurrit. Forſ. nomen gentilitium.
[s] Non Laurus *Perſea* L. ſed forſ. Perſea arbor; Ger. em. 1606. Forſ. το Περσιον fructus Amygdali, *Perſicæ*, L.

ΠΙΛΟΣ[a]? iii. 8.
ΠΙΤΥΩΝ[b]. vii. 13.
ΠΙΤΥΙΝΗ[c].
ΠΟΛΙΟΝ[d].

P.

'ΡΟΔΟΥ[e] ανθει δενδρον. iv. 9.
'ΡΥΤΡΟΣ[f]. vi. 3.

Σ.

ΣΙΔΗ[g]. iv. 11.
ΣΚΟΛΥΜΩΔΗΣ[h] τις. ix. 13.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ[i]. vi. 3. ix. 14.
ΣΚΥΘΙΚΗ[k] ῥιζα. ix. 13.
ΣΜΥΡΝΑ[l]. iv. 6. ix. 1, 2, 4, 7.
ΣΠΑΛΑΞ. vid. Ασπαλαξ.
ΣΠΕΙΡΑΙΑ[m]. i. 23. vi. 1.
ΣΤΕΛΙΣ[n]. de C. Pl. ii.
ΣΤΛΕΓΝΙΣ[o], vel Σιλιγνις.
ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ[p]. vi. 3.

T.

ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ[q] ὁμοιος. iv. 5.
ΤΕΤΡΑΛΙΞ[r]. vi. 3.
ΤΙΓΡΙΝΟΝ[s] ξυλον. v. 6.
ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ[t]. ix. 21.

Υ.

'ΥΦΕΑΡ[u]. iii. 16.

---

[a] Incertum an Galla, vel Fungus.

[b] Species bulbosa. N. B. Ambo ita dicti ex foliis Pini? Vox Pithyusa occurrit inter syn. Euphorbiæ.

[c] An genus diversum? vel fors. Ajuga, *Chamæpitys*.

[d] Polium, *Creticum* Bauhin?

[e] An Hybiscus L.

[f] Certe Cardui affinis genus. N. B. Vox Ritro occurrit inter synonyma Linnei, sc. Echinops, *Ritro*.

[g] Planta aquatica. Vid. Μηκωνιον. Pericarpio globoso instar mali granati, unde nomen.

[h] Affinis Scolymi Linn. sed lethalis.

[i] A quibusdam Genista, sed male; ακανου enim mentio. Foliis Cyclaminis; radice revoluta. N. B. Spec. alia aphylla, fors. Ulex. L.

[k] Ex dulcedine succûs Glycirhiza videtur innui.

[l] Arbor myrrhifera Arabiæ.

[m] An Spiræa L? non si licet conjicere ex descriptione.

[n] Spec. parasitica in truncis arborum. Cum Visco et 'Υφεατι.

[o] Forsan tritici var.

[p] Duo Στρουθιοι occurrunt. 1. Cardui affinis pericarpio lævi, ut Sonchus. Vid. Στρουθιον, p. 12. 2. Pyr. *Cydonia*, sylvestri statu: sic αντι Κυδωνιας Στρουθιον, vi. 3. Apud Varronem enumerantur Mala Struthia, et Mala Cotonea: qu? i. c. 59.

[q] Vid. Τερμινθος. Class. Diœc.

[r] An Carduus Eriophorus? vel foliorum habitu affinis planta? N. B. Inter Ericas Linn. nomen occurrit triviale Tetralix.

[s] Vid. Δενδρ. Τιγρινον. p. 25.

[t] Spec. pharmaceutica ab Homero decantata. An Aster, *tripolium* L?

[u] Cum Στελιδι et Ιξια in truncis arborum.

Φ.

ΦΕΩΣ[a]. vi. 3, 4, 5.
ΦΙΛΥΚΗ[b]. i. 15. iii. 4, 6.
ΦΛΟΓΙΜΟΝ[c]. vi. 7.
ΦΛΟΜΟΣ[d] μελαινα. ix. 13.
ΦΛΟΞ[e]. vi. 6.
ΦΥΛΛΟΝ[f] το. ix. 18.

---

[a] Planta ſpinoſa, cum Capparide, Ononidi, Παντaδουση. N. B. Vox Φλεω. apud Aldum, errore textûs; Φλεως enim Scirpus. vid. p. 6. Apud Falc[r], Papyrus Syriacus. Vox Φεως ſynonyma apud quoſdam Στοιβης. Vid. *Syngen.*

[b] An Rhamnus, *Alaternus* L.? vid. Deſc.

[c] Ex colore flammeo forſan Erythronium, *Dens canis* L. etiam ſi libet conjicere ex præcocitate floris.

[d] Phlomis Genus L. ſed diverſum a Φλομῳ. Obiter notatur in deſc. Papaveris nigri. N. B. Φλομος μελαινα Dioſc. Verbaſcum, *ſinuatum* L. φλ. λευκη. Verb. *plicatum*. Prodr. Fl. Græc. 150.

[e] Inter flores coronarios cum Διος ανθει an Agroſtemma, *flos Jovis* L. N. B. Phlox Linn. Genus novi orbis.

[f] Forſan Mercurialis, *perennis*. Spec. duæ; φ. αῤῥενογονον, et φ. θηλυγονον; ex forma fructûs διχρον, vel geminata. Vid. Ger. em. p. 333. de Arrenogono et Thelygono.

QUÆ IN REGNI ANIMALIS SEX CLASSIBUS LINNEI OBITER A THEOPHRASTO NOTANTUR.

CLASSIS PRIMA.

Mammalia.

ΔΟΡΚΑΣ. Capra, *Dorcas*; vel C. *Gazella*.

Hab. Εν τῃ μη ὑομενῃ γῇ. (Vid. infr. Πτωξ.)

ΕΛΑΦΟΣ. Cervus, *Elaphus?* an C. *Capreolus*.

Ὡς τα περι τας Ελαφους, αἱ τους Εχεις εσθιουσιν, ὑφ' ὡν τα αλλα θνησκουσι. de C. Pl. iv.

ἹΠΠΟΣ. Equus, *Caballus*.

Λοφουρος a Theophraſto ſæpius vocatur; cauda ſc. criſtis uſitata. Στελεφουροι e contra, cauda, ſtipitis inſtar, cylindrica, æquali; Bos, Ovis, Cervus.

ΚΥΩΝ. Canis, *familiaris*.

Κυων και Ὑς μονοι των θερμων πολυτοκει, (ſc. 12, 15, 20. uno partu.) de C. Pl. i.

ΛΑΓΩΣ. Lepus, *timidus*.

Τα ιχνη των Λαγοων ευοσμοτερα, (the ſcent lies better) ψεκασθεντα μαλακως. Μεταπωρου καιρος κυνηγιας, ὁταν αἱ οσμαι των ανθων ου παρενοχλουσι. de C. Pl. l. vi. Superfætatio Leporis occurrit in hiſtoria plantarum.

ΠΑΡΔΑΛΙΣ. Felis, *Pardus*.

Solus ευοσμ[illegible] (odore fragranti delectatur.) de C. Pl. vi. Obſer-

vatur a Theophrasto animalia in genere aversari odores. N. B. Species nonnullæ generis Felis L. ευωδεσι delectantur; *e. g.* Felis, *Rattus* L. oleo Rhodii, utpote et Felis, *Lutra.*

ΠΤΩΞ. Mus, *Jaculus.*

Εν τῃ μη ὑομενῃ, (in partibus Libyæ ubi pluit nunquam,) ιδια πλειω γινεσθαι· και Πτωκα, και Δορκαδα, και Στρουθιον, iv. 4.

ὟΣ. Sus, *Scrofa.*

Cum Cane; μουνος των θερμων πολυτοκει, (vid. Κυων.) de C. Pl. iv.

CLASSIS SECUNDA.

Aves.

ΑΕΤΟΣ. Falco, *Chrysaëtos.*

Mentio fit in plantis magicis colligendis, Αετον φυλαττεσθαι, ix. 9. respectu augurii boni.

ΓΥΨ. Vultur, *Percnopterus.*

Αναιρεται ὑπο των μυρων. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΣ. Picus, *martius*, ix. 9.

Νυκτωρ κελευουσιν ορυττειν τας ῥιζας της Παιωνιας· εαν γαρ οφθῃ ὑπο Δρυοκολαπτου, κινδυνευειν τοις οφθαλμοις, ib.

ΙΚΤΙΝ. Falco, *Milvus.*

N. B. Ex voce ἀΐσσω conjicere licet Ικτινα inter Falcones rapidi volatûs, locum obtinere.

ΚΙΤΤΑ. Sitta, *Europæa.* de C. Pl. ii. p. 155. B.

Ὀρυττει η Κιττα θησαυριζομενη τας βαλανους.

ΚΟΚΚΥΞ. Cuculus, *canorus.* de C. Pl. ii. 155. B.

Ου δη του Κοκκυγος (φυσις), ει μη ην Ὑπολαις· (vid.) και εις την νεοττιαν τα ωα τιθησιν.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ. Struthio, *Camelus*, iv. 4.

Εν τῃ μη ὑομενῃ (γῃ) γινεται.

ʽΥΠΟΛΑΙΣ. Motacilla, *modularis*, vel Curruca antiquorum. Vid. fupr. Κοκκυξ.

ΧΑΡΤΟΔΡΑ? }
ΧΑΡΑΔΡΙΑ? }

Κοπρος ανθρωπου και Χαρτοδρας δριμυτατη, ii. 8. an Fimus Columbinus? cujus vires notiffimæ.

CLASSIS TERTIA.

Amphibia.

ΕΧΙΣ. Coluber; nomen Genericum.

Vid. Ελαφος, qui dicitur Serpentibus vefci. de C. Pl. iv.

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ. Crocodilus.

ʽΡιζα του κυαμου (vid. Κυαμος Αιγυπτια, p. 18.) ισχυρα, και επακανθιζουσα· διο και ὁ Κροκοδειλος φευγει μη προσκοψῃ τῳ οφθαλμῳ, iv. 10.

ΟΦΙΣ. Coluber.

Αναιρουνται ὑπο των Σκορπιων. de C. Pl. iv. animal αποτον, (fine aqua vivens,) iv. 4.

Οφεις μικροι σφοδρα, συσπειρομενοι, ("coiled up,") iv. 5.

ΣΑΥΡΟΣ. Lacerta. Genus αποτον in aridis Libyæ vivens, iv. 4.

CLASSIS QUARTA.

Pisces.

ΚΑΡΧΑΡΙΑ. Squalus, *Carcbarias*.

ʽΗ δε θαλαττα (Ερυθρα) θηριωδης, και πλειςους εχει τους Καρχαριας, ὡςε μη ειναι κολυμβησαι, iv. 8.

CLASSIS QUINTA.

Insecta.

ΑΤΤΕΛΑΒΟΣ. Attelabus.

Καταβρωθεντων των εργων αμπελου, (i. e. furculis Vitis erofis,) ὑπ᾽ Αττελαβων, ii. 4.

N. B. Genus Attelabus a Linneo fiftitur, S. N. 619.

ΚΑΜΠΗ. Eruca. Inter Lepidoptera.

N. B. Metamorphoſεων Inſectorum clariſſima extant indicia apud Theophraſtum. de C. Pl. l. v. Αἱ μεταβολαι κατα την γενησιν· οἱον επ' αλλων, και επι των καλουμενων Ψυχων· εκ Καμπης γαρ Χρυσαλλις, (Chryſalis vel Pupa L.) ειτ' εκ ταυτης ἡ Ψυχη, (Imago L.) vocantur τριγονησαντα. de C. Pl. i.

ΚΑΝΘΑΡΙΣ. Curculio, *granarius?*

Επιγινεται ἡ Κανθαρις εν τοις πυροις, viii. 10.

ΚΕΝΤΙΣ. }
ΚΕΝΤΡΙΣ. } Ichneumon parvum non deſcriptum.

Εϛι και ἑτερον γενος των Ψηνων (vid.) ὁ καλουσι Κεντινας· οὑτοι δ' αργοι, ὡσπερ Κηφηνες, (Apis, *mas* L.) τους εισδυομενους κτεινουσιν, ii. 9. N. B. De Ψηνι Ficûs ſermo eſt; forſ. Cynips, *Pſenes*. L. S. N. 919.

ΚΕΡΑΣΤΗΣ. Inter *Coleoptera*.

Ιδιον τι περι τον καλουμενον Κεραϛην συμβαινει· εν τη Ελαιᾳ γινεται, εν δε τη Συκη εντικτει. de C. Pl. v. Σκωληκας εντικτομενους παντας, (erucas,) εις κεραϛην αποκαθιϛασθαι; φθεγγονται δ' οἱον τριγμον, (de ſtridore alarum inter volandum, ib.) de C. Pl. v.

ΙΨ. Cynips.

Οἱ ιπες, οἱ εν τοις κυαμοις εγγινομενοι, και αλλοι εν αλλοις, ὡσπερ εν τοις δενδρεσι και ξυλοις ελεχθη. N. B. Animal a ſequente diverſum ex modo victûs, quod ſæpe innuitur, viii. 10.

ΚΝΙΨ. Aphis.

Εγγινονται δε Κνιπες εν τισι των δενδρων....και δοκουσιν εκ της ὑγροτητος συνιϛασθαι, της ὑπο τον φλοιον· αυτη δ' εϛι ΓΛΥΚΕΙΑ· γινονται δε και εν λαχανοις, iv. 7.

ΟΝΙΝΝΟΣ. }
ΟΝΙΣΚΟΣ. } Oniscus.

Εν καυλοις της Δρυος και Ελατης ποντιας ενδεκυκοτες οἱ Ονιννοι, και το ὁμοιον Πολυποδι, iv. 7.

ΟΝΟΣ. Oniſcus, *Aſellus*.

Πολυπουν τι, και μελαν συσπειρομενον εις ἑαυτο, (in ſe circumvolutum,) frequens in Libyæ arenis, iv. 4.

'ΟΜΟΙΟΝ Πολυποδι. (Vid. supr.) Nereis, vel Scolopendra in Nereide Britannica descripta, in caulibus Fuci Tamariscifolii nidulans, iv. 7.

ΠΡΑΣΙΚΟΥΡΙΣ. Cimex, *prasinus* L. 722.

Εν τοις πρασοις, και εν αλλοις πλειοσι αἱ Πρασικουριδες, vii. 5.

N. B. Hinc forsan vox Anglica, " Lady Cow."

ΣΗΠΑΙ ? }
ΣΗΤΑΙ. } Genus ignotum.

Animal noxium quoddam mordens cum Εχει et Φαλαγγιῳ, (Aranea, *Avicularia* L. vel Tarantula.) Χρωνται Πανακῃ Χειρωνειῳ προς τους Εχεις και τα Φαλαγγια, και τας Σητας, και τ'αλλα ἑρπετα, ix. 12.

N. B. Ex voce ἑρπετα licet conjicere Σητας vel Σηπας reptilia quædam. Animal aliud Σης.

ΣΚΟΛΟΠΙΑ. Scolopendra, *Electrica* L.

Γηθυου ῥιζαις χαιρει, ut colligi potest ex textu corrupto, vii. 11.

ΣΦΟΝΔΥΛΗ. Iulus L.

'Ριζας δριμειας ουδεν αλλο θηριον άπτεται, ἡ δε Σφονδυλη πασων, ix. 14.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ. Scorpio.

In aridis nascitur. Vid. quæ dicitur de Scorpione et Serpente. v. Οφις, p. 33.

ΦΑΛΑΓΓΙΟΝ. Aranea.

A. *Avicularia* L. vel A. *Tarantula*, ix. 12. Vid. supr. Σηται.

ΦΘΕΙΡ. Pediculus, *humanus*.

Οἱ Φθειρες συγγενεις εισι αἱματος· εξ οὑ διαφθαρεντος, ἡ γενεσις. de C. Pl. ii.

ΨΗΝ. Cynips, *Psenes* L. L. S. N. 919.

Οἱ δε Ψηνες εκδυονται εκ του ερινεου· γινονται δε εκ των κεγχραμιδων. σημειον δε τουτου λεγουσι, ότι επειδαν εκδυωσιν, ουκ ενεισι κεγχραμιδες· εκδυονται δ' οἱ πολλοι εγκαταλειποντες, η ποδα η πτερον, ii. 9.

ΨΥΛΛΑ. Tenthredo, *Rapæ?* L. S. N. 926.

Θηρια δε γινεται ταις μεν Ῥαφανισι, Ψυλλαι, vii. 7.

CLASSIS SEXTA.

Vermes.

Molluſcæ.

ἙΛΜΙΣ *πλατεια*. Tænia, *lata*.

Ἡ δε ῥιζα της Πτεριδος (vid.) *μονον Ἑλμινθα την πλατειαν εκβαλλει· ἡ δ' Ἑλμις συμφυτον ενιοις εθνεσιν· εχουσι γαρ, ὡς επιπαν, οἱ Αιγυπτιοι*, ix. 22.

ΙΝΕΣ ? Aſcarides, *vermiculares ?*

Φασι δε μονον (*ῥιζαν Ελατηριου*) *φαρμακον ὑπερ ινων ανω. αυτη μεν ουν ιδιοτης της δυναμεως*. N. B. Textus videtur corruptus, ix. 14. Alii legunt *ὑπερινον* una voce.

ΚΟΧΛΙΑ *Συκης*.

Animalculum teſtaceum in truncis arborum; frequens in viridariis, iv. 16. Neſcio an deſcriptum.

ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ *Ζωα*. Testacea.

Mentio fit *Οϛρακοδερμων* in apicibus Fuci, *Serrati*, et *Veſiculoſi*. N. B. Serpulæ præcipue, et juniores Cochleæ illic nidulantur. iv. 7.

ΠΟΛΥΠΟΥΣ. Asterias.

Ἡ του Πολυποδιου (vid. Tab. Syſt. p. 22.) *ῥιζα δασεια, και εχουσα κοτυληδονας* (vid. Lex. Theophr.) *ὡσπερ αἱ του Πολυποδος πλεκταναι* (Aſteriæ tentaculæ,) ix. 14.

ΠΛΥΣΙΑ. Laplyſia, *depilans?*

Ἡ Σπογγια, και αἱ Πλυσιαι καλουμεναι εν θαλαττῃ ἑτεραν εχουσι φυσιν, (i. e. Zoophytis, non Plantis adnumerandæ,) iv. 7.

ΣΚΩΛΗΞ. Lumbricus, *terreſtris*.

Ad radices *Ῥαφανιδων*, vii. 5. N. B. *Σκωληξ* nomen generale Vermium et Erucarum, &c. ut *Σκωληξ Μεσπιλου*, iii. 12. *Σκ. Συκης*. de C. Pl. v. &c.

ΣΠΟΓΓΙΑ. Spongia.

Cum *Πλυσιᾳ*, ut naturæ a plantis diverſæ.

ΣΥΚΗ ποντια. Alcyonium, *Ficus ?*

Ι. φυλλος· μεγεθει ου μεγαλη, χρωματι φοινικῳ.

ΤΕΡΗΔΩΝ. Teredo, *navalis.*

Ου γινεται Τερηδων αλλ' εν θαλασσῃ, v. 5. *φασι δε Πευκην Ελατης μαλλον ὑπο Τερηδονος εσθιεσθαι*, ib.

ΛΕΠΑΣ. Patella.

Προσπεφυκυια πετραις· optime, iv. 7.

Lithophyta.

ΜΥΚΗΣ λιθινος. Madrepora, *Fungites.*

Sufpicatur Theophr. *ὁτι αφ' Ηλιου απολιθουνται*, iv. 8.

Zoophyta.

ΔΕΝΔΥΦΙΑ *κερατινα.* Gorgoniæ, vel Ifidis fpecies.

Τοις οζοις τραχεα, και επ' ακρου πυρρα· item fragilia, nec igni combuftibilia, fed in igne candentia, ut ferrum, iv. 8.

N. B. Ex apicibus cortice nudatis, coccineis, Gorgonia, *Nobilis* indicari videtur.

ΦΟΙΝΙΞ *ποντια.* Gorgonia, *flabellum ?*

Βραχυστελεχης σφοδρα· εκφυσεσι των ῥαβδων ευθειαις· κατωθεν κυκλοθεν ὡς ῥαβδων· ακρεμονες δ' ὡσπερ εν πλατει, κατα μιαν συνεχεις, (apices expanfi et complanati, partibus inter fefe inofculantibus ?)

ΣΧΟΙΝΟΙ λιθινοι. Sertulariæ.

N. B. Species quædam ramis fimplicibus: pluribus ex uno difco.

LEXICON THEOPHRASTI.

LEXICON THEOPHRASTI.

ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΟΣ. Angiofpermus, *Bot.* cujus femina perianthio laxo involvuntur. Vid. Γυμνοσπερμος, vii. 3.

ΑΓΚΥΡΑ. Inftrumentum rufticum bi- vel tri-dentatum.

ΑΓΝΩΔΗΣ. Agni, *cafti* fimilis. Vid. Αγνος, Tab. Syft. p. 14.

ΑΓΟΝΙΟΣ. } Vid. Γωνια.
ΑΓΩΝΙΟΣ. }

ΑΓΩΓΗ. Ordinatio ramorum arboris, Angl. " training," i. 14.

'ΑΔΡΟΣ. Firmus, validus, craffus: opp. τῳ λεπτῳ, vii. 4.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ. Impoffibilitas, δυνασθαι την αδυναμιαν, Græcifmus, ix. 19.

ΑΕΠΙΣΠΟΡΟΣ. Vid. Επισπορος, vii. 1.

ΑΘΕΡΩΔΗΣ. Ariftatus, *Bot.* vii. 10.

ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ. Tenax, Angl. " tough." de ligno, i. et paff.

ΑΘΡΙΠΕΔΗΣ. Non erofus vermibus, a Θριψ. v.

ΑΘΥΡΟΣ. Forf. αχυρος. Paleaceus, *Bot.* de C. Pl. iv.

ΑΙΓΙΣ. Trunci pars in pinu, ad nodos, tabulis pictoriis, vel fcriptoriis ufitata, iii. 10. etiam ad clypeos, ib. N. B. Quandoque cor totum trunci. *Mold.*

'ΑΙΜΑΣΙΑ. Sepes ex fpinis, quæ corpus vulnerant, unde nomen. paff.

ΑΙΝΟΣ. Sine fibris (vid. Ινις,) de ligno. hinc ινϊνος. paff.

ΑΙΡΩΔΗΣ. Loliaceus *Bot.* Lolio infeftatus. de fegete, v. 5.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ. Oris palatum. de C. Pl. vi.

ΑΙΤΙΑΙ αἰ. Effectus, proprietates, vel " poteftates herbarum." paff. Hinc titulus Libri Περι Φυτων Αιτιων, vel, ut Varro rectius fcribit, Περι Φυτικων Αιτιων, l. i. 5.

ΑΚΑΝΟΣ. Pericarpium vel capitulum in Carduis, &c. &c. etiam Cardui fpec. v. p. 25.

ΑΚΑΝΙΖΩ. fupr.

ΑΚΑΡΔΙΟΣ. Vid. Καρδια, *Bot.*

ΑΚΙΔΩΔΗΣ. Triangulari-acutus: ſimilis cuſpidis ſagittæ; de forma ſeminis Σχοινου. Vid. iv. 13.

ΑΚΙΣ. ſupr.

ΑΚΜΑΙ αἱ. Tempora convenientia. Αἱ ακμαι προς την τομην, "the exact ſeaſon," v. 1.

ΑΚΝΙΣΟΣ. Scaber, non raſus. Σωμα ακνισον. de C. Pl. ii.

ΑΚΟΝΑΙ αἱ. 1. Rupes calcariæ; ab ακονη, cos, "a whetſtone," ix. 16. 2. Nomen loci.

ΑΚΟΠΟΣ. Vermibus intactus. de veſtibus, ſeminibus &c. iv. 4. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΑΤΗΣ. 1. Immoderatus, p. 2. immiſtus, crudus: γη ακρατης. de C. Pl. v.

ΑΚΡΕΜΟΝΕΣ οἱ. Rami majores, vel ſuperiores, i. 4.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ τα. Fructus ſpec. quæ putamine teguntur Caſſ. Baſſ. ῥοια, πισαχια, καςανα. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΟΥ. εξ ακρ. περιττον. de folio pinnato, impari *Bot.*

ΑΚΡΟΡΡΙΖΟΣ. Radice horizontali *Bot.*

ΑΚΤΙΝΟΣ. Sambucinus. . Vid. Ακτη.

ΑΚΥΛΟΣ. Ilicis glans, ii.

ΑΛΕΑ. Calor Solis. de C. Pl. i.

ΑΛΕΕΙΝΟΣ. Calidus, ſoli expoſitus: opp. τῳ ψυχρῳ.

ΑΛΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine tunicis. Vid. Λεπις, vii. 4.

'ΑΛΙΚΟΙ οἱ. Paludes ſalſæ, iv.

'ΑΛΙΚΩΔΗΣ. Supr. ix. 12.

'ΑΛΙΦΛΟΙΟΣ. Cortice, guſtu ſalino? . N. B. Spec. Quercûs, ita vocatur, ſed forſ. error textûs pro αλλοφλοιος, pro cortice duplici Q. Suberis L. alii ab ἁλις.

'ΑΛΚΥΩΝΙΔΕΣ οἱ. Dies Halcyonis. Vid. Myth. Antiq. ix.

'ΑΛΜΑΙ αἱ. Vid. αἱ ἁλικοι, ſupr.

ΑΛΦΟΣ. Scabies; morbus cutaneus in pecoribus, div. a ψωρᾳ, ix. 12.

ΑΜΑΞΑ μονοςροφος, vel μονοτροχος. Currus rota unica; an manibus accommodata, *e. g.* "a wheel-barrow?" v. 8.

ΑΜΒΛΩΣΙΣ οφθαλμων. Abortio gemmarum, *Bot.* iv.

ΑΜΒΛΩΨ. Morbus ipſe, ib.

ΑΜΕΝΗΝΟΣ. Debilis, periturus; αμενηνα σπερματα, iii.

ΑΜΕΡΓΩ. Succo privo; ὁταν αμεργωσι τον καρπον, ix. 8.

ΑΜΟΡΓΑ. Amurca: Olei expreſſi recrementum. de C. Pl. vi.

ΑΜΗΣ. Placenti genus. de C. Pl. vi.

ΑΜΙΣΧΟΣ. Vid. Μισχος.

ΑΜΦΑΥΞΙΣ. } Intumeſcentia
ΑΜΦΙΦΥΑ. } in trunco Abietis poſt decacuminationem. Vid. deſc. accuratam, iii. 8.

ΑΜΦΙΕΡΓΟΣ. Inutilis; de ſolo ſationi inepto præ humore. de C. Pl. iii.

ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ῥιζων. *Hort.* "the uncovering the roots." de C. Pl. iii.

ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΙΣ. Exhalatio.

ΑΝΑΛΟΓΟΝ. adv. Pari ratione, viii. 5.

ΑΝΑΚΛΑΣΙΣ. Actio circumvertendi, ανακλασις προς τον ἡλιον, i. 16.

ΑΝΑΚΑΥΛΟΣ. Caulis secundarius; οἱ του βολβου ανακαυλοι, i. 10.

ΑΝΑΣΤΗΜΑ. Incrementum sursum, vel altitudo plantæ, ix. 10.

ΑΝΑΤΡΕΠΩ. *Agric.* Solum everto: ανατρεπειν κυαμους, "to plough in the crop," viii. 9.

ΑΝΔΗΡΟΙ οἱ τειχων. Propugnacula, "the ramparts," vii. 14.

ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ Inefficiens, ix. 17.

ΑΝΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine incremento. de C. Pl. iv.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΝ. 1. Planta. 2. Pericarpium in Liliaceis, vii. 12.

ΑΝΘΗΛΗ. Panicula *Bot.* de Arundine; Cypero, *Papyro*, &c. iv. 11, 12.

ΑΝΘΗΡΑ τα. Tempora florendi. de C. Pl. iii.

ΑΝΘΙΚΩΣ. adv. ab ανθος, viii. 9.

ΑΝΘΡΑΞ. Carbo lignarius, "charcoal." Antiqui artem carbonandi apprime callebant, v. 10.

ΑΝΘΩΔΕΣ ανθος. Flos compositus, *Bot.*

ΑΝΙΜΑΩ. Aquam e puteo haurio, ἱμαντι, (fune coriario,) sc. machina quadam, iv. 17.

ΑΝΙΩΔΗΣ. Gustu ingratus, vel odore. de C. Pl. vi.

ΑΝΟΖΟΣ. Vid. οζος.

ΑΝΤΙΔΙΗΡΗΜΙΝΟΣ. Separatus a se invicem. Plantæ αντιδιηρημεναι καθ' ἑκαστον (quæ sub genere communi specialiter discriminantur.)

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΩ. 1. Succedo. 2. Sustento.

ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ. Fulcrum.

ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΩ. Pono vice alicujus, ix. 9.

ΑΝΤΩΘΕΩ. Vi elastica repello. N. B. Opp. ενδιδοναι, recedere, v.

ΑΝΩ καθαιρειν. Vomitum excitare, ix. 10.

ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ αἱ αερος. Vicissitudines aeris, iii.

ΑΞΑΡΙΚΟΙ. Granaria.

ΑΠΑΛΛΑΤΤΩ. Eneco, ix. 15.

ΑΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. Vid. Παραβλαστος.

ΑΠΕΜΦΕΡΗΣ. Dissimilis. Vid. Εμφερης, vii. 8. p.

ΑΠΕΡΑΣΙΣ. Imperfectio. de C. Pl. i.

ΑΠΕΡΥΣΙΒΟΩ. Rubiginem genero. de C. Pl. v.

ΑΠΕΡΙΤΤΩΤΟΣ. Vid. Περιττωμα. de C. Pl. vi.

ΑΠΕΥΚΟΣ. Non resinosus, iii.

ΑΠΕΧΟΜΕΝΟΙ οἱ παρ Ινδοις. Brachmani, iv. 5.

ΑΠΗΡΩΤΟΣ. Non mutilatus. de ligno. de C. Pl. iii.

ʽΑΠΛΟΣ. Simplex. ἁπλον ανθος, an de ſtructura monopetala, vel de flore concolore? Alibi ἁπλον τοις ειδεσι.

ΑΠΙΚΜΑΩ. Exſicco, humorem (ικμαδα) abſtergo. de C. Pl. iv.

ΑΠΟΚΑΥΛΟΣ. Non regerminans? ut Abies, &c.

ΑΠΟΚΛΙΝΩ. Deorſum tendo, vi. 2.

ΑΠΟΚΙΤΤΟΟΜΑΙ. Habitum hederæ amitto: ſc. reſpectu formæ foliorum.

ΑΠΟΚΛΥΖΩ. Aquam copioſe perſundo.

ΑΠΟΛΗΨΙΣ. Abſorptio. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΛΟΧΜΟΩΜΑΙ. Fruticeſco, vi. 6.

ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ. Secernor; όταν αποκριθη το ύδατωδις. de C. Pl. vi.

ΑΠΟΜΑΓΜΑΤΑ δακτυλιων, "the paring of the nails." de C. Pl. vi.

ΑΠΟΡΙΑΙ αἰ. Quæſtiones ſolvendæ. "Querе's." de C. Pl. iv.

ΑΠΟΡΡΟΗ ανθων. "A blight:" item απ. βλαςησεως. de C. Pl. v.

ΑΠΟΠΡΕΜΝΟΣ. Vid. Πρεμνος, ii. 7. ramus minor?

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ αἰ. *Hort.* Intervalla. de C. Pl. iii.

ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΟΩ. } De uvis
ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΟΟΜΑΙ. } arefactis in arbore. de C. Pl. ii. Vid. Αςαφις.

ΑΠΟΣΤΙΦΩ. Condenſo. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΤΙΚΤΩ. Demo. Fructum amitto. de C. Pl. v.

ΑΠΟΤΙΣ γη. Ubi aqua deficit. de C. Pl. ii.

ΑΠΟΦΥΣΙΣ. Aliquod adnatum extus. αποφυσεις καυλων in Carduis, (pedunculi foliorum decurrentes, amplexicaules *Bot.*) Vid. ʽΥποφυσεις.

ΑΠΟΧΥΣΙΣ. Effluvium, vel jactura ſucci in plantis, όταν ὁ Σκωληξ εσθιει τον καλαμον του Πυρου, εκβιαζεται την αποχυσιν, viii. 10.

ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ αἰ, αμπελου. *Hort.* "the thinning out the branches."

ΑΠΥΡΗΝΟΣ. Vid. Πυρην.

ΑΡΑΧΝΙΟΝ. Morbus Oleæ proprius. N. B. Nidus forſan animalculi cujuſdam. textorii. de C. Pl. v.

ΑΡΓΙΛΟΣ. Argilla, guſtu amara. de C. Pl. vi.

ΑΡΓΟΣ. Crudus, ix. 4. de terra, incultus, "fallow" Angl.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ὡς αριθμος, Prov. de magno numero, vii. 2.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Arcturus. Stella primæ magn. Sideris Arctophylacis vel Bootis: ſc. in cauda Urſi majoris. N. B. Tempora anni notantur ortu et occaſu hujus ſtellæ, utpote

et Caniculæ et Pleiadum. μετ' Αρκτουρον, μετα Κυνα. Accuratiorem qui velit hujus rei notitiam, adeat Gemini Obſervationes Aſtronomicas, vel Calendarium Theophraſti Hiſt. Plant. accommodatum in Opere miſcellaneo[a], cujus mentionem feci.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ. Inter ſegetes creſcens, ſativa planta, vii. 7. et paſſim.

ΑΡΟΤΟΙ. Tempora ſeminandi. N. B. Τρεις ὡραι του σπορου apud Theophraſt.

1. περι Πλειαδος δυσιν, (m. Octobri.)

2. Ηρος αρχομενου, (m. Martio.)

3. Αροτος θερινος, (m. Julio,) viii. 1.

ΑΡΡΑΓΗΣ. Compactus, ſine rimis vel fiſſuris. de ligno, v. 5.

ΑΡΡΗΝ. Mas. N. B. Plantæ a Theophraſto in αρρενας et θηλειας quandoque dividuntur; nulla differentia ſexuali: *v. g.* Ελατη, Κρανεια. Spec. robuſtior, et quæ tarde fructificat, αρρην vocatur, et contra, θηλεια. Sexualis diſtinctio occurrit in Φοινικι, et alibi, ii. 8.

ΑΡΤΙΟΣ. de plantis adultis et perfectis.

ΑΡΧΙΝΙΟΝ? Error textûs? v. Αραχνιον, iv.

ΑΡΧΗ. Principium vitæ, ii. 8. Hinc *Bot.* Corculum ſeminis, et plumula, viii. 1, 2. Vid. deſc. germinationis ſeminum diverſorum, viii. 1.

ΑΡΩΜΑΤΑ. Odores antiquorum. Catalogum odorum antiquitus in uſu εν μυροις ſiſto. 1. Κασια. 2. Κινναμωμον. (Vid. Tab. Syſt.) 3. Καρδαμωμον. 4. Ναρδος. 5. Ναιρον. 6. Βαλσαμον. 7. Ασπαλαθον. 8. Στυραξ. 9. Ιρις. 10. Ναρτη? 11. Καστωρ. 12. Πανακες. 13. Κροκος. 14. Σμυρνη. 15. Κυπειρος. 16. Σχινος. 17. Καλαμος. 18. Αμαρακος. 19. Λωτος. 20. Ανησον, ix. 7.

ΑΣΠΙΣ. Clypeus, olim ex viminibus ſalignis; ut et ex ligno ejuſdem arboris, v. 8.

ΑΣΤΑΦΙΣ. Uva paſſa, " a raiſin." v. p. 44.

ΑΣΤΡΑΒΗΣ. Non tortuoſus, ξυλον αστραβες, " ſtrait-grained wood," iii. 10.

ΑΣΤΡΑΒΕΩ. id.

ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΤΟΣ. } Plantarum injuria ex cœli intemperie, olim ſideribus attributa. de C. Pl. v.
ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΣΙΑ. }

ΑΣΤΡΟΝ το. Sirius, Canicula: περι το αστρον, " the Dog-days," ii. 7. Plantæ dicuntur ακολουθειν τοις αστροις,

[a] G. Falconer, M. D. Vid. Præf. operis.

(tempora obſervare in germinando,) vii. 14.

ΑΣΦΑΡΑΓΙΑ. "An aſparagus bed," vi. 4.

ΑΤΕΡΑΜΝΟΣ. Vid. Τεραμων.

ΑΥΛΩΝΙΣΚΟΣ. Dim. ab αυλων. Vallis, ix. 7.

ΑΥΣΤΗΡΟΣ. Aſtringens: ſucci plantarum denominantur αυϛηροι, γλυκεις, οξεις, reſpectu guſtûs. Ang. "rough."

ΑΥΧΜΑΙ αἱ. "The Droughts."

ΑΥΧΜΑΙΟΣ. Æſtivus; εργα αυχμαια. de C. Pl. iii.

ΑΥΧΜΗΡΟΣ. De odore; folia Salviæ ηττον αυχμηρα. V. Βαρυς.

ΑΦΑΝΕΣ. adv. Occulto, ix. 12.

ΑΦΑΝΕΣ το. Vapor, gas, ib.

ΑΦΕΛΚΟΩ. } Penetro, perforo? ix. 12.
ΑΦΕΛΚΟΟΜΑΙ. } ſanor. de C. Pl. v.

ΑΦΟΡΟΣ. Sterilis. de C. Pl. iii.

ΑΦΥΛΛΟΣ. De flore monopetalo uſurpatur.

ΑΧΡΟΥΣΤΕΡΟΣ. Minus coloratus. Vid. χροομαι, κεχρωσμενος.

ΑΧΥΡΟΝ. 1. Palea, gluma, *Bot.* αχυρον πυρινον. a κριθινον, viii. 1. 2. Siliqua Fabæ. de C. Pl. iv.

ΑΩΡΕΙΑΙ. Tempora minus propitia, "bad ſeaſons." de C. Pl. v.

B.

ΒΑΛΑΝΟΣ ἡ. Nux arboris βαλανου. Vid. Tab. Syſt. p. 11. et Μυροβαλανον.

ΒΑΛΑΝΗΡΟΣ. Glandifer.

ΒΑΛΛΩ. Germino, ix. 22.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ τα. Nuces Juglandis.

ΒΑΛΣΑΜΟΝ το. "Balſam of Mecca or Tolu," (vid. p. 25.) ix. 7.

ΒΑΦΗ χαλυβος. Acies ferri, cujus manipulatio antiquis haud ignota, v. 4.

ΒΕΧΟΣ. Inſtrumentum ruſticum. de C. Pl. iv.

ΒΗΜΑ. Menſura, Paſſus, "a pace."

ΒΙΟΙ φυτων. 1. ſtationes, L. i. 7, 23. 2. effectus ſoli, aëris, &c. reſpectu ſanitatis et durationis vitæ in arboribus, iv. 1, 13, 14.

ΒΛΑΣΤΟΣ. Surculus primus ex radice, i. 5. παραβλαϛος, ſurculus ſecundarius ex ramis.

ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ. Prima germinatio. Vid. Calendarium Βλαϛησιων, iii.

ΒΛΑΣΤΟΛΟΓΙΑ. Pampinatio in vite. N. B. Tres αμπελουργιαι. 1. τομη. 2. διακαθαρσις. 3. βλαϛολογια. 1. amputatio generalis hyeme. 2. amputatio ſurculi teneri. 3. avulſio gemmarum ope manuum, &c.

ΒΛΟΣΥΡΟΣ. 1. Fæculentus. πιττα βλοσυροτερα. 2. de ſurculis; turgidus, ὁσαι λιμναιαι, βλοσυροτεραι. de C. Pl. v.

ΒΟΛΒΙΤΟΣ. Fimus bubulus, v. 7.

ΒΟΛΒΟΣ. Bulbus plantæ.

ΒΟΛΗ. Lapſus uvarum immaturus. de C. Pl. i.

ΒΟΡΒΟΡΩΔΗΣ. Fæce vel terra mixtus.

ΒΟΤΑΝΙΖΩ. Herbas noxias evello, "to weed." de C. Pl. iii.

ΒΟΤΡΥΣ. Racemus uvarum, item racemus quivis, vel collectio baccarum vel florum. Βοτρυς Πτελεας, fructif. iii. 6. Generatur βοτρυς εν αμπελοις εκ μητρας· κληματα εκ του περιεχοντος. de C. Pl. iii.

ΒΟΤΡΥΟΝ. id. Βοτρυον της Δαφνης, iii.

ΒΟΤΡΥΧΙΟΝ. dim. de C. Pl. iii.

ΒΟΤΡΥΟΕΙΔΗΣ. απο μιας κορυνης, και πολλων μισχων. de umbella floris. *Bot.* iii. 12.

ΒΡΑΓΧΙΟΣ. Branchiæ, "the gills of fiſhes," iii. 9.

ΒΡΑΔΥΣ εις τροφην. Concoctu difficilis. opp. εγγυτερω της τροφης. de C. Pl. iv.

ΒΡΑΧΕΙΣ. Madefactus, a βρεχω, "ſteeped in water," v.

ΒΡΥΟΝ. 1. Amentum Quercûs, &c. a βρυω, abundo, iii. 6. 2. Thyrſus florum, ut Thymi Dioſc.

ΒΡΥΣΟΔΕΨΙΚΗ. per tranſp. pro βυρσοδεψικη, Ars coriaria.

ΒΡΥΤΟΝ. Cereviſiæ ſp. βρυτ. απο κριθων, "Ale." N. B. An ζηθος ſpec. diverſ. vel ſtatu effervefcenti? Vid.

Γ.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Gummi Bubonis, *Galbani* L.

ΓΑΛΕΑΓΡΑ. Tendicula captandis feris. ex ligno duro Πτελεας, &c. "a hutch trap." v. 8.

ΓΑΝΩΔΗΣ. Fertilis: γη γανωδης, vi.

ΓΕΛΓΙΣ. Diviſio capituli Allii; "a clove of garlick."

ΓΕΛΓΙΟΟΜΑΙ. id.

ΓΕΝΕΣΙΣ. Propagatio plantarum, i. 4.

ΓΕΝΕΣΕΙΣ αἱ. Proventus arborum. de C. Pl. iv.

ΓΕΝΝΩΜΕΝΑ μερη τα. In arboribus partes fructiferæ. *Mold.* i. 4.

ΓΕΝΟΣ, apud Theophr. ſpeciem vel varietatem indicat, paſſ.

ΓΕΡΑΝΔΡΥΑ τα. Annoſæ arbores. Quercus nodoſæ ætate, iii. 12.

ΓΕΥΟΜΑΙ. Guſtu experimentum facere, ix. 2.

ΓΕΥΣΙΣ. id. item morbus ſimilis αφης.

ΓΙΓΑΡΤΟΝ. Acinus uvæ: εξαιρουμενης της μητρας αγιγαρτοι. de C. Pl. v.

ΓΛΙΣΧΡΟΣ. Tenax. de ligno, ὁσα γλισχρα ευκαμπη, v. 6.

de C. Pl. iv. de fructu, τα γλισχρα πλειονος πεψεως δειται. de C. Pl. iv. differentia inter γλισχρος et λιπαρος, priore ex humido, posteriore ex oleoso? lign. Platani exemplum γλισχροτητος peculiare, v. 4.

ΓΛΙΣΧΡΟΤΗΣ των καρπων. id. de C. Pl. iv.

ΓΛΟΙΟΣ. Debilis, cariosus: opp. τῳ ισχυρῳ. de lignis, v. 5.

ΓΛΥΚΥΣΤΡΥΦΝΟΣ. Astringens cum dulcedine. Vid. Στρυφνος, ix. 22.

ΓΛΩΤΤΑ. Lingula in fistulis, "the tongue-piece," iv. 12.

ΓΟΓΓΡΟΣ. Morbus in truncis et ramis majoribus: forsan cancri spec. Radix videtur ignota, i. 12.

ΓΟΝΥ. Nodus in caulibus gramineis, &c. item flexura.

ΓΟΝΑΤΩΔΗΣ. id. i. 6.

ΓΡΑΜΜΩΔΗΣ. Linearis, *Bot.* γραμμωδεις μισχοι (tenues) σπερματα γραμμωδη, iv. 13.

ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Nudo semine, de seminibus umbelliferarum; minime Gymnospus Linn.

ΓΥΡΟΙ. Foveæ circulares arboribus plantandis destinatæ. de C. Pl. iii.

ΓΥΡΩΜΑΤΑ. Venarum circumvolutiones, vel gyri in ligno; præcipue ad nodos, v. 6.

ΓΩΝΙΑ. 1. Eminentia acuta, "a ridge," folium κυπειρου (vid.) desc. ὡς γωνιοφυλλος· εκ δυοιν συνθετον, και το μεσον οιον τροπις, (carina,) i. 16. 2. angulus: sic de folio Hederæ, γωνιοφυλλος· ουδεν σχημα περικαρπιου γωνιας εχει? i. 18.

ΓΩΝΙΟΕΙΔΗΣ. id.

Δ.

ΔΑΔΟΟΜΑΙ. de pice extrahenda. de C. Pl. v. Vid. δαϊς, δας, tæda.

ΔΑΔΟΦΟΡΕΩ. Picem genero, ix. 2.

ΔΑΔΩΔΗΣ et ενδαδος. de ligno et radicibus, Gen. Pinus L. resinosum, ib.

ΔΑΙΣ, δας. Lignum fissile Pinus; εξαιρουμενης της δαδος, και καιομενης, ἡ της πιττας εκροη, ix. 2. Vid. manipulationem ibi exacte descriptam.

ΔΑΚΡΥΑ τα. Resina in globulos concreta, ii. 16. vi. gummi etiam sponte fluens.

ΔΑΚΕΤΑ τα. Morsus venenosi Viperæ &c. ix. 21.

ΔΑΦΝΙΣ. Lauri bacca; drupa, *Bot.*

ΔΑΦΝΩΔΗΣ. Sature viridis. N. B. Tres occurrunt coloris viridis varietates; Angl. "shades of green." 1. δαφνωδης. 2. πρασωδης. 3. χλοερος. Vid. ix. 11.

ΔΕΙΝΟΣ. Efficax, "strong," of

χυλοι των ῥιζων δεινοτεροι του των φυτων, i. 11.

ΔΕΝΔΡΑ τα. Vegetabilium divisio quadruplex. 1. Δενδρα. 2. Φρυγανικα. 3. Θαμνοι. 4. Ποωδεις. N. B. Distinctio inter 2dam et 3tiam haud satis constat: an θαμνοι idem quod επετειοι, perennes? Alibi λοχμωδης occurrit, de calamo, &c. Frutex paludosus? (vid.)

ΔΕΝΔΡΑΔΗΣ. syn. δενδρωδης. de C. Pl. iii.

ΔΕΝΔΡΥΦΙΟΝ. Arbusculum. Dim. Corallinis applicatur, iv. 8.

ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ. Proxime succedens; εν τῳ δεχομενῳ ετει, και τῳ τριτῳ, vii. 1.

ΔΗΚΤΙΚΟΣ. Pungens: de succo, vi.

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ. Cerealis. δημητρειος καρπος. de C. Pl. iii.

ΔΙΑΔΥΝΑΜΑΙ. Valde efficio, iii.

ΔΙΑΚΑΘΑΡΣΙΣ. Operatio, horticulturæ. Vid. Βλαστολογια.

ΔΙΑΚΟΡΗΣ. Saturus valde, i.

ΔΙΑΚΤΟΡΙΑ. Cantus vehementior, vel acutior. Hinc Mercurius apud Homerum διακτορος Αργειφοντης. Tibiæ γλωττα συμμυει τῳ χρονῳ, (per ætatem contrahitur,) et inde χρησιμος προς την διακτοριαν. N. B. Forf. ἡ διακτορια in scena antiqua cantus prælu- dens, Angl. "overture," iv. 12.

ΔΙΑΠΑΤΤΟΜΕΝΟΣ. Conculcatus, viii. 11.

ΔΙΑΠΛΗΣ. Saturè plenus. de C. Pl. ii.

ΔΙΑΠΙΑΙΝΟΜΑΙ. Saturor ex omni parte. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΠΝΟΗ. Evaporatio. Vid. Διατμιζω. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΠΤΥΣΣΩ. Expando. κοπτοντες εν τῳ ὁλμῳ, και διαπτυσαντες λεπτα, και επιπαττοντες εφ' ὑδωρ. Methodus præparandi Cicutam, ix. 17.

ΔΙΑΠΥΡΟΣ. Fervidè candens, "red hot," iv. 8.

ΔΙΑΡΡΕΩ. Late evagor. de Nilo. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΣΤΟΛΗ. Intervallum, *hort.* de C. Pl. iii.

ΔΙΑΤΜΙΖΩ. Evaporare facio. τα μεν χυλων εκκρινει, ἡ διατμιζει· τα δε παχυνει και συνιστησι. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΦΕΡΟΝ το. Excellens quoddam, ix. 14.

ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ. Eximie.

ΔΙΑΦΟΡΗ. Excellentia, iv. 4.

ΔΙΑΦΟΡΟΝ. id. si non error textus.

ΔΙΑΦΥΣΕΙΣ αἱ. Internodia caulina, *Bot.* iv. 10.

ΔΙΑΦΥΩ. *act.* Penetro. de C. Pl. v.

ΔΙΑΦΥΩ. *pass.* Minus apte, vel loco alieno nascor. de C. Pl. iii.

ΔΙΑΦΩΝΕΩ. Discrepo, iii. 10.

ΔΙΑΧΕΩ. de diffusione per coctionem, ix. 15. opp. τῳ συναγειν, "to coagulate."

ΔΙΑΧΥΣΙΣ. Diffusio æqualis: de coctione fabarum et pisorum, "when they are reduced to a smooth paste."

ΔΙΕΝΝΑΤΗΡΙΣ. Novennium, iv. 12.

ΔΙΕΝΝΑΕΤΗΡΗΣ. Novennis.

ΔΙΕΥΡΥΝΟ. Dilato. de C. Pl. v.

ΔΙΗΘΗΣΙΣ. Percolatio, ib.

ΔΙΗΚΩΝ. Quod transversim pervadit? εν τῳ διηκοντι της γιλγιδος. Vid. de C. Pl. vi.

ΔΙΗΡΘΡΩΜΕΝΟΣ. Nodos transiens, permeans.

ΔΙΘΥΡΟΙ. Januæ bivalves, viii. 2.

ΔΙΚΑΡΠΟΣ. Fructus duorum annorum simul gerens. de arb. quibusdam, iii. 6.

ΔΙΚΕΛΛΑ. Instrumentum rusticum: ligo biceps. Angl. "a double hoe." de C. Pl. iii.

ΔΙΚΡΑΝΗΣ. Biceps, cacumine fisso, ix. 12.

ΔΙΜΕΡΗΣ. Bi-partitus, viii. 2.

ΔΙΞΟΟΣ. Duplici venarum cursu. Vid. μονοξοος et κτηδων, v. 2.

ΔΙΠΑΛΑΙΣΤΗΣ. Duas palmas altus, iv. 12.

ΔΙΦΟΡΟΣ. Vid. δικαρπος.

ΔΙΩΚΩ. simpl. (pro διωκω βιον) Vivo. προς ἑτερῳ διωκει, de pl. scandente, *Bot.* de C. Pl. ii.

ΔΟΡΑ. Cortex arboris, ix. 2.

ΔΟΧΟΣ. Facile suscipiens: δοχος ουσα ὑγρου ι θερμου. de C. Pl. ii.

ΔΡΙΜΥΣ. Acris, pungens. de odore, vi. 7.

ΔΡΟΣΟΒΟΛΟΣ. Roridus: ubi rores abundant. δροσοβολαι χωραι. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΠΕΤΗΣ. Vid. δρυπεψ. de C. Pl. ii.

ΔΡΥΠΕΨ. 1. Fructus maturus et deciduus, *pass.* N. B. Δρυς pro quavis arbore. 2. Bacca Oleæ, iv. 17.

ΔΡΥΠΙΣ. Fructus quidam. (Hinc forsan Drupa Linn.) ακανος, δρυπις.

ΔΡΥΦΡΑΚΤΟΝ. Ager sepibus cinctus? iv. 5.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ αἱ. Vires plantarum.

ΔΥΣΜΟΙ οἱ. Occidens, ανεμος απο δυσμων, κλαυθμος dict. (forf. καυθμος,) "the Sirocco." de C. Pl. v.

ΔΥΣΡΙΓΟΣ. Frigoris impatiens, vi. 7.

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ. Aliquod ingratum respectu saporis. de C. Pl. vi.

E.

ΕΓΓΕΙΟΣ. de terra; opp. τῃ ενυδρῳ, iv. 7.

ΕΓΓΥΣ προς. Proxime accedens ad: κατ' ευωδιαν ουκ εγγυς προς εκεινον, "not near so fragrant as." de C. Pl. vi.

ΕΓΚΕΝΤΡΙΖΩ. Perforo: dicitur de actione succum vel resinam extrahendi e truncis arborum, ii. 3.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΟΜΑΙ. Ramis luxurio. de C. Pl. iii.

ΕΓΧΥΛΟΣ. Succulentus; opp. τῳ δυσχυλῳ. de C. Pl. vi.

ΕΔΑΦΗ τα. Varietates soli; Agricult. de C. Pl. ii.

ἘΔΑΦΙΕΩ. Solum complano, ix. 4.

ἙΔΡΑ. Εκπιπτειν την ἑδραν. de prolapsu ani, ix. 9.

ΕΙΛΗΘΥΙΑ. Σφαιρωδης τι, vel forsan pistilliforme in trunco Abietis: in magicis usitatur. de C. Pl. v.

ἙΚΑΤΕΡΟΙ. Utrique; (dicitur de duobus paribus.)

ΕΚΑΤΕΡΩΤΗΣ? Qualitas; forsan error. de C. Pl. vi. vid. supr.

ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΙΣ. Secunda germinatio; "Michaelmas shoot." iii. 7.

ΕΚΒΛΟΣΥΡΟΣ. Vid. βλοσυρος.

ΕΚΘΑΜΝΕΟΜΑΙ. Fruticesco.

ΕΚΙΔΟΝ. Oblique, iii. 13.

ΕΚΚΟΛΑΠΤΩ. Tundendo evacuo, ωον εκκεκολαμμενον, iii. 16.

ΕΚΚΡΙΝΩ. Secerno.
ΕΚΚΡΙΝΟΜΑΙ. Secernor.
ΕΚΚΡΙΤΙΚΟΝ το. id.
} de C. Pl. v. vi,

ΕΚΛΥΤΟΣ. Languidus: succo privatus. de C. Pl. iv.

ΕΚΜΑΣΣΟΜΑΙ. Abstergor, aridus fio. de C. Pl. v.

ΕΚΠΑΠΠΟΟΜΑΙ. In pappum abeo. *Bot.* iii. 18.

ΕΚΠΛΗΞΙΣ. De arboribus; Sideratio. Vid. αστροβολησις, ib.

ΕΚΠΝΕΥΣΙΣ φλεγμονων. Exhalationes ulcerum, i. e. ad virus extrahendum, ix. 10.

ΕΚΣΤΑΣΙΣ. Degeneratio, ab εξιστημι, infr.

ΕΚΤΗΚΩ. Emacero, ix. 3.

ΕΚΤΟΠΟΣ. Climati proprius: χειμων εκτοπος εν Θρακη. de C. Pl. vi. N. B. Fors. legendum εντοπος.

ΕΚΦΥΣΑΩ. Tumesco. de C. Pl. iii.

ΕΚΦΥΣΗ ἡ. Tumor. de C. Pl. iii.

ΕΚΦΥΣΙΣ. Degeneratio plantæ. de C. Pl.

ΕΚΧΥΛΟΣ. Subtilis, tenuis: de succo. de C. Pl. vi.

ΕΛΑΙΟΝ. N. B. Usus Olei occurrit in maturandis Ficubus. de C. Pl. ii. item ad enecandas radices arborum, ib.

ἙΛΙΞ. Cirrhus; *Bot.* i. 3.

ἘΛΚΗΘΡΟΝ. Buris aratri, vi.

ἙΛΚΟΜΑΙ. Distorqueor, "to be warped." de ligno, v. 7.

ἙΛΚΟΟΜΑΙ. Perforor. N. B. Ἑλκος foramen in trunco Abietis, per quod resina fluit, iv. 19.

ΕΛΛΟΒΟΣ. Siliquosus, viii. 1.

ἙΛΜΙΣ πλατεια. Tænia lata: Angl. "tape-worm," ix.

ΕΜΒΙΩΣΑΣ. Vitam pertrahens, vi. 7.

ΕΜΒΟΘΡΟΝ. ad... plane? in

puteo. ουκ εμβοθρον (τιθεασι) αλλα τας σχιζας "the billets," ορθας προς αλληλας, (sursum inclinantes,) ix. 3. sed forsan textus corruptus.

ΕΜΒΟΛΗΤΟΣ. Gleba involutus. de C. Pl. v.

ΕΜΒΟΛΟΣ. Navis rostrum æratum, vi. 8. ab εμβαλλω, ex modo pugnæ navalis.

ΕΜΒΡΥΟΝ, in plantis το μελλον βλαστειν. N. B. Vox βρυον (amentum *Bot.*) de racemo flosculorum fugacium. de C. Pl. i.

ΕΜΜΗΤΡΟΣ. Medullam habens, i. 9.

ΕΜΦΥΤΕΙΑ. Insitio, *horticult.* "grafting." de C. Pl. i. vid. ενοφθαλμισμος.

ΕΜΦΥΤΕΥΩ. ii. 1.

ΕΝΑΕΝΑ τα. Annua: διενα, biennia.

ΕΝΔΑΔΟΣ. Pice abundans, ix. 4.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ. imperf. ουκ ενδεχεται λαβειν, non admittit convenienter, iv.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ το, quod convenit, ii. ib.

ΕΝΔΙΔΩΜΙ. Cedo: κλιναρια ενδιδοντα, an lectuli elastici?

ΕΝΕΙΛΕΩ. Obvolvo? ενειλαντες εν γλυκει, ix. 9.

ΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΟΣ. De arbore cujus fructus annum durat in arbore; aliter δικαρπος.

ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ. Insitio gemmæ (οφθαλμου) in arboribus; Ang. "budding." Vid. εμφυτεια. de C. Pl. i. N. B. Ex descr. apud Theophr. l. c. εμφυτεια videtur insitio per incisionem, και ξυλου σχισιν, "cleft-grafting;" ενοφθαλμισμος insitio, per relaxationem corticis, "rind-grafting."

ΕΝΤΑΥΘΑ. Hac de causa, *pass.*

ΕΝΤΕΡΙΩΝΗ. Pars interior, sive medulla ligni, iii. 8.

ΕΝΤΟΜΑ τα. Insecta: hinc εντομολογια. de C. Pl. vi.

ΕΝΤΟΜΗ. Folii incisura, vel divisio in lobos, i. 16.

ΕΝΥΜΕΝΟΣΠΕΡΜΑ. Hymenosperma L. semine membrana incluso, vel pericarpio laxo, viii. 7.

ΕΞΑΔΥΝΑΤΕΩ. Elanguesco, iv.

ΕΞΑΙΓΕΙΡΟΜΑΙ. De Populo, (Αιγειρω) habitum mutare. de C. Pl. ii.

ΕΞΑΜΒΛΩΣΙΣ. Abortio, ix. 9.

ΕΞΑΝΘΗΣΙΣ. Deflorescentia.

ΕΞΕΛΑΙΟΟΜΑΙ. Super saturatus sum Oleo: unde effluvium fit; de C. Pl. vi.

ΕΞΕΠΙΤΗΔΕΣ. Consulto. de C. Pl. v.

ΕΞΕΣΜΕΝΟΣ. Rasus, .. ξεω, ib. iii.

ΕΞΙΚΜΑΩ. Humorem perdo, vii. 5.

ΕΞΙΝΟΩ? Evacuo.

ΕΞΙΣΤΗΜΙ. Degenero. de C. Pl. v.

ΕΞΥΒΡΙΖΩ. Luxurio. de arb. ii.

ΕΠΑΚΑΝΘΙΖΩ. Leviter ſpinoſus ſum, ix. 4.

ΕΠΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule ſcandenti, *Bot.* iii. 8.

ΕΠΑΜΑΟΜΑΙ. Accumulo, iv. 15.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ. Recupero. de C. Pl. iii.

ΕΠΑΦΗΣ. Tactu ſenſibilis.

ΕΠΕΣΘΙΩ. Edo poſt aliquod, inſuper edo.

ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Planta caule caduco, radice perenni, Angl. "a perennial plant," vii. 7.

ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΕΩ. id.

ΕΠΕΧΩ. Duro, continuo. de C. Pl. iii.

ΕΠΙΒΑΛΛΩ. Attribuo. καθ' ὅσον ἐπιβαλλει τοις γενεσιν, viii. 5.

ΕΠΙΒΛΑΣΤΑΝΕΙ. De germinatione Autumnali, vii. 2.

ΕΠΙΒΡΟΧΟΣ. Madidus. γη ἐπιβροχος, viii. 6.

ΕΠΙΓΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule proſtrato. *Bot.*

ΕΠΙΓΕΙΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis radicalibus, *Bot.* vii.

ΕΠΙΔΟΞΑΖΟΜΕΝΟΣ. Suſpicatus; per conjecturam. de C. Pl. vi.

ΕΠΙΔΟΣΙΣ. Incrementum, proventus, i. 5. de C. Pl. iii.

ΕΠΙΘΕΤΑ τα. Commentitia. τα ἐπιθετα, και πορρωθεν, "far fetched, and with additions," ix. 9.

ΕΠΙΚΑΥΛΟΦΥΛΛΟΣ. Folioſo caule, vii.

ΕΠΙΚΑΩ. Inuro. N. B. Vox καιω uſitatur de effectu frigoris, utpote et caloris; item de morſu venenoſo pecorum. de G. Pl. v.

ΕΠΙΚΗΡΟΣ. Morbo obnoxius. Angl. "tender," vi. 7.

ΕΠΙΚΝΙΖΩ. Unguibus vello, "to nip off." de C. Pl. iii.

ΕΠΙΚΟΠΗ. Succiſio, decacuminatio. de C. Pl. v.

ΕΠΙΚΥΙΣΚΟΜΑΙ. Actus ſuperfœtationis; utpote in leporibus. de C. Pl. i.

ΕΠΙΚΥΠΤΩ. Declinare facio, "to weigh down." de C. Pl. iii.

ΕΠΙΝΕΩ. Supernato, ut lignum in aqua, vi. 3.

ΕΠΙΞΥΝΔΕΩ. Strictius alligo. de C. Pl. ii.

ΕΠΙΠΑΤΤΩ ἐφ' ὑδωρ. Senſim in aqua tractando, manibus miſcere, ix. 17.

ΕΠΙΠΟΛΑΖΩ. In ſuperficie fluito.

ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ, ab ἐπιπολης, ſuperficialis; de radicibus opp. βαθει.

ΕΠΙΡΡΥΤΟΣ. Inundatus: γη ἐπιρρυτος, *Agric.* "flooded ground."

ΕΠΙΣΙΝΗΣ. Noxius.

ΕΠΙΣΠΑΣΙΣ. Attractio. de C. Pl. v.

ΕΠΙΣΠΟΡΑ. Secunda ſatio. ἐπισπορα τα de plantis quæ ſæpius in anno ſeruntur, vii. 1.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ. Continuatio habitûs: opp. εκςασει. de C. Pl. v.

ΕΠΙΣΥΝΑΓΚΑΙ. Valles quædam Asiæ. de C. Pl. v.

ΕΠΙΣΧΙΖΩΝ. Ab imo divisus. de C. Pl. v. N. B. Δενδρα επισχιζοντα opp. μονοςελεχεσι.

ΕΠΙΤΑΣΙΣ. Impulsus. de C. Pl. ii.

ΕΠΙΦΑΝΗΣ. Violens. ανηρ θολερος και επιφανης. de C. Pl. v. sic χειμων επιφανεςατος. Polyb.

ΕΠΙΦΟΡΑ. Proventus secundus. de C. Pl. v.

ΕΠΙΧΡΟΙΣΙΣ. Levis coloratio, "a light staining." de C. Pl. ii.

ΕΠΟΥΛΟΣ. Vid. ουλος, iii. 10.

ΕΠΩΤΙΔΕΣ. Prominentiæ laterales utrinque ex puppi, ubi navis nomen inscribebatur. *Poll.* v. 7.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Manupilatio. ε. της πιττης, ix. 2.

ΕΡΕΨΙΜΟΣ. Ad tecta facienda. ξυλον ερεψιμον, "roof timber," v. 4.

ΕΡΙΝΟΝ το. Fructus Ficûs, *sylvestris*.

ΕΡΙΟΛΑΜΒΑΝΩ. Percolare ope lanæ; "to strain through wool," ix. 8.

ΕΡΥΣΙΒΗ. Robigo; morb. Fors. Uredo, Persoonii. Fungi species. de C. Pl. iii.

ΕΣΧΑΡΑ. Pars plana Πυρηας, (vid.) fovea circularis, ubi circumagitur το τερετριον ad accendendum ignem, v. 10.

ΕΣΧΑΤΕΥΟΝΤΑ τα. Apices ramorum, &c. de C. Pl. v.

ΕΤΟΣ φερει ουκ αρουρα. Adagium vetus: plus cælo quam terræ tribuendum, viii. 8.

ΕΥΑΤΜΩΤΟΣ. Volatilis. de C. Pl. ii.

ΕΥΑΥΡΟΣ. Bene situs, bene ventilatus, viii. 11.

ΕΥΑΦΗΣ. Tractabilis. γη ευαφης. de C. Pl. ii.

ΕΥΔΙΑΙΝΟΣ. τοπος κοιλος και ευδιαινος, "a well sheltered mild situation," iii. 4.

ΕΥΕΜΕΩ. Vomitum ciere sine dolore, ix. 11.

ΕΥΕΤΗΡΙΑ. Anni prosperitas, viii. 8.

ΕΥΗΚΩΣ. Facilis, pronus; ab ακουω. ευηκοτα προς μεταβολην. de C. Pl. ii.

ΕΥΘΥΠΟΡΕΩ. De arboribus, "to grow straight."

ΕΥΚΤΗΔΩΝ. Vid. κτηδων.

ΕΥΟΓΚΟΣ. Levis, portatu facilis, ix. 17.

ΕΥΟΔΕΩ. Luxurio, i. 9.

ΕΥΣΤΟΜΟΣ. Gratus palato, "relishing."

ΕΥΤΟΝΟΣ προς. Aptus ad. de C. Pl. v.

ΕΥΧΥΛΟΣ. Succulentus, viii. 10.

ΕΥΩΔΙΑ. Gratus odor. N. B. Γυπες aversantur odores; apibus etiam nocivi sunt; nec datur animal, homine excepto, ευωδια gaudens αυτης χαριν. de C. Pl. vi.

ΕΦΑΛΜΑ το. Morbus arb. ex nimio ſale? de C. Pl. v.

ΕΦΗΛΙΔΕΣ. Solis maculæ, "freckles," ix. 22.

ΕΦΗΜΕΡΟΝ φαρμακον. Venenum quod cito enecat (eodem die,) ix. 6.

ΕΧΙΝΟΣ. 1. Placentæ genus ex farina cruda. 2. morbus ex ejus uſu, de C. Pl. iv.

ΕΧΟΜΕΝΑ τα. Quæ ſuccedunt, i. 1.

ΕΩΜΕΝΟΣ. "Left to itſelf," vi. 6.

Z.

ΖΗΘΟΣ. Cereviſia (a ζεω ferveo, "to mantle." Αρχαι οινου φυσικως· ζηθου εκ τεχνης. de C. Pl. vi. N. B. An differentia inter ζηθον et βρυτον? Vid.

ΖΥΓΙΝΟΣ. Carpineus, v. 6.

H.

ΗΘΙΚΟΣ. Percolatus. οινοι ηθικοι. de C. Pl. vi.

ἩΛΟΣ. 1. Clavus; 2. Innatum quoddam in trunco Oleæ coni inſtar acuti? An Schlerotium, vel Hypoxylon? *Bot.* N. B. Semel vidi ſpecimen ex Portugallia, iv. 16.

ἩΛΙΟΣ εκνεφελος. (ſine nubibus) Obſtat aliquando arboribus, viii. 10.

ἩΜΕΡΟΥΝΤΕΣ οἱ. Qui terras incultas ſubigunt. de C. Pl. v.

ἩΜΕΡΩΜΑΤΑ τα. Animalia manſuefacta, pecora, ib.

ἩΜΙΒΡΑΧΗΣ. Sub-madidus. de C. Pl. iii.

ἩΜΙΗΛΟΣ. Sub-ſolanus, ib.

ΗΡΙΝΟΣ. id. q. ιρινος, ab ιρις, Iris, viii. 7.

Θ.

ΘΑΛΑΜΩΔΗΣ. Foraminoſus. N.B. Vox θαλαμος, apertura narium; λιθοι θαλαμωδεις (poroſi.) de C. Pl. vi.

ΘΑΛΕΙΑ. } 1. Ramulus tener
ΘΑΛΛΙΑ. } herbaceus. de C. Pl. v. 2. Frondeſcentia, vel frondoſus rami veſtitus.

ΘΑΜΝΟΙ. Plantarum diviſio. Vid. δενδρον.

ΘΕΡΜΟΣ συμφυτος. Calor innatus; vitalis Mold. i. 3. ξυλα θερμα. Vid. ξυλον, πυρεια.

ΘΗΛΥΣ. Vid. αρρην ſupr. N. B. Non ſemper de ſexu in Diœciis pl. N. B. Hinc Ελατης ſpec. θηλεια vocatur, i. e. minus robuſta. Alibi vox ut diſtinctio ſexualis occurrit.

ΘΗΡΙΔΙΑ. Animalcula.

ΘΟΛΕΡΟΣ. Turbidus. H. de differentia inter animalia et plantas dicitur όσω θολερωτε-

ρα και ψυχροτερα, (τα φυτα,) τοσουτον απεχειν του ζωα ειναι: forsan minus cocti.

ΘΟΛΟΕΙΔΗΣ. Cancellatus, clathratus. (Vid. Præfat. operis.) iii. 10.

ΘΟΡΟΣ. Piscis masculi lac seminale; "the milt." Ὁ αρρην ιχθυς επιρραινει τοις ωοις αποτικτομενοις τον θορον de C. Pl. ii.

ΘΡΑΥΟΜΑΙ. Lacero: de effectu salis in enecandis plantis. de C. Pl. vi.

ΘΡΙΟΝ. Folium ficulneum. de C. Pl. v.

ΘΥΣΑΝΟΙ. fimbriæ; filamentorum fasciculi, "a fringed edge," "tassels."

ΘΥΣΑΝΩΔΗΣ. Fimbriatus.

I.

ΙΔΙΟΣ. Peculiaris, extraordinarius, *pass.*

ΙΔΙΟΤΗΣ. supr.

ΙΘΜΟΣ. fors. diversus ab ιθματι? διεισιν ὡς ιθμος, (transit per aquam ut atomus?) ουκ εχον ᾡ στεγει, (non inveniens unde suspendatur.) de C. Pl. vi.

ΙΚΜΑΣ. Succus seminalis, vel simpliciter humor, vi. 4.

ΙΚΡΙΑ τα. Opera sculptilia in navibus; ornamenta lignea domuum. Συκαμινου ξυλον εις τα ικρια, και τας στεφανας, και ὁλως προς τον κοσμον, v. 7.

ΙΝΕΣ. 1. ξυλου. Fibræ. N.B. Libro imo. c. 3, 4. comparatio instituitur inter animalia et vegetabilia: ut in prioribus ινες και φλεβες, (arteriæ et venæ,) sic in posterioribus ὡσπερ ινες, &c. Ινες describuntur συνεχεις, σχιστοι, επιμηκεις (congesti, vel fasciculati; divisibiles; in longitudinem procurrentes;) απαραβλητοι, (non confusi inter sese) αβλαστοι, (non ramosi.) Congruunt hi cum canalibus capillaceis, vel lymphæductibus Grewii, Lewenhoek, aliorumque. Quod ad φλεβας, vel vasa spiralia, vid. φλεψ. 2. Vermes. Ascarides in corp. humano, ix. 14.

ΙΝΩΔΗΣ. supr.

ΙΟΣ το. Gas, vapor ex fermentatione. τοσουτον ιος ὑφισταται τῳ οινῳ σακκιζομενῳ, ὡστε καιεσθαι ὑπο των λυχνων. De C. Pl. vi.

ΙΟΥΛΟΣ. Iulus, amentum, *Bot.* iii. 6.

ἹΠΠΟΜΑΝΕΣ. Succus lethalis του Τιθυμαλλου, (vid. p. 12.) ix. 15.

ΙΣΟΠΟΔΙΑΙΟΝ. de triangulo æquilaterali. de C. Pl. vi.

ΙΣΧΑΣ. Fructus Απιου ισχαδος, ix. 10.

ΙΩΝΙΑ. Violetum; N. B. A Theophrasto aliquando Violæ planta; utpote ιον flos ejus, vi. 6.

K.

ΚΑΘΑΙΡΩ. *Pharm.* Purgo. κ. κατω, per alvum. κ. ανω, vomitum cieo.

ΚΑΘΑΣΤΩΣ ὁ. Oppoſitum aliquod. de C. Pl. iii.

ΚΑΘΥΓΡΟΣ. Sub-madidus, i. 7. opp. καταξηρῳ: forſ. intenſionem indicat.

ΚΑΜΠΗ. Larva, Linn. vid. Tab. Syſtematicam; ubi transformationes inſectorum accurate notantur a Theophraſto, ſc. Καμπη, Χρυσαλλις, Ψυχη, Larva, Pupa, Imago L. de C. Pl. v. N. B. Σκωληξ etiam Larva quandoque ὁς 'εις αλλο μεταβαλλει Ζωον πτηνον, vii. 12.

ΚΑΝΑ. pr. κανης. Caniſtrum, v. 8.

ΚΑΠΤΗΡ. } Corbis ſpec. vas
ΚΑΜΠΤΗΡ. } ex ligno flexili. de C. Pl. v.

ΚΑΠΝΙΟΣ. "Smoaky coloured;" "grey." Αμπελος καπνιος, vitis helvola, Columella. Varro de Re Ruſtica. Apud nos extat ſpec. "grey Frontignac" dicta, ii. 4.

ΚΑΡΔΙΑ ξυλου. Pars interna trunci dura: "the heart of wood." opp. τῳ περιειληφοτι, "the Alburnum," *Bot.*

ΚΑΡΚΙΝΟΟΜΑΙ. De ramis, et radicibus; implicor inſtar pedum cancri? "to tiller." *Agric.* i. 9. de C. Pl. i. 2.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Cancer, morbus arb. de C. Pl. i.

ΚΑΡΝΕΙΟΣ. Pila lanæ? iii. 16.

ΚΑΡΠΙΖΟΜΑΙ. Exhaurio, viii. 9.

ΚΑΡΥΗΡΟΣ. Nucifer, i. 16.

ΚΑΣΤΑΝΑΙΚΟΝ καρυον. Nux Caſtaneæ, iv. 10.

ΚΑΣΤΟΣ? Occurrit inter aromata, ix. 7. Forſ. legend. Κοςος. *Tab. Syſt.* p. 3.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ. Semino, viii. 5. 11.

ΚΑΤΑΒΟΡΟΣ. Edax: de ſterili ſolo, "hungry land." de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΔΕΩ. Incanto, vi. 2.

ΚΑΤΑΚΑΡΠΙΟΝ. Syn. περικαρπιου, iv. 11.

ΚΑΤΑΚΟΡΗΣ. Saturus; de colore, iv. 10.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Congruens. ουδεν καταλογον τουτων, το ανω προς το κατω, vii. 3.

ΚΑΤΑΠΑΤΕΩ. Pedibus conculco: καταπατουμενος, και συμπατουμενος, (N. B. Vox poſterior conculcationem plurimorum indicat) viii. 7.

ΚΑΤΑΠΟΘΕΙΣ αἱ. Voragines cænoſi: a καταπινω. de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΡΡΥΗΚΩΣ. Delapſus. ib. ii.

ΚΑΤΑΣΚΛΗΜΙ. Areſco, flaccidus fio. τα ανθη κατεσκληκε, πως, εκλελοιποτος του οικειου θερμου. de C. Pl. vi.

ΚΑΤΑΣΠΑΣΜΑΤΑ. Vibratio-

nes. κατασπασματα τας γλωττας εχειν, de lingulis fiſtulæ, iv. 12.

ΚΑΤΑΣΤΑΜΝΙΣΜΕΝΟΣ. In urceolis ſervatus: de vino; vid. ϛαμνισκος. de C. Pl. ii.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Temperamentum. καταϛασις ετους, viii. 8.

ΚΑΤΑΤΡΑΓΩ. id. q. κατατρωγω. Comedo, ix. 12.

ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΑΙ. Deorſum feror, deterior fio, iv. 15.

ΚΑΤΑΧΑΣΜΩΜΕΝΟΣ. Hians, ringens, *Bot.* de C. Pl. vi.

ΚΑΤΕΡΓΟΣ γη. Terra bene ſubacta: opp. γη αργη. de C. Pl. v.

ΚΑΥΘΜΟΣ. 1. Uredo, *Scal.* morbus arborum ex nimio calore. 2. Ventus calidus, " Sirrocco," iv. 17.

ΚΑΧΡΥΤΑΙΟΝ. } ΚΑΧΡΥΑΙΟΝ. } Oleum aqua miſtum. de C. Pl. v. Forſan fæces olei.

ΚΑΧΡΥΣ. Amentum, *Bot.* "Catkin," vi. 1. ix. 12.

ΚΕΓΧΡΑΜΙΣ. Semen Ficûs, ii. 3.

ΚΕΔΡΙΣ. Juniperis, *Cedri*, L. bacca. de C. Pl. vi.

ΚΕΚΛΙΜΜΕΝΟΣ. Flaccidus, procumbens; de foliis, iii. 10.

ΚΕΛΥΦΑΝΩΔΗΣ. An a κελυφας, ανος? vel error pro κελυφωδης? de C. Pl. i.

ΚΕΛΥΦΟΣ. Putamen nucis, tegumentum ſiliquæ, iii. et paſſ.

ΚΕΝΤΡΑ. τα. Nuclei in lapillis. v. 3.

ΚΕΡΑΙΑ τα. Antennæ navium. iv. 1.

ΚΕΡΑΜΙΟΝ. Amphora figulina. de C. Pl. vi.

ΚΕΡΜΗΣΤΙ. Minutatim, v. 3.

ΚΕΦΑΛΟΡΡΙΖΟΣ. Radice bulboſâ, vii. 2. vel forſ. fuſiformi. *Bot.* vid. infr.

ΚΕΦΑΛΩΔΗΣ. Radice fuſiformi, *Bot.* cujus apex κεφαλη vocatur, ix. 8.

ΚΗΡΙΩΔΗΣ. Alveolatus; ex ſimilitudine alveolarum favi. N.B. Dicitur de ſitu florum, in plana ſuperficie pl. umbelliferarum, iii. 12.

ΚΙΒΛΟΣ? ſyn. Βιβλου. ſed forſ. error textus, iv. 9.

ΚΙΒΩΤΙΟΝ. Dim. cymbula, v.

ΚΙΝΕΩ. De aſcenſu ſuccûs. de C. Pl. i.

ΚΙΣΣΗΡΙΣ. Pumex; lapidis genus, ix. 19.

ΚΙΣΣΗΡΟΙΔΕΣ. id.

ΚΛΑΣΙΣ. Methodus ordinandi vites; vid. διακαρσις, βλαϛολογια.

ΚΛΑΥΘΜΟΣ. Ventus calidus, forſan pr. καυθμος, ſupr. N. B. Aliter Olympias ventus: ex ambiguo ſenſu vocis καιω forſan ventus frigidus ex monte nivoſo, " Vent de Biſe." Fr.

ΚΛΗΜΑΤΙΔΕΣ. Dim. ramuli. de C. Pl. iii.

ΚΛΙΝΑΡΙΑ ενδιδοντα. Lectuli elaſtici ex ligno nexili, v. 8.

ΚΑΙΝΗ. Receptaculum in floribus compofitis. *Bot.* ii. 8.

ΚΑΙΝΗΣ. Pronus, declivis: opp. ορθῳ. de C. Pl.

ΚΑΩΝ. Ramus major: an κλημα id. vel ramus fecundarius? i. 1.

ΚΝΗΜΗ. Flexura, genuflectio in caule, ix. 14.

ΚΝΗΜΟΠΑΧΗΣ. Suræ craffitudine, ix. 4.

ΚΝΙΠΕΡΙΣ. Folliculus, *Bot.* a κνιψ, qui ibi nidulatur, ii. 9.

ΚΟΓΧΗ. 1. Menfura 2 cochlearium. 2. Bivalvis cujufdam tefta ad menfuram ufitata, ix. 6.

ΚΟΚΚΟΣ. Granum: femen Mali Punici. de C. Pl. v.

ΚΟΛΟΒΟΣ. Curtus, imperfectus. ανθος κολοβον, alias κολοβοανθης, flos papilionaceus, *Bot.* viii. 3.

ΚΟΛΟΥΣΙΣ. Amputatio: κολ. των ῥιζων Αμυγδαλης προς το γλυκαινειν: de C. Pl. ii.

ΚΟΜΗ ἡ. 1. Pappus Tragopagonis, vii. 7. 2. Caput frondofum arboris. de C. Pl. iii. 3. Frondes in genere.

ΚΟΝΙΑΣΙΣ τειχους. Dealbatio muris calce foluta, "whitewafhing," iv. 11.

ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ. 1. Pollen, *Bot.* ii. 8. ubi fœcundatio Palmæ fœminæ accurate defcribitur. 2. Collectio ftaminum in flore; hinc κονιορτωδης ανθος, de flore ftaminco. vid. χνους.

ΚΟΠΑΔΕΣ αἱ. "Coppices of wood," voce retenta.

ΚΟΠΡΟΣ. Fimus. *Agric.* Qualitates et genera κοπρου accurate difcriminantur. de C. Pl. v.

ΚΟΠΤΟΜΑΙ. Corrodor a vermibus, viii. 10.

ΚΟΡΜΟΣ. Truncus ligni: κορμοι οἱ, "Billets."

ΚΟΡΣΙΟΝ. Radix Loti, fic dicta, iv. 10. Vox Ægyptiaca.

ΚΟΡΥΜΒΑ. Corymbus, *Bot.* Κιττυ κορυμβα εις σφαιραν iii. 18.

ΚΟΡΥΝΗ. Inflorefcentia thyrfiformis; ut Pruni, *Lauro cerafi L.*

ΚΟΡΥΝΑΩ. id.

ΚΟΤΥΛΗΔΩΝ. 1. Umbilicus 2. Cavitates in radice Polypodii; vel potius tentacula, ix. 14.

ΚΟΥΡΑ. } De tonfuris arborum, ii. 2.
ΚΟΥΡΙΖΩ. }

ΚΟΧΛΑΚΩΔΗΣ. Terra cochleis abundans; de ftratis terræ, teftaceis foffilibus, ix. 10.

ΚΡΑΔΑΙ αἱ. Verrucofæ intumefcentiæ magnæ molis, in truncis arborum, i. 13.

ΚΡΑΔΑΩ. id.

ΚΡΑΔΗ. Ramus major. vid. κλων. de C. Pl. vi.

ΚΡΑΔΟΣ. Morbus in truncis vel ramis, ὁταν μελανθωσι, iv. 16.

ΚΡΑΜΒΟΣ. Morbus Oleæ. vid. defo. de C. Pl. v.

ΚΡΑΣΙΣ. Temperamentum ex mixtura: κρασις αερος, temperamentum aeris. de C. Pl. iv.

ΚΡΑΥΡΟΣ. Fragilis: opp. τῳ γλισχρῳ. i. 8.

ΚΡΕΙΤΤΩΣΙΣ. Morbus affinis ερυσιϐης.

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ τα. Pedunculi penſiles florum Arbuti, iii. 16.

ΚΡΙΝΙΟΣ. Liliaceus, a κρινον, iv. 10.

ΚΡΟΤΗΤΟΙ οἱ. Viæ tritæ, vi. 6.

ΚΤΑΝΕΑ? Pectinis ſpec. (vid. Præf.) iii. 10.

ΚΤΗΔΩΝ. Curſus venarum in ligno, v. 2. vid. μονοξοος.

ΚΥΑΜΟΝ το. Fructus Κυαμου, iv. 10.

ΚΥΕΩ. Fructifico.

ΚΥΗΜΑ. Pericarpium, *Bot.* vi. 4.

ΚΥΓΙΟΝ το. Principium: hinc κυριον του ζην. de C. Pl. v.

ΚΥΤΙΝΟΣ. Pericarpium globoſum Punicæ; vel potius Calyx carnoſus, εν τῳ κυτινῳ το ανθος Ῥοιας, i. 22.

ΚΥΤΤΑΡΟΝ. 1. Strobilus in Pinu. 2 Cavea in receptaculo Loti, Heleotropii, &c. iii. 6.

ΚΥΩΝ ὁ. Canis major, ſidus, i. 15.

ΚΩΔΙΑ. Papaveris pericarpium, ix. 13.

ΚΩΜΥΘΕΣ. "Beds of reeds," vox Ægypt. iv. 2.

ΚΩΝΟΣ. Strobilus. vid. κυτταρος, i. 18.

ΚΩΡΥΚΗ. Folliculus. De floribus Ulmi, iii. 14, 15.

Λ.

ΛΑΒΗ. Manubrium: και λαϐαι των εγχειριδιων, vi. 4.

ΛΑΓΑΡΟΣ. Laxus. *Pharm.* de alvo, ix. 11.

ΛΑΧΑΝΑ. Olera: τα προς ἡμετεραν χρειαν, vii. 7.

ΛΑΧΑΝΗΡΟΣ. } Diviſio plantarum eſculentarum in λαχανωδη, και σιτωδη, vii. 1.
ΛΑΧΑΝΩΔΗΣ. }

ΛΕΑΝΤΙΚΟΣ. Lævis: item de ſucco molli, oleoſo. Χυμος λεαντικος ἡ λεπτος, ἡ λειος. de C. Pl. vi.

ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ. Pratenſis? Diſtinguitur ſolum in λειμωνιον, pratenſe; ελειον, paluſtre; λιμνωδη inundatum: γη λειμωνια. de C. Pl. ii.

ΛΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule lævi: opp. τῳ πυροκαυλῳ, vii. 2.

ΛΕΙΡΙΩΔΗΣ. Reſpectu odoris, iii. 12.

ΛΕΙΧΗΝΙΑΩ. Lichenibus infeſto? de truncis arborum; "to grow moſſy." de C. Pl. v.

ΛΕΚΙΘΩΔΗΣ. Inſtar pulmenti, iv. 10. a λεκιθος.

ΛΕΜΜΑ. Cortex arundinis, iv. 11.

ΛΕΠΙΔΕΣ αἱ. Ramenta: particulæ minutæ in aëre, "motes." iv. 19. ὁταν αιθριας ουσης (hyemis tempore) αἱ λεπιδες καταφερονται, ὡσπερ ξυσματα, πλην πλατυτερα. N. B. Forſ. particulæ glaciales, ib.

ΛΕΠΤΟΓΕΩΝ. Terra levis: de qualitate ſoli. Angl. "a light ſoil."

ΛΕΠΤΟΙΝΟΣ. Fibris tenuibus, de ligno, "fine grained." vid. ινες, iii. 10.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ. De particulis primordiis. Aqua pura ſic dicta. de C. Pl. vi.

ΛΕΠΤΥΝΩ. Lævigo: Differt ab αληθινω, molo. de C. Pl. iv.

ΛΕΠΥΡΙΑ τα. 1. Squamæ piſcium; 2. Squamæ in corticibus et frondibus Fucorum, iv. 7.

ΛΕΠΥΡΩΔΗΣ. id. vii. 9.

ΛΕΥΚΑ τα. In ligno; alburnum, *Bot.* iii. 10.

ΛΕΥΚΟΓΑΙΟΣ. Inter ſoli varietates: opp. μελαγγειω. de C. Pl. ii.

ΛΙΘΙΑΩ. *Pharm.* calculo laboro, vii. 6.

ΛΙΘΟΣ ἡ. Magnes. Forſ. Lapis Lydius, "touch-ſtone." ix. 19.

ΛΙΠΑΡΟΣ. Oleoſus, nitens: vid. γλισχρος. de C. Pl. iv.

ΛΙΠΑΩ. De fluxu, vel aſcenſu ſucci in arboribus: ὁταν το δενδρον, ὁταν βλαστανη, λιπᾳ, iii. 6. δια το λιπᾳν συμπεριαιρετος ὁ φλοιος. ib.

ΛΙΠΟΣ. Fluxus ſucci.

ΛΙΠΟΤΗΣ. Morbus ex nimio fluxu. de C. Pl. v.

ΛΟΒΟΣ. Siliqua: hinc ελλοβος lobatus, μακρολοβος, &c. &c.

ΛΟΓΟΥ δεομαι. *phraſis*; Solutione egeo. de C. Pl. v.

ΛΟΠΑΣ. Morbus in radicibus ex nimio humore; οἱον μαδισις, vid. λιπαω: præcipue in Ficu. de C. Pl. v.

ΛΟΠΕΩ. Vid. infr. λοπος, iv. 18.

ΛΟΠΙΑ. } Tempus decorticandi, v. 1.
ΛΟΠΗΤΑΣ. }

ΛΟΠΟΣ. Tunica corticis: hinc cortex μονολοπος, πολυλοπος, i. 8.

ΛΟΥΣΣΟΝ το. In trunco Abietis nodus ſimilis αιγιδος: (vid.) ſed albus, το λευκον λουσσον: Αιγις autem ευχρως δια το ενδαδον, iii. 10. N. B. id. q. αιγις in Pinu.

ΛΟΦΟΥΡΟΙ οἱ. Equi, Aſini? Vox λοφουρος, criſta-caudatus, ex uſu caudæ equinæ ad galearum criſtas: opp. τοις στελιφουροις, Ovibus, Capreis, Damis, &c. quorum cauda cylindrico-æqualis, inſtar ſtipitis, iii. 10. p.

ΛΟΧΕΙΑ. Parturitio, item *met.* in arboribus. de C. Pl. iii.

ΛΟΧΜΗ. Dumetum paludoſum: "a jungle."

ΛΟΧΜΩΔΗ τα. Frutices ibi creſcentes, iv. 9.

ΛΥΠΡΟΤΗΣ. Ariditas, macies: forſan a λυπηρος, triſtis. de C. Pl. v.

ΛΥΤΙΚΟΣ. Φαρμακον λυτικον, antidotum, ix. 16.

M.

ΜΑΔΑΩ. infr.

ΜΑΔΙΣΙΣ. Morbus Ficûs ad radices, ex nimio humore, iv. 16.

ΜΑΚΕΔΩΝΙΑ. Montes hujus regionis arboribus variis ſcatent: Ελατη, Πευκη, Πιτυς, Π. αγρια, Φιλυρα, Φηγος, Πυξος, Ζυγια, Ανδραχνη, Μιλος, Αρκευθος, Τερμινθος, Ερινεος, Φιλυκη, Αφαρκη, Καρυα, Διος βαλανος, Πρινος, iii. 4.

ΜΑΛΑΚΟΣ. Reſpectu temperiei cœli: αηρ μαλακος, "a ſoft air," vi. 7. reſpectu ſaporis vini: opp. αυστηρῳ. de C. Pl. ii.

ΜΑΛΑΣΣΩ. Tundendo mollio, de C. Pl. v.

ΜΑΝΟΣ. 1. Rarus reſpectu ſitûs: φυλλα μανα opp. πυκνοις, v. 3. 2. laxus, poroſus; γη μανα, και ευδιοδος, i. 8. ξυλον μανον, i. 6.

ΜΑΝΟΤΗΣ, id.

ΜΑΣΑΩ. } ΜΑΣΗΜΑ. } ΜΑΣΗΣΙΣ. } De actione manducandi: "chewing," iv. 9.

ΜΑΣΠΕΤΟΣ. Folium Silphii, vi. 3. N.B. Vox Syriaca?

ΜΑΣΧΑΛΗ. Axilla rami, vel folii, *Bot.* iii. 9.

ΜΑΤΙΑΙΟΣ. Per contractionem pr. ναματιαιος· υδωρ ματιαιον, aqua fontinalis, ii. 8.

ΜΕΛΑΓΓΕΙΟΣ. } ΜΕΛΑΓΓΕΩΣ. } Soli ſpec. *Agric.* γη πιειρα και μελαγγειος, "a rich black mould." de C. Pl. ii.

ΜΕΛΑΝΔΡΥΟΝ. Cor ligni quercûs, vel generaliter; Δρυς enim vox generalis: opp. τοις λευκοις. (vid. τα λευκα) i. 9.

ΜΕΛΑΣ. } ΜΕΛΑΝΙΑ. } De colore; obſcuritatem quandam indicat; ita apud nos, "dark coloured," v. 4. et paſſ.

ΜΕΛΙ. Methodus edulcorandi ſpecies quaſdam infuſione ſeminum in melle. de C. Pl. v.

ΜΕΛΙΤΤΑ. Averſatur unguenta pretioſa. de C. Pl. vi.

ΜΕΛΙΤΤΟΥΤΑ. Placenta farrea melle condita: παγκαρπος μελιττουτα, in qua ςαφιδες, aliique fructus paſſi: "a plum cake."

ΜΕΡΟΣ· κατα μερος· ανα μερος, ſucceſſive, vii. 3. et p.

ΜΕΣΟΓΟΝΙΟΝ. Internodium, iv. 12.

ΜΕΤΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Iterum germino: δενδρα αυτοματως μεταβλαστανει, μεταβολης τινος γινομενης εκ των ουρανιων, ii. 7.

ΜΕΤΑΛΛΑ τα. Fodinæ metallicæ, ix. 13.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΑ τα. Mi-

neræ crudæ; "Ores." de C. Pl. vi.

ΜΕΤΕΩΡΟΣ. Superficialis; de radicibus, iii. 11.

ΜΗΛΙΝΟΕΙΣ. Subflavus, iii. 11.

ΜΗΛΙΝΟΣ, a μηλον. Flavus. de C. Pl. ii.

ΜΗΡΙΚΑΖΩ. } Rumino. N. B.
ΜΗΡΥΚΑΖΩ. } Animalia distinguuntur in μηρυκαζοντα, et λοφουρα, (vid.)

ΜΗΤΡΑ. 1. Medulla, pars cava, vasculosa in truncis et ramis: το μεταξυ του ξυλου, τριτον απο φλοιου, i. 3. 2. Interior pars trunci in adultis, aliter καρδια, εγκαρδιον, εντεριωνη. N. B. evanescit ætate ἡ μητρα. In quibusdam, ut observat Theoph. est ὑμενωδης, (vasculosus,) in aliis σαρκωδης, in aliis ξυλωδης, i. 9. Μητρα μαλιςα ζωτικον. de C. Pl. v. Hinc cel. Linn. in Amœnit. "vita plantarum in substantia medullari consistit;" fors. in junioribus: sed de hoc inquirendum.

ΜΙΔΑΣ. Morbus in Fabis, Pisis, &c. Fors. Puccinea, *Phaseolorum* Hedw. fil. Fung. ined. t. 19. vel Uredo, *appendiculata* var. β, Persoon, Syn. 222. Fungi hi minutissimi folia et plantas totas quandoque cooperiunt, unde ex aureo colore nomen forsan a fabula inditum.

ΜΙΚΡΟΠΥΡΗΝΟΣ. Per contract. a πυρην, nucleo parvo. de C. Pl. i.

ΜΙΣΧΟΣ. 1. Pedunculus, *Bot.* p. ῳ συνηρτηται το φυλλον. 2. Ligonis spec. fors. tridens quoddam. vid. δικελλω. de C. Pl. iii.

ΜΟΛΥΝΣΙΣ. Tarda concoctio. de C. Pl. iv.

ΜΟΝΑΧΟΥ. Uno in loco, ix. 10.

ΜΟΝΟΚΩΛΟΣ. Simplex, *Bot.* non lobatus, de folio, ix. 20.

ΜΟΝΟΞΟΟΣ. De cursu venarum in ligno; "the grain." N. B. Haud facile intelligendus sensus auctoris respectu κτηδονων in ligno; (vid.) 1. μονοξοα, vel μονοζοα, *Bot.*) πλειω εισι των αλλων ξυλων, (v. 2.) 2. Διξοα εχουσι κτηδονα μιαν εφ' ἑκατερα της εντεριωνης· και ταυτας εναντιας αλληλαις, ib. 3. Δενδρα τετραξοα, ὁσοις εφ' ἑκατερα της εντεριωνης δυο κτηδονες εισι εναντιας εχουσαι την φυσιν. ib. N. B. Lign. Pinûs exemplum præbet posterioris, ex singulari modo crescendi, sc. *quatuor* ramis horizontalibus; hinc κτηδονων, vel cursuum venarum in ligno dispositio.

ΜΟΝΟΡΡΙΖΟΣ τῃ παχειᾳ. Radix fusiformis. *Bot.* vi. 7.

ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΟΣ. Rota simplici; μονοςροφος αμαξα, v. 8.

ΜΟΝΟΦΥΗΣ. Homogeneus. de C. Pl. i.

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΣ. Reſpectu germinationis ſeminum; Monocotyledonus. *Bot.* viii. 2.

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ τα. Surculi: opp. φυτευμασι, plantis ex ſemine. de C. Pl. vi.

ΜΟΣΧΕΥΩ. Propago per ſurculos. 1. ſimpl. "to plant cuttings or ſuckers;" 2. μοσχευειν vel προμοσχευειν επ' αυτου του δενδρου, "to graff." ii. 7. et p.

ΜΟΧΘΗΡΟΣ. Met. ſterilis; γη μοχθηρα, ii. 3.

ΜΥΡΙΟΠΟΥΣ? Log. αμαυροπους, de Triangulo inæquilaterali. opp. ισοποδιαιῳ. de C. Pl. vi.

ΜΥΡΙΣ. Vas unguentarium: "a perfume pot."

ΜΥΟΧΟΔΟΙ. Rectius Μυοδοχοι. 1. Cavitates murium. 2. Terebrellum, "a gimlet;" cujus actio denotatur δια το περιςραφεσθαι, v. 5.

N.

ΝΑΙΡΟΝ. Unguenti pretioſi ſpec. ix. 7.

ΝΑΜΑΤΙΟΣ. } ΝΑΜΑΤΙΑΙΟΣ. } Fontinalis. vid. per contractionem ματιαιος, ſupr. N. B. ναμ. υδωρ, opp. υδατι εκ διος, ("rain water,") viii. 7.

ΝΑΡΔΟΣ. Ung. Vid. Ναρδος, *Tab. Syſt.* p. 22. "ſpikenard," ib. N. B. Andropogon *Schœnanthus* L. accurate delineatur et deſcribitur in opere egregio apud Gallos "Jardin de Cels" dicto. Tab. 89.

ΝΑΡΘΗΞ. Internodium. 1. Ferula pl. (v. *Syſt.*) 2. Internodium caulinum. N. B. Το κοιλον ναρθηκος, vice phialæ apud antiquos in uſu, ix. 16.

ΝΑΡΤΗ. Forſan præparatio diverſa ναρδου, ſupr. ſeparatim enumeratur in Cat. ix. 7.

ΝΕΑΩ. De actione novandi agros: "to fallow."

ΝΕΙΟΣ. } ΝΕΙΟΝ. } Novale. νειος εαρινος. νειος χειμερινος, viii. 6.

ΝΕΜΟΜΕΝΟΣ. Excavatus: νεμομενα ελκη, ulcera profunda, inveterata, ix. 12.

ΝΕΟΔΕΡΟΣ. Recens excoriatus, ix. 15. met. de cortice in arboribus.

ΝΕΩΤΑ. Εις νεωτα, in annum proximum.

ΝΗΠΙΟΣ. *metaph.* de plantis junioribus, viii. 1.

ΝΗΣΟΙ πλωαδες. Fluitantes. Frequens mentio in lacubus et fluviis. L. Orchomeni, ix. 13.

ΝΙΤΡΟΝ. Sal nitrum: ſingularis uſus ejus ad edulcorandos Raphanos. de C. Pl. iii.

ΝΟΣΤΙΜΟΣ. Guſtu dulcis, a νοςος. *Phav.* σπερματα ευχυλοτερα, νοςιμοτερα. de C. Pl. iv.

Ξ.

ΞΥΛΟΝ. Pars solida trunci et ramorum, constans ex partibus quæ ινες, φλιβες, σαρξ vocantur. (vid.) N.B. Ξυλα antiquitus in θερμα και ψυχρα dividebantur respectu usus in πυρειαις. Ξυλα θερμα frictione, calida evadunt, et hebetant aciem telorum; hujus generis Κιττος, Δαφνη, Συκαμινος, v. 4.

ΞΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ. *Met.* Mansuefactus sum, de plantis cultura amelioratis. de C. Pl. i.

ΞΥΝΕΙΣΤΗΚΩΣ. Compressus, vi. 2.

ΞΥΡΟΣ? An error pro ξηρος? ξυρος και ξυλωδης.

ΞΥΩ. Rado: ξυειν εν οινῳ, "scraping a root into wine," ix. 12.

Ο.

ΟΓΚΟΣ. 1. Tumor. 2. Pericarpium globosum rosæ, i. 22.

ΟΖΟΣ. Nodus in arbore, ubi ramus oritur. N.B. Fibræ (ινες) ibi deflectuntur, et in orbem circumferuntur: (vid. κτηδων, μονοξιος.) εστι γαρ οζος αρχη τις του κλαδου. Hinc τριοζα δενδρα, τετροζα, πεντaοζα, i. 13. N.B. Οζοι præcipue conspiciuntur in Pinu et Abiete L.

ΟΙΚΕΙΟΣ. Conveniens, moderatus, consentaneus.

ΟΙΚΗΜΑ. Receptaculum in Compositis. *Bot.* de C. Pl. iv.

ΟΙΝΑΡΟΝ. Vitis folium. de C. Pl. vi.

ΟΙΝΟΣ. Vinum: potestates variæ in diversis vini generibus. οινος αγονος, (sterilitatem inducens,) ix. 12. οινος υπνωτικος· οινος εκστατικος. N.B. Vini usus ad arcendos vermes ex seminibus. de C. Pl. iii.

ΟΙΝΩΔΗΣ. Purpureo-ruber respectu coloris; υγρασια οινωδης τη οψει, iii. 13.

ΟΙΝΩΨ. } Id. N.B. Lignum Αριας λευκοτερον του Πριου, οινωποτερον της Δρυος, "darker coloured," iii. 16. uvæ οινοχρωτες, και ερυθροι, ix. 3.

ΟΙΝΟΧΡΩΣ. }

ΟΛΙΒΑΝΟΝ. Fructus vel gummi Ολιβανου. Vid. *Tab. Syst.* p. 28.

ΟΛΙΓΟΧΟΟΣ. Parcius fructum ferens: opp. πολυχουν, viii. 4.

'ΟΛΚΗ. Pondus: ab ἑλκω, (vergo,) ix. 17.

'ΟΛΚΟΝ το. Vis attractiva, ab ἑλκω, (traho): τουτο το ὁλκον της τροφης. de C. Pl. iv.

'ΟΛΜΟΣ. Mortarium: κοπτοντες εν ὁλμῳ, "pounding in a mortar," ix. 16.

ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Ventus ex M. Olympo, iv. 17. vid. καυθμος.

ΟΛΥΝΘΑΖΩ. Ab ολυνθος, caprifico. N. B. Caprificationis methodus et notitia sexûs plantarum Theophrasto cognitæ. Investigatione instituta de influentia aëris respectu fructificationis, de C. Pl. ii. ita pergit Auctor: και των τοιουτων εν τη προσαρτησει τι, και τοις ογκοις (in appendice florali et pericarpiis) η αιτια' (causa vel modus impregnationis:) των δε Συκων και Φοινικων ουκ εν τουτοις εστι μονον, αλλα και εν τη διαστασει αυτων, (etiam quando arbores ipsæ situ separentur,) διο και εριναζουσι τας Συκας, τουτο δε ποιουσι όπως οἱ Ψηνες (Cynips Psenes) οἱ εκ των Ερινων (vid.) επικρεμαννυμενων γινομενοι διοιγωσι τα επι της Συκης.

'ΟΜΑΛΗΣ. Lævis, homogeneus; texturæ simplicis: opp. λεπυρωδει, tunicato, vii. 9.

'ΟΜΟΙΟΜΕΡΗΣ. In partes similes divisibilis, ut aqua &c. N. B. Opp. ανομοιομερει, ut truncus arboris in corticem, lignum, fibras, succum, i. 2.

'ΟΜΟΣΤΙΧΟΣ. Serie simplici: vid. διστιχος, &c. de C. Pl. vi.

ΟΜΦΑΚΩΔΗΣ. Color sature purpureus: hinc bacca Sambuci, *nigri* L. ita vocatur, iii. 12.

ΟΜΦΑΞ. Succus uvæ inspissatus.

'ΟΜΩΝΥΜΙΑ. Synonymia.

'ΟΜΩΝΥΜΟΣ. Synonymus, *Bot.* vii. 14. id.

ΟΞΥΒΑΦΟΝ. Acetabulum, mensura, ix. 12.

ΟΟΝ. ⎫
ΩΟΝ. ⎭ Fructus Sorbi, ii 3.

ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΟΝ. Gummi Amyridis, *Giliadensis* L. Vid. Tab. Syst.

ΟΠΙΣΜΟΣ. Collectio succi sponte fluentis: opp. χυλισμω, succo expresso. vid.

ΟΠΟΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ. Oleum Cinnamomi, iv.

ΟΠΟΣ. Succus sponte fluens: opp. χυλω, succo expresso. N. B. Οπος coagulatus aliquando δακρυον vocatur, i. 3.

ΟΠΩΔΗΣ. Aqueus: opp. γαλακτωδει, πιττωδει, i. 19.

ΟΡΓΑΩ. Intumesco: όταν οργᾳ τα σπερματα, antequam germinent. de C. Pl. ii. γη οργωσα, ικμος, ib. iii.

ΟΡΕΟΤΥΠΟΙ. Lignarii, ib. vi.

'ΟΡΜΗ. Excitatio, tendentia: opp. τη φθορᾳ respectu odorum. de C. Pl. vi.

ΟΡΝΙΘΕΣ. Ætate progrediente dissimiles sibi, plumarum colore mutato. de C. Pl. v.

ΟΡΟΣ. ⎫
ΟΡΡΟΣ. ⎭ 1. Serum lactis, "whey." 2. Serum sanguinis. 3. Succus tenuis serosus, iii. 10. ix. 2.

ΟΡΡΩΔΗΣ. Serosus.

ΟΣΜΗ. Αισθησις του ξηρου δια τω ὑγρω, de C. Pl. vi. ubi sub-

ctilis admodum Demetrii Philosophi occurrit disquisitio de differentiis odorum ex forma particularum.

ΟΣΤΑΥΓΞ. } 1. Tentaculum.
ΟΣΤΑΙΓΞ. } Nat. Hist. 2. Cirrhus, *Bot.*

ΟΥΛΟΣ. 1. Crispus, cirrhatus; de coma capitis apud Afros. 2. Fibrarum distorsiones in ligno, (αἱ συστραφαι των ξυλων, v. 6.) 3. Curvitates ramorum, iii. 17. 4. De rugoso Brassicæ folio. (vid. ῥαφανος, Tab. Syst. p. 15.)

ΟΥΛΟΤΗΣ. Id.

ΟΥΡΟΝ. Usus urinæ in edulcorandis amygdalis. de C. Pl. iii.

ΟΥΟΝ. Vid. Οον.

ΟΦΘΑΛΜΟΣ. Gemma. *Bot* Hinc οφθαλμιζω, *Hort.* et ενοφθαλμισμος. (vid)

ΟΨΙΟΣ. Ὑδατα οψια in calidis regionibus, "Tropical rains" dict.

Π.

ΠΑΓΚΑΡΠΙΟΣ. Fructibus omnigenis farctus. παγκ. μελιττοντα. vid.

ΠΑΓΟΙ οἱ. Tempus glaciale, iv. 17.

ΠΑΘΗ τα. Proprietates, vires, respectu plantarum; sic apud Virg. "Scire potestates herbarum." i. 1.

ΠΑΙΔΕΙΑ φυτων. *Hort.* "the training of trees." de C. Pl. iii.

ΠΑΛΑΘΗ. Massa fructuum conditorum, præcipue Ficuum; hoc modo facta; ξηραινοντες τον καρπον, (της Κοκκυμηλιας) και τους πυρηνας εξαιρουντες κοπτουσι, (tundunt) και ποιουσι παλαθας. Angl. "Marmalade." iv. 9.

ΠΑΛΙΒΛΑΣΤΟΣ. Iterum germinans: de germ. autumnali, "the autumn shoots," *hort.*

ΠΑΛΙΝΦΥΤΟΣ. Reciprocus; sibi invicem succedens. de C. Pl. iii. 1.

ΠΑΝΑΞ το. Succus inspissatus Παναχειας. vid.

ΠΑΠΠΟΣ. Lanugo; pappus, *Bot.*

ΠΑΠΠΩΔΗ σπερματα. Papposa; pappo coronata. *Bot.* vi. 4.

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Germino ex radice: i. e. "by the side of the trunk."

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. Ang. "a sucker," i. 9.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ. Apud Orientes. Septa spatiosa arboribus consita, feris omnigenis servandis. vid. Desc. v. 9. ix. 6.

ΠΑΡΑΚΑΘΙΗΜΙ. vid. παραβλαστανω, viii. 2.

ΠΑΡΑΚΑΝΘΙΖΩ. Juxta folium spinosus sum? vel fors. spinulis, ex margine vel rachi folii, i. 17.

ΠΑΡΑΚΑΥΛΙΖΩ. De fruticibus ab imo caulefcentibus: opp. μονοκαυλιζω. *Bot.* vi. 2.

ΠΑΡΑΚΙΝΕΩ. Infanire facio, ix. 20.

ΠΑΡΑΛΙΘΑΖΩ. Lapidefco: de concretione in fructu Pyri, iii. 10.

ΠΑΡΑΛΛΑΞ. Alternatim.

ΠΑΡΑΛΛΑΤΤΩΝ. Alternans. *Bot.*

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ. Oppofitus. *Bot.*

ΠΑΡΑΠΛΗΓΩ. Diftorqueo, v. 3.

ΠΑΡΑΠΛΗΘΙΑ. Abundantia. de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΠΟΙΕΩ. Perperam facio. de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΣΠΑΔΕΣ. Rami avulfi ad propagandum: "fets." N.B. Rami abfciffi apud nos voc. "cuttings," ii. 2.

ΠΑΡΑΤΕΜΝΩ. Intempeftive cædo, vi. 3.

ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ. id. q. παραβλαστοι.

ΠΑΡΑΦΥΩ. Pullulo eodem tempore; vel act. emitto radices, furculos, &c. vii. 2.

ΠΑΡΙΗΜΙ. Debilitor. de C. Pl. iii.

ΠΑΡΙΣΤΗΜΙ. id. quod εξιστημι, de vino. de C. Pl. vi. "to turn four." Οἱ λεπτοι οινοι ευωδεις, και θαττον παρισταμενοι. ib.

ΠΑΡΥΔΡΟΣ. Juxta aquas crefcens: ενυδρος, in aquis, iv. 13.

ΠΑΡΩΡΟΣ. Intempeftivus. de C. Pl. iii.

ΠΑΤΤΑΛΟΣ. Paxillum: "a peg." π. σιδηρος, ii. 3.

ΠΑΤΤΩ. Complano, premo. de C. Pl. vi. Calco pedibus. Hinc

ΠΑΤΟΣ. Via calcata: Angl. voce fere retenta, "a path," vi. 6.

ΠΕΠΕΙΡΟΣ. fyn. πεπαινος, maturus. de C. Pl. iii.

ΠΕΡΙΑΛΕΙΦΩ. Circumluto, v. 9.

ΠΕΡΙΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule fcandente. *Bot.* viii. 8.

ΠΕΡΙΒΩΘΡΩΜΕΝΟΣ. *Hort.* "trenched round." de C. Pl. v.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ. Circumfcindo; notas circum incido, ix. 9.

ΠΕΡΙΚΑΘΑΙΡΩ. *Hort.* vid. καθαιρω.

ΠΕΡΙΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Succeffio continuata florum vel fructuum.

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΟΣ. Ambitus capitis; menfura, iii. 13.

ΠΕΡΙΚΟΜΟΣ. Frondofus valde, iii.

ΠΕΡΙΜΗΤΡΙΟΣ. De ligno. vid. μητρα, iii. 10.

ΠΕΡΙΟΧΗ. Tegmen; cuticula pericarpii. *Bot.* de C. Pl. i.

ΠΕΡΙΠΑΤΤΩ. vid. παττω, ii. 8.

ΠΕΡΙΠΙΠΤΩ. Undique decido; de cortice arbuti, i. 8.

ΠΕΡΙΠΝΟΥΣ. "An eddy of wind," v. 2.

ΠΕΡΙΣΑΤΤΩ. } Circumſtipo.
ΠΕΡΙΣΑΞΙΣ. } Vid. σαττω. de C. Pl. v.

ΠΕΡΙΣΚΕΛΗΣ, a σκελλω. Aridus, durus: de radice Hellebori: σκληρον και περισκελη, ix. 11. item de vento, Angl. "a dry parching wind." de C. Pl. ii.

ΠΕΡΙΤΤΟΣ. 1. Extraordinarius, excellens, ix. 7. 2. Superfluus, ἐξ ακρου περιττος, de folio pinnato, extremo impari. *Bot.* iii. 15.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ. Superflua; excrementa: N. B. Animalia, τα περιττωματα, per alvum ejiciunt, non tamen plantæ, quæ idcirco απεριττωτοι, i. 4. de C. Pl. vi.

ΠΕΡΙΦΕΡΩ. Suſtineo: de viribus ſtomachi ad digerendum, ix. 13.

ΠΕΡΝΙΞ. Pars fructifera Cacti, *opuntiæ* L. vi. 4.

ΠΕΡΥΣΙΝΟΣ. Prioris anni; de fructu. ὁ καρπος (Juniperi) διαμενει εις ενιαυτον· ειθ' ὁταν ὁ αλλος επιφυη, ὁ περυσινος αποπιπτει, iii. 12.

ΠΕΣΣΟΣ. *Pharm.* "a tent for a wound," ix. 22.

ΠΕΤΑΣΟΙ οἱ. Folia Ari, *colocaſiæ*, ex ſimilitudine.

ΠΗΓΝΥΩ. Planto manibus. *Bot.* vii. 1.

ΠΗΚΤΙΚΟΣ. Congelans.

ΠΗΞΙΣ. Concretio gummoſa, ix. 1. αἱ Πηξεις de tempore pruinoſo.

ΠΗΝΙΟΝ. Fuſus: "ſpindle." forſ. ex voc. Græc. vii. 3.

ΠΗΡΩΣΙΣ. *met.* οφθαλμων, in arboribus, "a blight," iv. 16.

ΠΙΕΣΑΓΓΑΙ. } Anginæ pectoris. de C. Pl. iv.
ΠΙΕΣΑΓΧΑΙ. }

ΠΙΛΗΣΙΣ. Conſtipatio. de C. Pl. ii.

ΠΙΛΟΣ ἡ. Pars floccoſa, iv. 10.

ΠΙΛΟΩ. Coarcto. ὁ χειμων πιλοι και καρκινοι (vid.) τας ῥιζας. de C. Pl. iii. 4.

ΠΙΤΤΟΚΑΥΤΕΩ. De actione ligna Abietina comburendi ad extrahendam picem. vid. Deſc. ix. 2.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΡΠΟΣ. Fructu laterali, vii. 3.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule horizontali: opp. ορθοκαυλῳ, viii. 3.

ΠΛΑΚΟΥΝΤΩΔΗΣ. Placentaceus, iv.

ΠΛΑΚΩΔΗΣ. Schiſtoſus. *Geolog.* γη ὑπαργιλος και πλακωδης, ix. 4.

ΠΛΑΣΙΣ. επει εις την πλασιν μετιϐησαν, (quando cœperunt fiſtulas formare,) συν πλασματι, iv. 12.

ΠΛΑΣΜΑ. "the mouth-piece of the fiſtula." οἱ μετα πλασματος αυλουντες: vid. etiam γλωττα, iv. 12.

ΠΛΕΚΤΑΝΑΙ. Tentacula: λυποδος πλεκταναι, ix. 14.

ΠΛΙΝΤΡΙΣ. Latericius, figuli-

nus. γη πλιντρις. de C. Pl. iii.

ΠΛΟΑΔΕΣ. (νησοι) Insulæ fluitantes, iv. 11.

ΠΛΟΚΑΜΟΣ. Textilis: Καλαμου spec. iv. 11.

ΠΝΕΥΜΑ το. Vapor, gas. εν οινῳ ζεοντι, ix. 18.

ΠΝΙΓΗ τα. Calor æstivus, ix. 5.

ΠΟΑ. 1. Pars herbacea plantæ, ix. 16. 2. Vires vel succi plantarum. τας φυλλωδεις δυναμεις ποας καλουσι, ix. 8.

ΠΟΑΣΜΟΣ. Sarculatio; actus averruncandi: "weeding." de C. Pl. iii. vid. σκαλισις.

ΠΟΔΙΑΙΟΣ. vid. ισοποδιαιος.

ΠΟΛΛΟΥ δια, espectu loci, longo intervallo. de C. Pl. iii.

ΠΟΛΥΛΛΟΠΟΣ. vid. λοπος, μονολοπος.

ΠΟΛΥΜΑΣΧΑΛΟΣ. vid. μασχαλη, iii. 17.

ΠΟΛΥΝΟΣΤΟΣ. Fœcundus valde, viii. 8.

ΠΟΛΥΧΟΟΣ. id. de C. Pl. ii.

ΠΟΝΕΩ. Marcesco, debilis sum. de C. Pl. iii.

ΠΟΩΔΗΣ. Herbaceus: divisio plantarum, viii. 1.

ΠΡΑΝΗΣ. Supinus: inferior folii superficies: opp. τῳ ὑπτιῳ, i. 14, 16.

ΠΡΕΜΝΟΝ. 1. Surculus major; stipes, ii. 1. 2. morbus; seu intumescentia in ramo, i. 13.

ΠΡΙΟΝΩΔΗΣ. Serratus, *Bot.* iii. 14.

ΠΡΙΣΙΣ. Actio serræ, v. 6.

ΠΡΙΣΜΑΤΑ τα. Particulæ ligneæ ex serratura: "sawdust," v. 8.

ΠΡΟΑΠΤΩΤΟΣ. Immature decidens: ερινα προαπτωτα, iii. 5.

ΠΡΟΒΟΛΑΙ αἱ. Primæ germinationes. de C. Pl. v.

ΠΡΟΔΡΟΜΑΙ αἱ. Fructus præcox Ficûs. de C. Pl. v.

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Præparatio arundinum ad fistulas faciendas.

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Prævenio; magico sensu. καταδειν και προλαμβανειν, vi. 2.

ΠΡΟΣΑΓΩ. Applico remedium, ix. 13.

ΠΡΟΣΑΦΕΨΕΩ. De præparatione ad coquendum: προσαφεψηθεντα εν οξει, (prius infusa et cocta in aceto,) vii. 11.

ΠΡΟΣΔΕΝΔΡΟΝ. Parasita. *Bot.* de C. Pl. ii.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ τα. Menses muliebres, ix. 10.

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ Recens: χλωρος και προσφατος. de C. Pl. vi.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ κατα. De cibo idoneo ad sumendum. de C. Pl. vi.

ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ. Conveniens, viii. 6.

ΠΡΟΣΦΥΣΙΣ. 1. Insertio, i. 18. adhæsio, viii. 2. 2. Receptaculum in Compositis, *Bot.* vii. 13.

ΠΡΟΤΕΡΕΩ. Præcedo: προτερειν δλμηνω, de præcocitate florum in Ægypto, vi. 7.

ΠΡΟΤΡΙΤΑ. Adv. tertio. de C. Pl. iii.

ΠΡΟΩΘΕΟΜΑΙ. Surfum impellor, iii. 7.

ΠΡΟΩΡΟΣ. Præcox, vii. 12.

ΠΡΩΡΑ. *Bot.* Apex vel fastigium rami, &c. ii.

ΠΤΕΡΝΙΞ. Caulis Cacti, *opuntiæ* L.

ΠΤΕΡΩΔΗΣ. Pinnatus. *Bot.* ii.

ΠΤΙΣΣΩ. Tundo, item decortico, ii. 5.

ΠΤΟΡΘΑΚΑΝΘΟΣ. Ramis spinosis, vi. 1.

ΠΥΓΩΝ. Cubitus; mensura, iv. 6.

ΠΥΘΜΗΝ. Corona radicis fusiformis. *Bot.* iv. 12.

ΠΥΚΝΟΣ. De ligno; solidus, densus: opp. μανω. vid.

ΠΥΡΕΙΑ. } Instrumentum igni
ΠΥΡΕΙΟΝ. } accendendo vi frictionis: partes sunt, 1. εσχαρα, (lignum planum foveâ in medio;) 2. τρυπανον, (terebra; pistillum obtusum ex ligno duro,) v. 10. N.B. Mos adhuc obtinet in India occidentali.

ΠΥΡΗΝ. 1. Bacca, vel drupa, *Bot.* 2. Nucleus in medio lapilli, vel calculi. 3. Granum in baccis. de C. Pl. ii.

ΠΥΡΟΩ. Torreo: igni coquo: de C. Pl. vi.

ΠΥΡΩΣ'Σ (a Πυρος). Panificium. de C. Pl. iv.

ΠΩΡΟΟΜΑΙ. In tophum convertor: de cortice arboris, iv. 18.

P.

'ΡΑΒΔΟΙ οἱ. Venæ minerales, ῥαβδοι μεταλλων. de C. Pl. iv.

'ΡΑΒΔΟΣ Φοινικος. Spatha, *Bot.* ii. 8.

'ΡΑΓΑΔΗΣ. } A ῥαξ, acinus:
'ΡΑΓΩΔΗΣ. } de fructu Mandragoræ acinis pleno, vi. 3: de p. Punicæ. de C. Pl. v.

'ΡΑΧΙΣ. Rachis, *Bot.* nervus intermedius folii; pedunculi continuatio, iii. 8.

'ΡΕΙΝ το. Morbus vitis, ex nimio succo. de C. Pl. v.

'ΡΗΓΜΑΤΑ τα. Fracturæ. *Med.* vii. 11.

'ΡΗΤΙΝΗ. } Propr. Terebinthi-
'ΡΥΤΙΝΗ. } na fluido statu: hinc vox Angl. "resin," de concreto, iii. 15.

'ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ. Resinosus, utpote lignum Abietinum.

'ΡΙΖΟΤΟΜΙΑ. Anni tempus herborisando proprium, ix. 8.

'ΡΙΖΟΤΟΜΟΣ. Herbarius, iv. 5.

'ΡΙΖΟΦΥΛΛΟΣ. De plantis, foliis radicalibus. *Bot.* vii. 10.

'ΡΟΑΔΕΣ αἱ. Grana vel semina Mali Punici, iv. 11.

'ΡΟΑ. } Morbus vitis. Syn. τῦ
'ΡΟΙΑΣ. } ῥειν. de C. Pl. v.

'ΡΟΔΩΝΙΑ. 1. Rosa planta 2. Rosetum.

ʽΡΟΠΗ. 1. Inclinatio, propenſio, iv. 4. 2. Vis inſita. de C. Pl. iv.

ʽΡΟΠΟΙ? An id. ῥοποι μασχαλιδος. a ῥεπω, iv.

ʽΡΟΥΣ Succus fruticis. (vid. *Tab. Syſt.*) ʽΡοος, inſpiſſatus, iii. 18.

ʽΡΟΩΔΗΣ. Irriguus, γη ῥοωδης. de C. Pl. iii.

ʽΡΥΠΤΙΚΟΣ. Abſtergens; de C. Pl. v.

ʽΡΥΠΤΟΜΑΙ. Abſtergor: τροχισκαι της τρυγος, (vid.) οἱς ῥυπτομεθα, (quorum uſus in abſtergendis ſordibus, ut hodie ſaponis,) ix. 19.

ʽΡΥΤΟΝ ὑδωρ. Aqua rivularis: occurrunt etiam 2. ὑδ. ναματιαιον, "ſpring-water," 3. ὑδ. εκ Διος, "rain-water," ii. 3.

Σ.

ΣΑΚΚΙΖΟΜΕΝΟΣ. In ſacco vel utri ſervatus. οινος σακκιζομενος. de C. Pl. vi. N.B. Ασκου mentio fit vinis ſervandis apud Homerum, Il. iii. 247. item apud Herod. lib. ii. c. 121. ſæpius apud LXX. in V. T. etiam in N. T. Matth. ix. 17. Luc. v. 37, 38.

ΣΑΡΙΣΣΑ. Haſta prælonga, Macedonica. N. B. Altitudo Corni, *fœminæ* L. comparatur ὑψει της σαρισσης, unde quivis Κρανειαν θηλειαν ſtatu naturali inveſtigans longitudinem celebris iſtius teli aſſequetur.

ΣΑΡΚΟΡΙΖΟΣ. Radice carnoſa; diſtinctio inter plantas, vii. 11.

ΣΑΡΚΟΦΥΛΛΟΣ. Craſſifolius. *Bot.* "Plantes graſſes," *Call.*

ΣΑΡΞ. In plantis, pars intermedia inter ινας et φλεβας. (vid.) Conſtat laminulis flexilibus in cellulas orbiculares vel ovales diſpoſitis, i. iv. Qui accuratiorem hujus rei velit ſcientiam, conſulat Grewium, Malpighium, Duhamel. N. B. Caro fructûs Citri Aurantii, monente illo, nudo oculo vaſcula exhibet, alibi ope Microſcopii ægre conſpicienda. L. c. 4. p. 24. Vid. etiam Hillium de ſtructura ligni, l. ii. c. 4.

ΣΗΜΕΙΟΝ. Punctum. αφ' ἑνος σημειου οἱ μισχοι, iii. 18.

ΣΗΠΩ. In aqua macero, iv. 10.

ΣΗΤΑΝΕΙΟΣ. ΣΑΤΑΝΕΙΟΣ. } Ex voce Dor. σατες, annuus, vii. 4. N. B. Apud Romanos vox ſynon. hornus, ab hora.

ΣΙΔΙΟΝ. Fructus Punicæ, *Granati*, L. etiam pl. aquaticæ Nymphææ affinis. de C. Pl. v.

ΣΙΝΔΩΝ. Veſtis tenuis goſſypina, "muſlin," æque ac lintea. N. B. Vox εῥιον apud Theophr. goſſypium æque

nec lanam amplectitur. Εριον εξ οὗ σινδονες ευτελεις, "coarse muslins," πολυτελεις, "fine muslins," (vid. Εριοφορα *Tab. Syst.* p. 15.) iv. 9.

ΣΙΝΟΣ. Detrimentum, injuria. de C. Pl. ii.

ΣΚΑΔΙΑ. Pericarpium Cacti, *opuntiæ* L. de C. Pl. v.

ΣΚΑΛΣΙΣ. ⎫ Sarculatio, "rak-
ΣΚΑΛΙΣΙΣ. ⎭ ing," *hort.* σκαλισις και ποασμος. de C. Pl. iii.

ΣΚΑΝΔΙΚΩΔΗΣ. vid. Σκανδιξ, *Tab. Syst.* p. 9.

ΣΚΙΝΘΟΣ. Urinator, "a diver," iv. 6.

ΣΚΛΗΡΟΣ. 1. Rigidus; "stiff;" opp. ευκαμπτῳ: de ligno Arbuti, iii. 10. 2. De qualitate vini annosi. Angl. "dry." de C. Pl. vi.

ΣΚΛΑΙΟΟΜΑΙ. syn. σκλημι, duresco, i. ix.

ΣΚΟΛΟΠΩΔΗΣ. Cruciformis, *Bot.* a σκολοψ, i. 16.

ΣΚΥΤΑΛΙΟΝ. Scutica: "a thong whip," iv. 5.

ΣΠΑΘΗ. Palmes fructui inserviens; Spatha, *Bot.* ii. 8.

ΣΠΑΘΟΦΥΛΛΟΣ. Folio vaginato, *Bot.* i. 16.

ΣΠΑΡΤΟΣ. Satus, sativus, *Bot.* opp. αγριῳ, vi. 7.

ΣΠΕΙΡΑ. συστροφη του ξυλου: venæ in ligno in orbem circumactæ ad nodos. v. 3.

ΣΠΕΡΜΑ. Semen: ovo comparatur: ὡς εχον εν ἑαυτῳ το ὑγρον και θερμον συμφυτον· ὧν εκλιποντων αγονον γινεται, i. 18.

ΣΠΙΛΑΣ. adj. γη σπιλας, terra glareosa. de C. Pl. i.

ΣΠΙΝΘΕΡΙΖΩ. Scintillas inter urendum emitto, iii. 10.

ΣΠΟΔΙΟΣ. Cinereus de colore. Κοκκυμηλια σποδια, iii. 7. Αμπελος σποδια.

ΣΠΟΡΗΤΟΙ οἱ. Sementes, vel tempora serendi: Anglice, "seed-time," viii. 3.

ΣΠΟΡΟΙ οἱ. id.

ΣΤΑΘΕΥΩ. Lente coquo: hinc derivata forsan vox Angl. "to stew," vii. 12.

ΣΤΑΜΝΙΣΚΟΣ. Urceolus vinis servandis: οινον εσταμνισμενον, ex verb. σταμνισκομαι. de C. Pl. ii.

ΣΤΑΣΙΜΟΝ το. Situs loci. de C. Pl. v.

ΣΤΕΓΝΟΣ. Astringens, densus. de C. Pl. vi.

ΣΤΕΓΩ. Sustineo; fixus sum; opp. τῳ συμμυειν, vi. 8.

ΣΤΕΛΕΦΟΣ? id. cum στελεχος, stipes.

ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ. 1. Cylindrico-caudatus, ut Bos: opp. λοφουρῳ, cristæ-caudato, ut Equus. 2. De spica Phlei L. aliorumque, et Plantaginis, vii. 10.

ΣΤΕΡΕΟΣ. Firmus: dicitur de qualitate uvarum: Anglice, "firm, fleshy." de C. Pl. iii.

ΣΤΕΡΕΩΜΑ. Roſtrum navis, cum ligneis firmamentis, ad impetum faciendum, vi. 8.

ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΙΚΟΣ. } De
ΣΤΕΦΑΝΗΠΛΟΚΟΣ. } plantis
ΣΤΕΦΑΝΩΤΙΚΟΣ. } ad coronas uſitatis; "garland flowers," vi. 7.

ΣΤΙΛΒΗΔΩΝ. Splendor; "a gloſſy poliſh." vi. 5.

ΣΤΛΕΓΓΥΣ? ſpec. Tritici, Catalogo Specierum inſerenda *Tab. Syſt.* p. 6. Vox Ægyptiaca? viii. 4.

ΣΤΟΙΧΕΩ. Ordinatim, vel in ſerie (στοιχῳ) diſtiano, iii. 16.

ΣΤΡΑΒΗ. Diſtortio: hinc ξυλον αϛραϐες, "ſtrait-grained timber," vi. 2.

ΣΤΡΑΓΞ. Gutta: κατα ϛραγγα, guttatim, ix. 19.

ΣΤΡΕΦΕΙΝ τα ὑπτια. De verſura foliorum in quibuſdam arboribus autumni tempore, ſæpius occurrit mentio apud Theophraſtum: ſic quoque M. T. Varro de Re Ruſtica, l. i. c. 46. "Admiranda diſcrimina ſunt naturalia, quòd ex quibuſdam foliis propter eorum *verſuram*, quod ſit anni tempus, dici poſſit, ut Olea, et Populus alba, et Salix."

ΣΤΡΙΦΝΟΣ. Strigoſus, macilentus; hinc *metaph.* de ligno dicitur ξυλον αϛραϐες, ϛριφνον, vi. 2.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ. Cylindricus, vi. 7.

ΣΤΡΟΦΙΓΞ. Cardo: antiquitus ex ligno duro, vi. 7.

ΣΤΡΥΦΝΟΣ. Auſtero-acerbus, aſtringens: uva πρωτον ὑδατωδης, μετα ταυτα ϛρυφνος· ειτ' οξυς· ειτ' εσχατον γλυκυς. de C. Pl. vi.

ΣΤΥΓΕΣ αἱ. Venti gelidiſſimi ex antris montium: ἁς ουκ εϛι φυλαξασθαι, ουδ' εν τοις ϛρωμασι κατακειμενον. de C. Pl v.

ΣΤΥΠΤΗΡΙΩΔΗΣ. Aſtringens, ſtypticus. De aquis aluminoſis. de C. Pl. ii.

ΣΥΓΚΛΑΩ. Confringo, iv. 8.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ. Judicium ex comparatione. iv. 14.

ΣΥΖΥΓΙΑ. Conjunctio: κατα συζυγιαν, de paribus loborum folii pinnati ex oppoſito, *Bot.* iii. 15.

ΣΥΜΜΕΤΡΟΣ. Sibi accommodatus, gratus.

ΣΥΜΜΕΤΡΟΟΜΑΙ. id. Hinc Ang. vox "ſymmetry."

ΣΥΜΠΑΤΕΩ. Quando multitudo vel exercitus conculcat: opp. καταπατειν, viii. 7.

ΣΥΜΠΕΠΤΩΚΟΣ. Connivens, *Bot.* opp. ανεωγμενῳ. de C. Pl. i.

ΣΥΜΠΙΛΕΟΜΑΙ. Conſtipor: σφαιριον φυλλινον συμπεπιλημενον. τῃ ῥαχει του φυλλου, iii. 8.

ΣΥΜΦΥΣΙΣ. Generatio novi ligni, ix. 1.

ΣΥΜΦΥΤΟΣ. 1. Innatus: το θερμον συμφυτον, i. 18. 2. Consuetus, vulgaris. ἡ Ἑλμις (tænia) συμφυτον ενιοις εθνεσι, ix. 22.

ΣΥΝΑΓΚΕΙΑ. Vallis continuata. de C. Pl. ii.

ΣΥΝΑΙΤΙΑ. Causa insuper. vid. αιτια, ix. 6.

ΣΥΝΑΠΤΩ εις το αυτο. Conglutino, ix. 19.

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ. vid. ξυναιθρωπευομαι.

ΣΥΝΕΚΡΑΙΝΩ. Sensim effluo, iii. 13.

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ. Compactus. de C. Pl. iv.

ΣΥΝΕΡΕΦΩ. Una tectum efficio: de tecto frondoso sylvæ, iii. 2.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Continuatio, continuata successio, vi. 7.

ΣΥΝΘΛΑΩ. Comprimendo unire: ὁταν συνθλωσιν ἑκατερου κλαδους το ἡμισυ, de unione duorum surculorum post sectionem longitudinalem. de C. Pl.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ. } Compositio me-
ΣΥΝΤΙΘΗΜΙ. } dicamenti: "to make up a prescription," ix. 16.

ΣΥΝΤΑΡΡΟΣ. Ramis implicatis, corbis in modum, vid. ταρσος. de C. Pl. iii.

ΣΥΝΤΗΚΩ. Una marcesco, maceror, de C. Pl. vi.

ΣΥΡΜΑΤΙΤΙΣ. In acervum congestus, undique attractus, a συρω. Κοπρος συρματιτις, Quisquiliæ, *Scal.* vii. 5.

ΣΥΡΡΟΗ δακρυωδης. Coagmentatio resinosa, iv. 6.

ΣΥΣΣΗΠΩ. Una marcesco. de C. Pl. iii.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ. 1. Coagulatio: opp. διαλυσει. 2. ἡ πρωτη συστασις, embryon plantæ. de C. Pl. v.

ΣΥΣΤΡΟΦΑΙ αἱ. Circumvolutiones, v. 6. (vid. Σπειρα.)

ΣΦΑΚΕΛΗ. } Gangræna
ΣΦΑΓΕΛΙΣΜΟΣ. } in arboribus, iv. 15.

ΣΦΗΚΙΟΝ. Favus Vesparum, iv. 10.

ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ. Cuneiformis. de C. Pl. i.

ΣΦΥΡΑ μεγαλη. "a large wooden mallet," v. 9.

ΣΦΥΡΙΓΞ. Pedunculus obtusus malleiformis? *Bot.* vii. 4.

ΣΦΥΡΙΟΝ. dim. Σφυρας. Σφυριον plerumque εκ Κοτινου: sc. ligno præduro, ib.

ΣΧΕΔΙΑ. Navis tumultuarie facta ex lignis vel trabibus, "a raft." Mentio fit σχεδιας ἡ εχρησαντο πεντηκοντα ιστοις, vi. 9.

ΣΧΕΛΟΜΑ. Pars navis juxta rostrum: το σχελομα και τας επωτιδας, (vid.) v. 8.

ΣΧΗΜΑ. Habitus plantæ, vii. 6

ΣΧΗΜΑΠΟΙΕΩ. Notas inuro, ix. 4.

ΣΧΙΖΑ ἡ. "A billet of wood," ix. 3.

ΣΧΙΣΜΑΤΑ φυλλων. Lobi. *Bot.* iii. 11.

ΣΧΟΙΝΙΑ ἡ. Juncetum: "a bed of rushes," iv. 13.

ΣΩΜΑΤΩΣΙΣ. Induratio humidi: reductio in solidum. de C. Pl. vi.

T.

ΤΑΛΑΡΟΣ. Calathus. N. B. Antiqui semina Cucumeris, aliorumque id genus, εν ταλαροις (vasibus fictilibus, an corbibus?) durante hyeme, locis apricis, tectis, ferebant: "garden-pots?" de C. Pl. v.

ΤΑΝΕΙΑ. Antenna navis, a τεινω, "the yard of a ship on which the sails are spread," iv. 1. Differt a κεραια, sed quomodo? ambo simul occurrunt.

ΤΑΡΙΧΕΙΑ τα. Radiculæ vel fibrillæ caulinæ, Hederæ propriæ: N. B. Succidia Gloss. vet. sed quære: an radices succedaneæ? Mallem scribere duplici ρ, utpote ex ταρρω derivatum.

ΤΑΡΡΟΣ. 1. Crates ex ligno textili, unde συνταρρος implicatus. N. B. Antiquitus ταρσος a τερσω, quia casei super illis impositi exsiccabantur. 2. Implicatio ramorum vel fibrarum radicis, ουκ ενοχλει τῳ ταρρῳ δια την βραχυριζιαν. de C. Pl. iii.

ΤΑΡΡΩΔΗΣ. Implicatus. Ἑρπυλος και Σισυμβριον εχουσι ῥιζας πολλας και ταρρωδεις, vi. 7.

ΤΕΛΟΣ. Perfectio; εν τελει γινεσθαι. de C. Pl. vi.

ΤΕΡΑΜΝΟΤΗΣ. Mollities.

ΤΕΡΑΜΩΝ. Tener; de qualitate Pisorum, &c. post coctionem; τεραμονες vel ατεραμονες, ("they boil hard or soft,") viii. 9.

ΤΕΡΕΤΡΙΟΝ. Pars πυρειας. (vid.) ex duro ligno, sc. Κοτινου, v. 8.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ τα περι τροπας. Dies antiquitus insignes, æque ac Halcyonii, etsi numero impares. de C. Pl. v.

ΤΕΤΑΝΟΕΙΔΗΣ. supr. iv. 7.

ΤΕΤΑΝΟΣ. Rigidus, tensus: de foliis, iii. 18.

ΤΕΤΡΑΞΟΟΣ. Vid. μονοξοος. N. B. Vox ξοος, ά ξυω, rado. Εςι γαρ πολυλλοπος ἡ Ἐλατη, διο και τας κωπας ξυοντες αφαιρειν πειρωνται καθ᾽ ἱνα και ὁμαλως, ("they work with the grain of the wood,") v. 2.

ΤΕΤΡΙΧΩΜΕΝΟΣ πηλος. Lutum capillis mixtum ad opera cæmentitia, ut apud nos. de C. Pl. i.

ΤΙΘΑΣΙΑ. Manſuefactio, iii. 3.

ΤΜΗΤΙΚΟΣ. Acie acuta: dicitur de glacie: ἡ παχνη τμητικωτερα της χιονος. de C. Pl. v.

ΤΟΡΝΕΙΑ ἡ. Opus tornatile; "carved work, or turnery," v. 8.

ΤΡΑΓΑΩ. Luxurio, *met.* ex libidine hirci: hinc τραγᾳν dicitur de morbo vitis ex nimia luxurie; articulatio; Plin. xvii. 24. "a ſwelling of the joints." de C. Pl. v.

ΤΡΑΓΗΜΑ. Bellaria; "ſweetmeats." N.B. Hinc vox Gallica "dragées."

ΤΡΙΓΜΟΣ. Stridor alarum inſecti; "buzzing:" φθεγγονται οἱον τριγμον. de C. Pl. v.

ΤΡΙΓΟΝΕΩ. De triplici metamorphoſi inſectorum, τριγονησαντες μεταβαλλουσι. vid. Καμπη.

ΤΡΙΜΜΑΤΑ τα. Ῥιζων ſc. *Pharm.* "powders of roots in medicine?" ix. 9. 12.

ΤΡΙΟΖΟΣ. Ramis terna ſerie, iv. 5.

ΤΡΙΟΡΧΙΣ. Radicibus bulboſis ternis, ix. 9.

ΤΡΙΧΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis tenuibus, linearibus, ut Pinûs, &c. iii. 10.

ΤΡΟΠΑΙ αἱ. Solſtitia. τρ. ἐαριναι, τρ. χειμεριναι.

ΤΡΟΧΙΣΚΟΣ. Trochiſcus. Ang. "lozenge:" antiquitus radicis medicinalis fruſtulum ita appellabatur, ix. 9.

ΤΡΟΧΜΑΛΟΣ. 1. Acervus lapidum: 2. adj. lapideus, calculis plenus, γη τροχμαλος. de C. Pl. iii.

ΤΡΥΓΗ ἡ. Fæx vini, cujus uſus vice ſaponis, ix. 10.

ΤΡΥΠΑΝΟΝ. id. q. Τερετριον. (vid.) v. 10.

ΤΡΩΞΑΝΑ τα, a τρωξ. Radices fibroſæ? ſurculi juniores ſemeſi a vermibus? de C. Pl. iii.

*ΤΥΠΩ ἐν. Quodammodo: ἐν τυπῳ λαβειν, *phraſ.* ut ita loquar.

ΤΥΦΛΟΣ οφθαλμος. De arbore læſo; "blighted;" οφθαλμος enim gemma, i. 13.

ΤΥΧΩΝ. Ordinarius: γη τυχουσα, communis, viii. 7.

Υ

ὙΓΡΑ ἡ. Tempus pluviale. de C. Pl. iv.

ὙΓΡΑΣΙΑ. Humiditas, ſuccus, iii. 13.

ὙΔΑΡΗΣ. Aquoſus: opp. πυκνῳ, in ſuccis, ix. 1.

ὙΔΑΤΑ τα. Anni tempeſtas pluvioſa in calidis regionibus, ix. Ὑδατα θερμα πηγνυσι θαττον, optime. de C. Pl. v.

Ὑδριπικης? forſ. ὑδρεπιψις. Succus aquoſus. de C. Pl. vi.

ὙΛΗ. Materies primaria.

ὙΛΗΜΑ. Frutex, i. 9.

'ΥΛΙΚΟΙ. Foramina. Vasa fibrosa succum haurientia; "sap vessels." de C. Pl. vi.

'ΥΛΙΣΜΟΣ. Percolatio. ib.

'ΥΜΕΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Ab ὑμην; cujus semen capsula membranacea tectum. Hymenospermus. *Bot.*

'ΥΜΕΝΩΔΗΣ. Membranaceus: N. B. Μητρα vasculosa Sambuci ita vocatur, sc. vasculis membranaceis, i. 3.

'ΥΠΑΡΓΙΛΟΣ. Sub-argillaceus, de solo, ix. 3.

'ΥΠΑΡΟΩ. Leviter aro, viii. 11.

'ΥΠΕΡΠΥΡΟΣ. Calidus valde. de C. Pl. i.

'ΥΠΕΡΡΙΖΩΝ. Valde radicatus. de C. Pl. iii.

'ΥΠΕΡΤΑΖΩ. } Leviter, et
'ΥΠΕΡΤΑΖΟΜΑΙ. } superficiem tenus aro: και μεν ὑπερβαζωνται και κινησωσι την γην, iii. 2.

'ΥΠΝΟΣ. *met.* Somnus plantarum; hinc dicuntur, καθευδειν νυκτος.

'ΥΠΟΒΑΛΛΩ. Oblique planto: opp. ορθοβαλλειν, ii. 7.

'ΥΠΟΖΥΓΙΑ. Ex usu antiquitus distinguebantur Boves aratorii a lactariis. Βουσι και ἱπποις και τοις 'Υποζυγιοις, ("cows, horses, and working cattle,") iv. 4.

'ΥΠΟΚΑΤΩΡΥΧΙΑ. Sursum, deorsum fossio: "trenching ground." de C. Pl. v.

'ΥΠΟΚΟΝΙΣΙΣ. Methodus maturandi uvas et cucumeres pulvere superinjecto, ii. 8. de C. Pl. iii.

'ΥΠΟΚΟΝΙΟΩ. id. ii. 8.

'ΥΠΟΛΗΨΙΣ ἡ. Fœtura floris? "the setting of blossoms." de C. Pl. v.

'ΥΠΟΝΕΑΩ. Vid. νεαω, iii. 2.

'ΥΠΟΠΤΕΡΟΣ. Volatilis; de odore. de C. Pl. vi.

'ΥΠΟΠΤΙΣΣΩ. Vid. πτισσω, iv. 10.

'ΥΠΟΡΕΙΑ. Pars subjacens monti, ix. 1.

'ΥΠΟΦΕΡΩ. vid. 'Υποληψις.

'ΥΠΟΦΕΥΓΩ. Devito, quasi abhorreo, ix. 15.

'ΥΠΟΦΥΣΙΣ. Quod subtus crescit: distinguitur a προσφυσις φλοιου, vi. 3.

'ΥΠΤΙΑ τα. Superior pars folii: opp. τῳ πρανει, i. 16.

'ΥΠΤΙΟΝ τεμνω. *Hort.* "to prune with the cut upwards." de C. Pl. v.

'ΥΠΩΠΙΑ. Cavitates sub oculis: τα ὑπωπια, sugillationes, "a black eye," vulgo, ix. 22.

'ΥΣΤΕΡΕΩ. De plantis Serotinis: opp. τῳ προτερειν, vi. 7.

'ΥΣΤΑΙΓΞ. 1. Tentaculum in Molluscis. Linn. 2. Cirrhus in arboribus, iii. 18.

'ΥΦΙΣΤΗΜΙ. Subsido; de fluidis. de C. Pl. iv.

ΦΑΙΟΣ. Color: εκ λευκου και μελανος, "grey." de C. Pl. vi.

ΦΑΚΟΣ. Legumen Φακου, viii. 5. An φακον?

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ. Medicinalis. de C. Pl. iii. Opp. φαρμακωδει.

ΦΑΡΜΑΚΟΝ ισχαιμον. Medicamentum ftypticum, iv. 8.

ΦΑΡΜΑΚΩΔΗΣ. Venenofus: φαρμακωδεις δυναμεις ασθενεστεραι τοις ειθισμενοις. Ita Poeta, "Effecit poto Mithridates fæpe Veneno, Toxica ne poterint fæva nocere fibi."

ΦΑΥΛΙΑ? τα. Olivæ minutæ inutiles, ii. 3.

ΦΙΛΗΔΕΩ. Sibi placeo: δια το φιληδειν, (voluptatis caufa,) ix. 16.

ΦΙΛΟΖΩΟΣ. Vivax: φιλοζωα τα κεφαλορριζα, (quia hyemem durant,) vii. 12.

ΦΛΕΒΕΣ. Apud Theophraftum vafa fpiralia. Vide Grewium, ii. c. 4. iii. 3. Hillium de ftructura ligni, ii. c. 2, 3. ubi multa de lactiferis, refiniferis, et gummofis enumerantur; etiam Malpighii Anat. t. 7. f. 30. Vid. etiam Ινες, i. iv.

ΦΛΕΒΙΚΑ τα. Superficies papillofa cutis. de C. Pl. vi.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Inflammatio: vid. εκπυησεις φλεγμονων, ix. 10.

ΦΛΟΙΟΣ. Cortex plantæ. 1. φλ. κυριος. 2. φλ. επιπολης. quorum pofterior fæpius, ut in Arbuto, et Platano, αυτοματως εκπιπτει. 3. φλ. adfcititius, utpote Φιλλυ, iv. 18. p.

ΦΟΒΗ. Loculus, capfula minuta; *Bot.* viii. 3. hinc Angl. "a fob."

ΦΟΡΑ. Proventus, feges, iii. 14.

ΦΡΥΓΑΝΟΝ. Ξυλωδες, και μικροφυλλον, vi. 1. Divifio generalis, Δενδρων, Θαμνων, Φρυγανικων, Ποωδων, vi. 1. Φρυγανα dividuntur in ακανθα (inermia, *Bot.*) και ακανθωδη, (fpinofa:) pofteriora etiam in ακανθωδη αφυλλα, φυλλακανθα, (foliis fpinofis,) πτορθακανθα, (ramis fpinofis,) ib.

ΦΥΛΛΟΝ. Indefinite pro folio et petalo, *Bot.* Lobi etiam in pinnatis φυλλα vocantur; fed femel obfervat το ολον, folii pennati, φυλλορροιειν, διοπερ αν τις ειποι το ολον φυλλον ειναι, iii. 12.

ΦΥΛΛΟΣΚΕΠΗΣ. De arbore valde frondofa, adeo ut folis radios arceat. de C. Pl. i.

ΦΥΜΑΤΑ. Tumores, puftulæ, ix. 12.

ΦΥΣΑΙ. id.? An inflatio totius corporis, in pecoribus, "being hoved," ix. 10.

ΦΥΣΙΜΟΣ. Generativus, generando aptus. de C. Pl. iv.

ΦΥΤΕΥΜΑΤΑ τα. Plantæ ex femine: opp. μοσχευμασι.

ΦΩΛΕΥΩΝ. Nidificans: τα φωλευοντα, aves in genere: fed rectius quando plumas exuunt, a φωλεω, quia tunc

temporis latebras quærunt: "moulting birds."

X.

ΧΑΡΑΓΜΟΣ. Serratura folii. *Bot.* iii. 10.

ΧΑΡΑΞ. Sudes, vallum, ii. 1. de C. Pl. v.

ΧΑΥΝΟΣ. Laxus, porofus, iii. 6.

ΧΕΙΜΩΣΠΟΡΕΩ. Hyeme fero. de C. Pl. iv.

ΧΕΛΥΣΜΑ. Statumen navis gubernaculi; roborandi gratia. *Poll.* v. 8.

ΧΕΙΡΟΠΛΗΘΗΣ. Manipulus, manipuli inftar, ii. 7.

ΧΛΟΕΡΟΣ. } ΧΛΩΡΟΣ. } Luteo-viridis: folia Platani vocantur χλωρα, "pea-green." Varietates alibi occurrunt; e.g. 1. ποωδης, "grafs-green;" 2. πρασινος, "green as a leek;" 3. δαφνωδης, "dark-green."

ΧΛΟΗ. Vox generalis, pars herbacea: εκ του κατω κρομμυον· εκ του ακρου χλοη, vii. 4. viii. 2.

ΧΝΟΥΣ. } ΧΟΥΣ. } 1. Pollen. *Bot.* 2. Villi in pericarpio Rofæ, vi. 6. 3. Staminum congeries in floribus.

ΧΝΟΩΔΗΣ. De floribus Ramineis, apetalis, ut Vitis, Hederæ, &c. viii. 3.

ΧΟΑ. Menfura, viii. 3.

ΧΟΓΧΗ. Eadem; ex Concha teftacea. Duo cochlearia continet, ix. 6.

ΧΟΝΔΡΟΣ. Far, *Phav.* fed rectius Tritici vel Hordei cujufdam maffa farinacea. de C. Pl. iv.

ΧΥΛΕΥΩ. Viridi herba pafco: "to foil cattle." de C. Pl. ii.

ΧΥΛΟΣ. } ΧΥΜΟΣ. } Succus plantæ expreffus. vide οπος, fuccus fponte fluens, i. 3. fapor, i. 19.

ΧΥΛΙΣΜΟΣ. Succi expreffio: differt ab οπισμος, ix. 8.

ΧΥΛΟΩ. Succo abundo.

ΧΡΩΟΜΑΙ. Coloror: ανθος κεχρωμενον ανθικως: opp. ανθεσι λευκοις, vii. 9.

Ψ.

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. Inftrumentum muficum lyræforme, cui ζυγον (pars curvata inftar cornu) proprium, v. 8.

ΨΕΚΑΔΕΣ αἱ. Τινα πλατεα αττα φερομενα μεν φανερα· αλλ' ου διαμενει. ψεκαδες και δροσοι. de C. Pl. iv. ὁταν ὑπουσης ὑγροτητος μετα τας ψεκαδας ὑποκαυση ὁ ἡλιος. de C. Pl. v. ου γινεται πληθος ὑδατος, αλλ', ὡς επι το πολυ, ψεκας. Pruinæ particulæ glaciales hic per τινα πλατεα αττα videntur defcribi, nifi textus fit corruptus.

ΨΙΛΩΘΡΟΣ. Calvities: radix Αμπελου 'αγριας εις ψιλωθρον, (vis depilatoria,) ix. 22.

ΨΙΝΕΣΘΑΙ. An ψηνεσθαι. Erodi

vermibus ψηνες vocatis. vid. Tab. Syst. p. 35. N. B. Το ψηνισθαι, morbus Punicæ, *Granatæ*, L. iv. 16.

ΨΥΧΗ. Theoph. Papilio. vid. Metamorphoses Insectorum. *Tab. Syst.* p. 34.

ΨΥΧΡΟΣ. Qualitas lignorum quorundam: opp. θερμω. vid. θερμος, Πυρεια, v. 4.

ΨΩΡΑ. Morbus in truncis arborum scabiei similis, præcipue in Ficubus, iv. 16.

ΨΩΡΙΑΩ. id. de C. Pl. v.

Ω.

ΩΛΕΣΙΚΑΡΠΟΣ. Epithetum Homeri Ιτεα (Salici L.) proprium, δια το ταχυ προκαταβαλλειν προ του τελειως άδρυναι, και πεψαι τον καρπον, iii. 2. N. B. Sensum Homeri haud plane intellexisse videtur Theophrastus, qui verbo hoc immensam substantiæ papposæ diffusionem solummodo indicat. Botanicis satis notum est flores masculos et fœmineos in Salicibus calyce papposo instructos esse. Naturæ saltem incongruum est *immatura* semina spargere, nisi morbo, vel aëris vitio. Cuivis autem, μετ' ακανθησιν Ιτεας, videre licet aërem totum materie papposa repletum; amentis sc. utriusque sexus abeuntibus, et undequaque circumfusis.

'ΩΡΑ. Tempus anni; "the season of the year:" ὡρα διαγελωσα, "the smiling spring," de C. Pl. i.

'ΩΡΑΙΟΣ. Tempestivus: καρποι ὡραιοι, iv. 5.

CATALOGUS ALPHABETICUS

PLANTARUM LINNEI

QUÆ APUD THEOPHRASTUM OCCURRUNT.

[a] Vid. not. p. 11. [b] Vid. not. p. 26. [c] Vid. not. p. 8.

---

[a] Vid. not. p. 7.
[b] Vid. omissa ad finem.
[c] Vid. not. p. 9.
[d] Vid. not. p. 4.
[e] Vid. omissa ad finem.
[f] Vid. not. p. 13.

[a] Vid. not. p. 17.

[b] Vid. not. p. 9.

[a] Vid. not. p. 18.
[b] Vid. not. p. 9.
[c] Vid. not. p. 27.
[d] Vid. not. p. 10.
[e] Vid. not. p. 9.

---

[a] Vid. omissa ad finem.
[b] Vid. not. p. 17.
[c] Vid. not. p. 14.
[d] Vid. not. p. 8.
[e] Vid. omissa ad finem, et not. Μελινης, p. 5.
[f] Vid. not. p. 10.
[g] Vid. omissa ad finem; etiam not. p. 4.

[a] Myrobalanus Bauh.
[b] Vid. not. l. p. 9.
[c] Vid. not. p. 20.
[d] Vid. not. p. 20. item Cat. Alph. p. 59.
[e] Vid. not. p. 6.
[f] Vid. not. p. 8.
[g] Vid. omissa ad finem.

[a] Vid. not. p. 14.
[b] Vid. not. p. 18.
[c] Vid. not. p. 7.
[d] Vid. not. p. 17.

e Vid. not. Δαφνη αγρια. p. 11.

CORRIGENDA ET OMISSA

CATALOGUS ALPHABETICUS.

Αιγειρος. *Diœc.*
1. Αιγιλωψ. *Triandr*
2. Αιγιλωψ. gram. *Polygamia.*
'Αλιμον, το. *Polygamia*, lege *Monandr.*
Απατη. *Claſſ. incert.* lege *Syngeneſ.*
Syn. Αφακης.
Βαλανος. *Claſſ. incert.* lege *Decandr.*
Βλιτον. *Polygam.* lege *Monœc.*
Δενδρον τιγρινον. *Claſſ. incert.*
Δρυς ποντια. *Crypt.*
Ελατηριον. *Claſſ. incert.*
Ελειολιμωνια. *Claſſ. incert.*
Ελειοχρυσος. *Claſſ. incert.* lege *Syngen.*
'Ελξινη. *Claſſ. incert.*
'Εσπερις. *Tetradyn.*
Θησειον. *Claſſ. incert.* lege *Enneand.*
Ιξινη. *Claſſ. incert.* lege *Syngeneſ.*
'Ιπποφεως. *Tetradyn.*
Κυδωνιος. *Icoſandr.*
Λακαρα. *Icoſandr.*
Λειμωδωρον. *Claſſ. incert.*
Λιβανον. *Claſſ. incert.* lege *Diœc.*
Λιμνωδες τι. *Claſſ. incert.*
[illegible]? an error textûs? id.
Μυδιον? id
Ναρτη. vid. Ναρδος. *Polygam.*
Οινοθηρα. *Hexandr.*
Οινοραθης? de C. Pl. vi. *Claſſ. incert.*
Οξυακαρπα. iii. 6. an pro Οξυακανθα?
Οσπρις. vid. Δρυς.
Παιωνια. *Polyandr.* ſyn. Γλυκυσιδης.
Πιλος. *Claſſ. incert.*
1. Στρουθιος. *Icoſandr.*
2. Στρουθιος. *Claſſ. incert.*

TAB. SYSTEMATICA.

Σακχαρ το. Saccharum, *Ravennæ*, Fl. Græc. *Triandr.* Vid. Cat. Alph. p. 65.
Στιλειφουρος. *Triandr.* Gramen Phleum. Sed textus corruptus. Vid. Cat. Alph. p. 70.
Ορτυξ *Tetrandr.* ſyn. Αρνογλωσσου.
Ευπατοριον. Pentandr. ſyn. Στρυχνου.
Ανδραφαξις. } Ατραφαξις. } Inter *Pentandr.* et *Polygam.* occurrit. Incertum videtur an Chenopodium vel Atriplex.
Σχοινος, Καλαμος. *Hexandr.*
Οχνη, *Icoſandr.*
Ψευδο-Δικταμνος, lege Marrubium Pſeudo-dictamnus
Κιννηρια. *Syngeneſ.* ſyn. Ατρακτυλιδος.
Οστρυα. Carpinus, *Oſtrya.*
Κεγχρος, Cenchrus, *Polygam.* niſi forſan Milium vel Panicum.
Πιλος inter Fungos, ut affinis Σφαιριω.
Δαφνη ποντια. *Tab. Syſt.* p. 37. inſerenda.
Θυμον λιθωδης. *Tab. Syſt.* p. 37. inſerend.

ERRATA TYPOGRAPHICA.

CATAL. ALPHABETICUS.

Pag.
14. l. 21. *lege* compiantur
18. l. antepenult. *lege* [illegible]
24. l. 2. *lege* [illegible]
32. l. 27. *lege* folftitio
35. l. 13. *lege* fluviorum
55. l. 9. *lege* Polygonum

TAB. SYSTEMATICA ET LEX.

Pag.
11. not. b. *lege* frequentiffimus
19. col. 2. l. ult. *lege* trifulca.
43. col. 2. l. 8. *lege* Αντιδιηρημενος
48. col. 1. l. 30. *lege* Gymnofpermus
50. col. 1. l. 11. *lege* Διευρυνω
63. col. 2. l. 6. *lege* δικελλα